



DANDERYDS SJUKHUS

Namn på dokument Handläggning av akuta bukar		Dnr DS Version 4
Enhet: VO Akutkliniken		Urspr. version 2011-10-01
Fastställt/Gäller från: 2014-10-01	Fastställt av: Anna Färg Hagansbo	
Översyn/revision: 2015-02-01	Ansvarig: Mahmood Mahmood, Ulrika Norrbom	

Cirkulatoriskt opåverkad patient med buksmärtor:

- Bukprover
- PVK om CT-buk från akuten
- Längd och vikt
- VAS.
- Vid ordination på intravenös smärtlindring sätts PVK akutmottagningen. I annat fall utförs det på vårdavdelningen.

Cirkulatoriskt opåverkad patient med höga buksmärtor:

- EKG; om patologiskt - remiss till kardiolog
- Bukprover
- PVK om CT-buk från akuten
- Längd och vikt
- VAS
- Vid ordination på intravenös smärtlindring sätts PVK akutmottagningen. I annat fall utförs det på vårdavdelningen.

Cirkulatoriskt opåverkad patient med kraftig buksmärtor

- PVK
- Bukprover
- Längd och vikt
- Dropp enligt ordination
- VAS
- Prioriterad upp till avdelning

Cirkulatoriskt påverkad patient med buksmärtor:

- PVK
- Bukprover
- Blodgruppering och BAS-test
- Inf Ringer-Acetate 1000 ml intravenöst
- Längd och vikt
- VAS
- EKG
- Prioriterad upp till avdelning

Patient med buksmärtor och feber >38,5 grader:

- PVK
- Bukprover
- Urinodling enligt ordination
- Inf Ringer Acetate (NaCl om Diabetes Mellitus)
- Längd och vikt
- VAS
- Prioriterad upp till avdelning
- Blododling enligt ordination