
Across−strain variation in DMET protein abundance

A Broad−sense heritability

	Protein		Transcript	
	H² (95% CI)	BH Pvalue	H² (95% CI)	BH Pvalue
OATP1A4	0.94 (0.91, 0.96)	6.66e−70	0.50 (0.34, 0.64)	1.48e−11
CYP2C29	0.93 (0.88, 0.95)	5.69e−65	0.33 (0.16, 0.47)	1.47e−05
CYP2D10	0.92 (0.87, 0.95)	3.48e−61	0.21 (0.05, 0.35)	3.76e−03
CYP2C39	0.90 (0.85, 0.94)	8.48e−57	0.69 (0.55, 0.79)	1.38e−23
CYP2E1	0.90 (0.84, 0.93)	1.01e−54	0.25 (0.07, 0.40)	6.89e−04
BCRP	0.87 (0.79, 0.91)	9.70e−49	0.47 (0.32, 0.60)	6.33e−09
CYP2C50	0.85 (0.78, 0.90)	4.53e−44	0.42 (0.24, 0.56) †	1.70e−08
CYP2D26	0.80 (0.70, 0.86)	1.64e−35	0.53 (0.37, 0.64)	7.64e−13
UGT1A1	0.77 (0.67, 0.84)	8.97e−32	0.39 (0.19, 0.55) †	9.36e−08
UGT1A6	0.74 (0.63, 0.82)	1.64e−29	0.39 (0.19, 0.55) †	9.36e−08
ENT1	0.74 (0.63, 0.82)	3.65e−29	0.47 (0.29, 0.61)	1.64e−10
NTCP	0.72 (0.58, 0.79)	1.06e−26	0.22 (0.07, 0.37)	3.62e−03
CES1	0.65 (0.53, 0.75)	2.70e−21	—	—
CYP1A2	0.62 (0.49, 0.75)	1.57e−19	0.16 (0.02, 0.30)	1.99e−02
CYP3A11	0.60 (0.44, 0.71)	5.35e−18	0.20 (0.03, 0.34)	4.89e−03
BSEP	0.58 (0.41, 0.69)	1.69e−16	0.22 (0.06, 0.36)	4.24e−03
CYP2C9	0.58 (0.42, 0.69)	1.69e−16	—	—
CYP2D9	0.57 (0.43, 0.68)	4.96e−16	0.41 (0.27, 0.55)	1.43e−08
CYP2F2	0.55 (0.41, 0.66)	3.82e−15	0.39 (0.17, 0.55)	1.53e−06
MRP3	0.51 (0.38, 0.64)	2.83e−13	0.48 (0.32, 0.63)	3.87e−11
ABCB4	0.46 (0.28, 0.61)	6.58e−11	0.28 (0.10, 0.42)	1.37e−04
OCT1.2	0.42 (0.29, 0.56)	3.40e−09	0.60 (0.45, 0.71)	1.29e−13
OATP2A1	0.38 (0.22, 0.52)	6.56e−08	0.57 (0.42, 0.70)	7.56e−15
UGT2A2	0.34 (0.20, 0.47)	1.63e−06	0.05 (0.00, 0.18) †	2.79e−01
ATPASE	0.33 (0.20, 0.48)	2.69e−06	0.51 (0.36, 0.64)	1.49e−12
MRP2	0.31 (0.10, 0.46)	1.04e−05	0.41 (0.23, 0.56)	1.75e−08



† = shared multi−gene probe

B Strain−level abundance profiles

