
Stand. Residual
2
1
0
−1
−2
Nagel−Hiemke
Ionescu 1990
Girardi 1995
Oades 1998 *
Nemet 2024 *
Rapoport 1970
Rapoport 1978
Pliszka 1994
Hanna 1996a
Hanna 1996b
Anderson 2000
Konrad 2003
Dvoráková 20


DFFITS
0.5
0.0
−0.5
Nagel−Hiemke
Ionescu 1990
Girardi 1995
Oades 1998 *
Nemet 2024 *
Rapoport 1970
Rapoport 1978
Pliszka 1994
Hanna 1996a
Hanna 1996b
Anderson 2000
Konrad 2003
Dvoráková 20


Cook's Distance
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Nagel−Hiemke
Ionescu 1990
Girardi 1995
Oades 1998 *
Nemet 2024 *
Rapoport 1970
Rapoport 1978
Pliszka 1994
Hanna 1996a
Hanna 1996b
Anderson 2000
Konrad 2003
Dvoráková 20


Covariance Ratio
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
Nagel−Hiemke
Ionescu 1990
Girardi 1995
Oades 1998 *
Nemet 2024 *
Rapoport 1970
Rapoport 1978
Pliszka 1994
Hanna 1996a
Hanna 1996b
Anderson 2000
Konrad 2003
Dvoráková 20


tau−squared (L−0−0)
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
Nagel−Hiemke
Ionescu 1990
Girardi 1995
Oades 1998 *
Nemet 2024 *
Rapoport 1970
Rapoport 1978
Pliszka 1994
Hanna 1996a
Hanna 1996b
Anderson 2000
Konrad 2003
Dvoráková 20


Q (L−0−0)
60
55
50
45
40
35
Nagel−Hiemke
Ionescu 1990
Girardi 1995
Oades 1998 *
Nemet 2024 *
Rapoport 1970
Rapoport 1978
Pliszka 1994
Hanna 1996a
Hanna 1996b
Anderson 2000
Konrad 2003
Dvoráková 20


hat
0.095
0.090
0.085
0.080
0.075
0.070
Nagel−Hiemke
Ionescu 1990
Girardi 1995
Oades 1998 *
Nemet 2024 *
Rapoport 1970
Rapoport 1978
Pliszka 1994
Hanna 1996a
Hanna 1996b
Anderson 2000
Konrad 2003
Dvoráková 20


weight
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
Nagel−Hiemke
Ionescu 1990
Girardi 1995
Oades 1998 *
Nemet 2024 *
Rapoport 1970
Rapoport 1978
Pliszka 1994
Hanna 1996a
Hanna 1996b
Anderson 2000
Konrad 2003
Dvoráková 20