
Study
ADHD
N Mean SD
Control
N Mean SD
Standardised Mean Difference
SMD 95% CI Weight
Nagel−Hiemke 1984 * 21 90.50 89.70 9 50.70 44.90 0.49 [−0.30; 1.28] 0.0%
Ionescu 1990 * 12 122.00 89.00 11 43.00 22.00 1.15 [0.26; 2.05] 0.0%
Girardi 1995 * 17 229.00 111.32 11 223.00 109.45 0.05 [−0.71; 0.81] 9.7%
Oades 1998 * 14 111.90 86.40 9 81.70 86.40 0.34 [−0.51; 1.18] 9.2%
Nemet 2024 * 10 81.30 102.77 10 75.60 29.09 0.07 [−0.80; 0.95] 0.0%
Rapoport 1970 19 0.39 0.21 6 0.29 0.15 0.48 [−0.45; 1.41] 8.7%
Rapoport 1978 15 14.52 7.55 14 12.18 5.59 0.34 [−0.39; 1.07] 9.8%
Pliszka 1994 20 1.00 0.60 22 1.80 0.70 −1.20 [−1.86; −0.54] 10.2%
Hanna 1996a 12 4.10 1.50 16 7.00 4.00 −0.88 [−1.67; −0.09] 9.5%
Hanna 1996b 15 0.70 0.30 16 1.00 0.50 −0.70 [−1.43; 0.03] 9.8%
Anderson 2000 200 219.13 165.49 51 278.00 173.00 −0.35 [−0.66; −0.04] 11.8%
Konrad 2003 31 4.15 2.57 26 3.56 1.65 0.26 [−0.26; 0.79] 10.9%
Dvoráková 2007 57 10.13 5.74 17 2.09 0.78 1.57 [0.97; 2.17] 10.5%
Random effects model −0.01 [−0.52; 0.50] 100.0%
Prediction interval [−1.78; 1.75]
Heterogeneity: I^2 = 83.6%, τ^2 = 0.5429, p < 0.0001
−2 −1 0 1 2
Increased in controls
Increased in ADHD