
Study
ADHD
N Mean SD
Control
N Mean SD
Standardised Mean Difference
SMD 95% CI Weight
Mikkelsen 1981 * 15 219.00 116.00 18 262.00 115.00 −0.36 [−1.05; 0.33] 6.8%
Nagel−Hiemke 1984 * 21 241.00 186.00 9 317.00 150.00 −0.42 [−1.21; 0.37] 5.7%
Ionescu 1990 * 12 248.00 78.00 11 184.00 66.00 0.85 [−0.01; 1.71] 5.1%
Girardi 1995 * 17 1.55 0.62 11 1.79 0.63 −0.37 [−1.14; 0.39] 6.0%
Oades 1998 * 14 735.50 446.70 9 481.90 246.60 0.64 [−0.22; 1.50] 5.1%
Alsen 2015 * 50 232.00 67.30 50 232.00 65.30 0.00 [−0.39; 0.39] 11.2%
Xiong 2021 * 180 177.70 37.92 180 206.20 42.45 −0.71 [−0.92; −0.49] 0.0%
Nemet 2024 * 10 306.20 202.07 10 330.20 127.76 −0.14 [−1.01; 0.74] 5.0%
Rapoport 1970 19 1.13 0.38 6 1.04 0.38 0.23 [−0.69; 1.15] 4.6%
Rapoport 1978 15 31.21 12.84 14 17.19 6.65 1.32 [0.50; 2.13] 0.0%
Pliszka 1994 20 11.20 17.20 22 10.50 4.50 0.06 [−0.55; 0.66] 7.8%
Hanna 1996a 12 13.70 6.00 16 22.10 13.60 −0.74 [−1.52; 0.04] 5.9%
Hanna 1996b 15 2.30 0.90 16 2.80 1.10 −0.48 [−1.20; 0.23] 6.5%
Anderson 2000 200 931.56 480.44 51 1060.00 500.00 −0.26 [−0.57; 0.04] 12.8%
Konrad 2003 31 26.10 10.47 26 24.46 9.49 0.16 [−0.36; 0.68] 9.0%
Dvoráková 2007 57 22.51 9.97 17 15.55 4.37 0.76 [0.21; 1.32] 8.5%
Random effects model −0.02 [−0.25; 0.22] 100.0%
Prediction interval [−0.70; 0.67]
Heterogeneity: I^2 = 47.3%, τ^2 = 0.0876, p = 0.0257
−2 −1 0 1 2
Increased in controls
Increased in ADHD