
Study
ADHD
N
Mean
SD
Control
N
Mean
SD
Standardised Mean Difference
SMD
95% CI
Weight
Irwin 1981 * 55 0.79 0.46 38 0.62 0.22 0.44 [0.02; 0.86] 10.7%
Comings 1990 * 127 92.81 55.39 109 97.61 43.44 −0.10 [−0.35; 0.16] 17.2%
Novkovic 2009 * 84 1.41 0.50 30 1.36 0.48 0.11 [−0.31; 0.52] 10.8%
Molina−Carballo 2013 * 136 20.18 20.40 42 25.22 25.66 −0.23 [−0.58; 0.12] 13.2%
Wang 2018 * 216 164.25 88.39 216 191.61 88.26 −0.31 [−0.50; −0.12] 20.6%
Jawad 2019 * 56 121.70 30.31 30 85.64 13.31 1.39 [0.90; 1.88] 0.0%
Raghavan 2022 * 269 0.04 1.01 326 0.02 0.95 0.02 [−0.14; 0.18] 22.0%
Moriarty 2011 15 152.59 59.47 20 157.15 46.06 −0.09 [−0.76; 0.58] 5.5%
Random effects model −0.05 [−0.23; 0.12] 100.0%
Prediction interval [−0.53; 0.43]
Heterogeneity: I^2 = 58.8%, τ^2 = 0.0299, p = 0.0238
−1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5
Increased in controls
Increased in ADHD