


MLÉKÁRNA, KDE SE BARVÍ ZUBY — všechno, co tam je, na sebe váže vápník.




CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Konev mléka
Chelatace s Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+} a Fe — nezapíjet mlékem, neužívat s antacidy, železem a vápníkem.
- 2 Obarvený zub
Ukládá se do mineralizující tkáň; šedohnědé zbarvení je UVNITŘ skloviny a dentinu — bělením ani leštěním se neodstraní.
- 3 Dítě u plotu
Kontraindikace do 8 let věku, v graviditě a při kojení — hypoplazie skloviny a zbarvení zubů.
- 4 Pálící slunce
Fotosenzitivita — pacienta je nutné varovat před sluněním.
- 5 Terč s číslem 30
Blokáda 30S podjednotky ribozomu = PROTEOSYNTÉZA, nikoli buněčná stěna. Bakteriostatické.
- 6 Klíště a pavouk
Široké spektrum včetně atypických: chlamydie, mykoplazmata, borrelie, rickettsie. Doxycyklin je hlavní zástupce.
- 7 Šedé miminko na obloze
Amfenikoly — chloramfenikol blokuje 50S. Gray baby syndrom u novorozence a aplastická anémie (typ B).

⚠ Ve zdroji katedry je u tetracyklinů uvedena inhibice buněčné stěny — to je chyba. Stěnu blokují betalaktamy a glykopeptidy.

VYPRAHLÁ POUŠŤ — atropin vysušil krajinu i člověka: sucho, horko, rudá kůže, rozšířené zorničky.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Vyschlá půda**
Blokáda muskarinových receptorů — sucho v ústech, vyschlé sliznice, zástava pocení („suchý jako kost“).
- 2 Rozpálený teploměr**
Bez pocení stoupá teplota — hypertermie, u dětí nebezpečná („horký jako pec“). Kůže je suchá a zarudlá.
- 3 Obrovské oko na obloze**
Mydriáza a paralýza akomodace. ⚠ Kontraindikací je glaukom s uzavřeným úhlem — rozšířená duhovka uzavře komorový úhel.
- 4 Splašené srdce**
Blokáda M2 v srdci → tachykardie. Atropin se proto podává u bradykardie.
- 5 Zamčený záchod**
Retence moči (pozor u hyperplazie prostaty) a zácpa až paralytický ileus.
- 6 Šílený kloboučník**
Centrální anticholinergní syndrom — neklid, zmatenost, delirium. Antidotem je FYSOSTIGMIN (terciární amin, projde do CNS).
- 7 Rozepnuté plíce**
Ipratropium a tiotropium inhalačně u CHOPN a astmatu — bronchodilatace bez systémových účinků.

⚠ Butylskopolamin je KVARTÉRNÍ amin — neprojde do CNS, takže neseseduje ani nevyvolá delirium. Atropin a skopolamin (terciární) ano.

ZELINÁŘSTVÍ S PAVOUČÍ SÍTÍ — čím víc zeleniny v košíku, tím hůř warfarin funguje.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Bedna se zelím

Warfarin je antagonist vitaminu K — listová zelenina a brokolice jeho účinek **SNIŽUJÍ**. Účinek se sleduje pomocí INR.

2 Pavučina nad pultem

Blokuje vitamin K-epoxidreduktázu → chybí faktory II, VII, IX a X.

3 Přesýpací hodiny

Nástup trvá 3–5 dní. Nejkratší poločas mají proteiny C a S — proto na začátku hrozí **PARADOXNÍ** trombóza a kožní nekróza; překrývá se heparinem.

4 Lahvička antibiotik

Antibiotika likvidují střevní bakterie tvořící vitamin K → INR stoupá. Totéž amiodaron, metronidazol, azoly, NSA a alkohol.

5 Těhotná zákaznice

⚠ Warfarin je v graviditě teratogenní — tam patří nízkomolekulární heparin.

6 Injekce vitaminu K

Antidotum warfarinu: vitamin K, při závažném krvácení koncentrát protrombinového komplexu.

7 Terč Xa a IIa

DOAC: dabigatran (přímý inhibitor trombinu, antidotum idarucizumab) a xabany — rivaroxaban, apixaban, edoxaban (inhibitory Xa, antidotum andexanet alfa). Fixní dávka, bez monitorace.

⚠ U mechanické chlopenní náhrady a u antifosfolipidového syndromu zůstává warfarin jedinou možností — DOAC tam selhávají.