



1. Si lavi le mani e si sieda o stia in piedi in posizione comoda.
2. Apra il sacchetto di alluminio con i 5 contenitori monodose.
3. Prenda 1 contenitore monodose dal sacchetto di alluminio, lasciandovi i contenitori rimanenti.
4. Agiti delicatamente il contenitore monodose.
5. Giri il cappuccio per spezzarlo **(figura 1)**.
6. Usi un dito per abbassare delicatamente la palpebra inferiore dell'occhio da trattare **(figura 2)**.
7. Inclini la testa all'indietro guardando il soffitto.
8. Posizioni la punta del contenitore monodose vicino all'occhio, senza arrivare a toccarlo.
9. Prema delicatamente per far cadere una goccia del medicinale nell'occhio, poi lasci andare la palpebra inferiore.
10. Strizzi l'occhio un paio di volte in modo che il medicinale si diffonda in tutto l'occhio.
11. Dopo l'uso di Catiolanze, prema delicatamente un dito sull'angolo interno dell'occhio trattato, in prossimità del naso. Mantenga la pressione per un minuto, tenendo l'occhio chiuso **(figura 3)**.
Qui si trova un piccolo canale di drenaggio delle lacrime dall'occhio verso il naso. Premendo in questo punto, chiude l'apertura di questo canalino di drenaggio. Ciò aiuta a impedire che Catiolanze si diffonda nel resto del corpo.
12. Ripeta i punti da 6 a 11 per l'altro occhio, se il medico Le ha detto di usare il collirio in entrambi gli occhi.
13. Dopo l'uso smaltisca il contenitore monodose. Non lo conservi per riutilizzarlo.