

2019 年全国硕士研究生入学统一考试

数学（三）试题参考答案

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1、当 $x \rightarrow 0$ 时，若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】C

【解析】当 $x \rightarrow 0$ 时， $x - \tan x \sim -\frac{x^3}{3}$ ，则 $k = 3$ ，所以选 C。

2、已知方程 $x^5 - 5x + k = 0$ 有 3 个不同的实根，则 k 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, -4)$ B. $(4, +\infty)$ C. $[-4, 4]$ D. $(-4, 4)$

【答案】D.

【解析】令 $f(x) = x^5 - 5x + k$ ，由 $f'(x) = 5x^4 - 5 = 0$ 得 $x = \pm 1$ ，当 $x < -1$ 时， $f'(x) > 0$ ，当 $-1 < x < 1$ 时， $f'(x) < 0$ ，当 $x > 1$ 时， $f'(x) > 0$ ，又由于 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ， $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ，方程要有三个不等实根，只需要 $f(-1) = 4 + k > 0$ ， $f(1) = -4 + k < 0$ ，因此 k 的取值范围为 $-4 < k < 4$ 。

3、已知微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + e^x$ ，则 a, b, c 依次为 ()

- A. 1, 0, 1 B. 1, 0, 2 C. 2, 1, 3 D. 2, 1, 4

【答案】D.

【解析】由通解形式知， $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ ，故特征方程为 $(\lambda + 1)^2 = \lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$ ，所以 $a = 2, b = 1$ ，又由于 $y^* = e^x$ 是 $y'' + 2y' + y = ce^x$ 的特解，代入得 $c = 4$ 。

4、若 $\sum_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛，则 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 条件收敛 B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛 C. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛 D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散

【答案】B.

【解析】由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛知， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{n} = 0$ ，故当 n 充分大时， $\left| \frac{v_n}{n} \right|, 1$ 。所以

$|u_n v_n| = \left| nu_n \cdot \frac{v_n}{n} \right|, |nu_n|$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛.

5、设 A 是四阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中只有 2 个向量, 则 A^* 的秩是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】 A.

【解析】 由于方程组基础解系中只有 2 个向量, 则 $4 - r(A) = 2$, 所以 $r(A^*) = 0$.

6、设 A 是 3 阶实对称矩阵, E 是 3 阶单位矩阵. 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T Ax$ 规范形为 ()

- A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ C. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

【答案】 C

【解析】 由 $A^2 + A = 2E$, 可知矩阵的特征值满足方程 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 解得, $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -2$. 再由 $|A| = 4$, 可知 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -2$, 所以规范形为 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. 故答案选 C.

7、设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 充分必要条件是 ()

- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ B. $P(AB) = P(A)P(B)$
C. $P(\overline{AB}) = P(\overline{BA})$ D. $P(AB) = P(\overline{AB})$

【答案】 C

【解析】 $P(\overline{AB}) = P(\overline{BA}) \Leftrightarrow P(A) - P(AB) = P(B) - P(AB) \Leftrightarrow P(A) = P(B)$; 故选 C.

8、设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - Y| < 1\} = ()$

- A. 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关 B. 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关
C. 与 μ, σ^2 都有关 D. 与 μ, σ^2 都无关

【答案】 A

【解析】 $X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$, 所以 $P\{|X - Y| < 1\} = \Phi\left(\frac{1-0}{\sqrt{2}\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-1-0}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1$;

选 A

二、填空题: 9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分.

9、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 e^{-1} .

【解析】 $\left[\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n \times (n+1)} \right]^n = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = e^{-1}$.

10、曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$) 的拐点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 $(\pi, -2)$.

【解析】 令 $y'' = -x \sin x = 0$, 可得 $x = 0$, $x = \pi$, 又 $y''' = -\sin x - x \cos x$, 因 $y'''(0) = 0$, $y'''(\pi) = \pi \neq 0$, 因此拐点坐标为 $(\pi, -2)$.

11、已知 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$, 则 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 $\frac{1}{18}(1-2\sqrt{2})$.

【解析】 $f'(x) = \sqrt{1+x^4}$, 且 $f(1) = 0$. 因此

$$\int_0^1 x^2 f(x) dx = \frac{1}{3} \int_0^1 f(x) dx^3 = \frac{1}{3} \left[x^3 f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x^3 \sqrt{1+x^4} dx \right] = \frac{1}{18}(1-2\sqrt{2}).$$

12、 A 、 B 两商品的价格分别为 P_A 、 P_B , 需求函数 $Q_A = 500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2$,

$P_A = 10$, $P_B = 20$, 求 A 商品对自身价格的需求弹性 $\eta_{AA} = \underline{\hspace{2cm}}$ ($h > 0$).

【答案】 0.4.

【解析】 因为 $\eta_{AA} = -\frac{P_A}{Q_A} \cdot \frac{dQ_A}{dP_A} = -\frac{P_A}{Q_A} \cdot (-2P_A - P_B)$, 将 $P_A = 10$, $P_B = 20$, $Q_A = 1000$

代入, 可得 $\eta_{AA} = \frac{10}{1000} \cdot 40 = 0.4$.

13、 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{bmatrix}$, $Ax = b$ 有无穷多解, 求 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 1.

【解析】 因为 $Ax = b$ 有无穷多解, 故 $r(A) = r(A, b) < 3$, 对矩阵 (A, b) 作初等行变换, 因为

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2 - 1 & a - 1 \end{bmatrix},$$

故 $a^2 - 1 = a - 1 = 0$ ，因此 $a = 1$ 。

14、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数， EX 为

X 的数学期望，则 $P\{F(X) > EX - 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】 $\frac{2}{3}$ 。

【解析】由条件可得 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{4}{3}$ ，且可求得分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

故可得 $P\{F(X) > EX - 1\} = P\{F(X) > \frac{1}{3}\} = P\{\frac{2}{\sqrt{3}} < X < 2\} = \frac{2}{3}$ 。

三、解答题：15~23 小题，共 94 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15、已知 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0, \\ xe^x + 1, & x \leq 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$ ，并求 $f(x)$ 的极值。

【解析】 $x > 0$ 时， $f'(x) = (e^{2x \ln x})' = e^{2x \ln x} (2 \ln x + 2)$ ； $x < 0$ 时， $f'(x) = (x+1)e^x$ ；

$$\text{又 } f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x \ln x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \ln x = -\infty,$$

所以 $f'(0)$ 不存在，因此

$$f'(x) = \begin{cases} 2x^{2x}(1 + \ln x), & x > 0, \\ (x+1)e^x, & x < 0. \end{cases}$$

令 $f'(x) = 0$ ，得驻点 $x_1 = -1, x_3 = \frac{1}{e}$ ；另外 $f(x)$ 还有一个不可导点 $x_2 = 0$ ；

又 $(-\infty, -1)$ 为单调递减区间, $(-1, 0)$ 为单调递增区间, $(0, \frac{1}{e})$ 为单调递减区间, $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 为

单调递增区间; 因此有极小值 $f(-1) = 1 - \frac{1}{e}$ 和极小值 $f(\frac{1}{e}) = e^{-\frac{2}{e}}$, 极大值 $f(0) = 1$.

16、已知 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $g(x, y) = xy - f(x+y, x-y)$, 求

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

【解析】依题意知,

$$\frac{\partial g}{\partial x} = y - f'_1(x+y, x-y) - f'_2(x+y, x-y),$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = x - f'_1(x+y, x-y) + f'_2(x+y, x-y).$$

因为 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 故 $f''_{12} = f''_{21}$, 因此,

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = -(f''_{11} + f''_{12}) - (f''_{21} + f''_{22}) = -f''_{11} - 2f''_{12} - f''_{22},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = 1 - (f''_{11} - f''_{12}) - (f''_{21} - f''_{22}) = 1 - f''_{11} + f''_{22},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -(f''_{11} - f''_{12}) + (f''_{21} - f''_{22}) = -f''_{11} + 2f''_{12} - f''_{22}.$$

所以, $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1 - 3f''_{11} - f''_{22}.$

17、 $y = y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解.

(1) 求 $y(x)$;

(2) 设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

【解析】 $y(x) = e^{\int x dx} (\int e^{\int -x dx} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\frac{x^2}{2}} dx + C) = e^{\frac{x^2}{2}} (\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx + C) = e^{\frac{x^2}{2}} (\sqrt{x} + C);$

又由 $y(1) = \sqrt{e}$ 得 $C = 0$, 最终有 $y(x) = \sqrt{x} e^{\frac{x^2}{2}}.$

(2) 所求体积

$$V = \int_1^2 \pi(\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}})^2 dx = \pi \int_1^2 x e^{x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{x^2} \Big|_1^2 = \frac{\pi}{2} (e^4 - e).$$

18、求曲线 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

【解析】设在区间 $[n\pi, (n+1)\pi] (n=0, 1, 2, \dots)$ 上所围的面积记为 u_n , 则

$$u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx = (-1)^n \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-x} \sin x dx;$$

$$\text{记 } I = \int e^{-x} \sin x dx, \text{ 则 } I = -\int e^{-x} d\cos x = -(e^{-x} \cos x - \int \cos x de^{-x})$$

$$= -e^{-x} \cos x - \int e^{-x} d\sin x = -e^{-x} \cos x - (e^{-x} \sin x - \int \sin x de^{-x}) = -e^{-x} (\cos x + \sin x) - I,$$

$$\text{所以 } I = -\frac{1}{2} e^{-x} (\cos x + \sin x) + C;$$

$$\text{因此 } u_n = (-1)^n \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-x} (\cos x + \sin x) \Big|_{n\pi}^{(n+1)\pi} = \frac{1}{2} (e^{-(n+1)\pi} + e^{-n\pi});$$

(这里需要注意 $\cos n\pi = (-1)^n$)

$$\text{因此所求面积为 } \sum_{n=0}^{\infty} u_n = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\pi} = \frac{1}{2} + \frac{e^{-\pi}}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\pi} - 1}.$$

19、设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx (n=0, 1, 2, \dots)$

(1) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减; 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2} (n=2, 3, \dots)$

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$

【解析】(1) $a_{n+1} - a_n = \int_0^1 x^n (x-1) \sqrt{1-x^2} dx < 0$, 所以 $\{a_n\}$ 单调递减.

$$a_n = -\frac{1}{3} \int_0^1 x^{n-1} d(1-x^2)^{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3} \left[x^{n-1} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 - \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx^{n-1} \right]$$

$$= \frac{n-1}{3} \int_0^1 x^{n-2} (1-x^2) \sqrt{1-x^2} dx = \frac{n-1}{3} \left(\int_0^1 x^{n-2} \sqrt{1-x^2} dx - \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx \right)$$

$$= \frac{n-1}{3} (a_{n-2} - a_n),$$

从而有 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2} (n=2,3,\cdots)$;

(2) 因为 $\frac{a_n}{a_{n-2}} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < \frac{a_n}{a_n} = 1$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+2} = 1$, 由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$.

20、已知向量组

$$(I) \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2+3 \end{bmatrix}, (II) \beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ a+3 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1-a \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{bmatrix},$$

若向量组 (I) 和向量组 (II) 等价, 求 a 的取值, 并将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

【解析】令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 因向量组 (I) 与 (II) 等价, 故

$r(A) = r(B) = r(A, B)$, 对矩阵 (A, B) 作初等行变换.

$$(A, B) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 4 & a^2+3 & a+3 & 1-a & a^2+3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 & 1-a & a^2-1 \end{bmatrix}$$

当 $a=1$ 时, $r(A) = r(B) = r(A, B) = 2$; 当 $a=-1$ 时, $r(A) = r(B) = 2$, 但 $r(A, B) = 3$;

当 $a \neq \pm 1$ 时, $r(A) = r(B) = r(A, B) = 3$. 综上, 只需 $a \neq -1$ 即可.

$$(1) \text{ 当 } a=1 \text{ 时, } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 故 } \beta_3 = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 \text{ 的等价}$$

$$\text{方程组为 } \begin{cases} x_1 = 3 - 2x_3, \\ x_2 = -2 + x_3. \end{cases} \text{ 得通解为 } \mathbf{x} = k \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}),$$

从而 $\beta_3 = (3-2k)\alpha_1 + (k-2)\alpha_2 + k\alpha_3$ (k 为任意常数);

$$(2) \text{ 当 } a \neq \pm 1 \text{ 时, } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 得 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

所以 $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$.

21、已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{bmatrix}$ 相似,

(I) 求 x, y ;

(II) 求可逆矩阵 \mathbf{P} 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$

【解析】(1)

方法一: 相似矩阵有相同的特征值, 因此有 $\begin{cases} -2+x-2=2-1+y, \\ |\mathbf{A}|=|\mathbf{B}|, \end{cases}$

又 $|\mathbf{A}| = -2(4-2x)$, $|\mathbf{B}| = -2y$, 所以 $x=3, y=-2$.

方法二:

观察得 \mathbf{A} 必有一个特征值为 -2 , \mathbf{B} 的特征值为 $2, -1, y$, 因此由 \mathbf{A}, \mathbf{B} 相似得两个矩阵特征值相等, 得 $y = -2$, 再由 $-2+x-2=2-1+y$, 得 $x=3$

(2) 易知 \mathbf{B} 的特征值为 $2, -1, -2$; 因此

$$\mathbf{A} - 2\mathbf{E} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 取 } \xi_1 = (-1, 2, 0)^T,$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{E} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 取 } \xi_2 = (-2, 1, 0)^T,$$

$$\mathbf{A} + 2\mathbf{E} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 取 } \xi_3 = (-1, 2, 4)^T$$

$$\text{令 } P_1 = (\xi_1, \xi_2, \xi_3), \text{ 则有 } P_1^{-1}\mathbf{A}P_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix};$$

$$\text{同理可得, 对于矩阵 } \mathbf{B}, \text{ 有矩阵 } P_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_2^{-1}\mathbf{B}P_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \text{ 所以}$$

$$P_1^{-1}\mathbf{A}P_1 = P_2^{-1}\mathbf{B}P_2, \text{ 即 } \mathbf{B} = P_2P_1^{-1}\mathbf{A}P_1P_2^{-1}, \text{ 所以}$$

$$P = P_1 P_2^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

22、设随机变量 X 与 Y 相互独立， X 服从参数为 1 的指数分布， Y 的概率分布为 $P(Y=-1)=p$ ， $P(Y=1)=1-p$ ，($0 < p < 1$)，令 $Z=XY$ 。

(1) 求 Z 的概率密度；

(2) p 为何值时， X 与 Z 不相关；

(3) X 与 Z 是否相互独立？

【解析】(1) Z 的分布函数为 $F_Z(z) = P(XY \leq z) = P(Y=-1, X \geq -z) + P(Y=1, X \leq z)$ ，

因为 X 与 Y 相互独立，且 X 的分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 1-e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

因此， $F_Z(z) = p[1-F_X(-z)] + (1-p)F_X(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0, \\ p + (1-p)(1-e^{-z}), & z \geq 0. \end{cases}$

所以， Z 的概率密度为 $f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0, \\ (1-p)e^{-z}, & z \geq 0. \end{cases}$

(2) 当 $Cov(X, Z) = EXZ - EX \cdot EZ = EX^2 \cdot EY - (EX)^2 \cdot EY = DX \cdot EY = 0$ 时， X 与 Z

不相关. 因为 $DX=1$ ， $EY=1-2p$ ，故 $p=\frac{1}{2}$ 。

(3) 不独立. 因为 $P(0 \leq X \leq 1, Z \leq 1) = P(0 \leq X \leq 1, XY \leq 1) = P(0 \leq X \leq 1) = 1-e^{-1}$ ，

而 $P(Z \leq 1) = F_Z(1) = p + (1-p)(1-e^{-1})$ ，故 $P(0 \leq X \leq 1, Z \leq 1) \neq P(0 \leq X \leq 1)P(Z \leq 1)$ ，

所以 X 与 Z 不独立。

23、设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

μ 是已知参数， $\sigma > 0$ 是未知参数， A 是常数。 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 简单随机样本。

(1) 求 A ；

(2) 求 σ^2 的最大似然估计量。

【解析】(1) 由密度函数的规范性可知 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ ，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{A}{\sigma} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt = \frac{\sqrt{2\pi}A}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt = A\sqrt{\frac{\pi}{2}} = 1,$$

$$\text{得 } A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

$$(2) \text{ 设似然函数 } L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \cdot \sigma^{-n} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2},$$

$$\text{取对数, } \ln L(\sigma^2) = \frac{n}{2} \ln\left(\frac{2}{\pi}\right) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2;$$

$$\text{对 } \sigma^2 \text{ 求导, } \frac{d \ln L(\sigma^2)}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^4},$$

$$\text{令导数为零, 解得 } \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2,$$

$$\text{故 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$