パネルデータ: Advanced

川田恵介

2025-07-06

1 推定: 2 × Many case

$1.1 2 \times Many case$

- ・ 2×2の議論は、多期間に拡張できる
 - ずっとD=0 のグループ VS 途中でD=1 に切り替わったグループ
 - ▶ Event study と呼ばれる推定方法が活用可能

1.2 Event study

• 4期間パネルで、Treatment Group に対して、3期目に介入が入るのであれば、

$$E[Y\mid Z_{it}] = \beta_1 Z_1 + \underbrace{\beta_2}_{=0} Z_2 + \beta_3 Z_3 + \beta_4 Z_4 + f_i + f_t$$

- $Z_t = \text{Treatment Group}$ かつ t 期目であれば 1 、それ以外であれば 0
 - ▶ Control Group であれば、常に 0

1.3 Event study

• 識別の仮定のもとで、以下の式を推定すれば、動学効果、および Pallael trends のチェックができる

$$E[Y \mid Z_{it}] = \underbrace{\beta_1}_{PallarelTrendO \, \rlap{\text{!`}}{\ \ } \ \, \& \, \rlap{\text{!`}} \ \, Z_1 + \beta_3 Z_3 + \beta_4 Z_4 + f_i + f_t$$

1.4 別表現

- 別の表現もよく用いられる
- E_i :個人 i に対して介入が行われる時期
 - ・ Control group については、 $E_i = \infty$

1.5 別表現

• $\beta_{-1} = 0$ と基準化:

$$E[Y_{it} \mid E_i = e] = \sum_{l=l_-}^{l_+} \beta_l \mathbb{I}[t-e=l] + f_i + f_t$$

- $\mathbb{I}[t-e=l]=t-e$ が l であれば 1、それ以外は 0
- ・ $l_-, l_+ =$ 研究者が定める分析期間


1.6 R Example

```
#|
DataLong = mutate(
  DataLong,
  Z = case_when(
    TreatGroup == 1 ~ 3,
    .default = 100000
)
)

Model = fixest::feols(
  Y ~ sunab(Z, Period) | Period + ID,
  DataLong,
  panel.id = "ID"
)
```

1.7 R Example

Effect on Y



2 Staggerd design

2.1 一般化の限界

- ・ 2-group 以上での推定方法は、まだよく分かっていない
 - ▶ 推定モデルの正しさに、結果が強く依存
- ・ 例外は、 介入が徐々に行われるケース (Staggered design)
 - ・直近で研究が進む

2.2 応用例: Marriage premium/penalty

- 研究対象: 結婚"経験"が労働供給に与える影響を推定したい
- データ: 徐々に結婚していく
 - ▶ 離婚したとしても、結婚経験がある D=1 と定義する
 - ▶ Control group は一度も結婚したことがないグループ

2.3 問題点

- 2×2 であれば、**識別の仮定の下で**、Treatment Group 内平均効果の信頼区間を提供
- 2×2以外では?
 - 推定のための単純化が、不適切な比較を生み出す可能性
 - 個別因果効果が全て正でも、負の平均効果が推定されてしまう


2.4 Simple Example

- 2期間モデル: 結婚が就業状態に与える因果効果を推定するために、以下を比較
 - ▶ Treatment Group: 2期目に結婚
 - ▶ Control Groups: ずっと未婚 ずっと既婚
- Two Ways Fixed Effect Model を推定すると、何らかの値が算出されるが、基本的に不適切

2.5 Simple Example

- シナリオ:
 - ▶ 結婚した期には、因果効果がほとんどない
 - ▶ 2期目以降に労働時間を低下させる

2.6 例



• 2期目に結婚したグループの因果効果を推定する際に、ずっと未婚と 1期目に結婚グループを全て Control group として使用してしまう

2.7 問題点

- 識別の仮定ではなく、推定のために導入された仮定 (Two way fixed effect model)が 問題
- D が変化していない(介入が生じていない 生じた後)期間を全て Control group として使ってしまう
- 2×2では、最初から介入が生じているの事例を削除すれば良い
- 多期間の場合については、一般的な方法はよくわかっていない
 - ▶ 例外ケース: Staggered design

2.8 異質性を考慮した推定

- Sun & Abraham (2021) のアプローチを紹介
 - ▶ コホート別動学効果を集計する
- 他の手法としては、Roth et al. (2023), Miller (2023), De Chaisemartin & d'Haultfoeuille (2023) を参照

2.9 コホート別動学効果

$$E\big[Y_{i,t} \mid e,l,f_i\big] = \sum_{l} \beta_{e,l} \mathbb{I}(e,t-e=l) + f_i + f_t$$

- ・ $\beta_{e,l}$ e期目に介入を受けるグループにおける、介入発生から l 期経過した場合の因果 効果
- $\beta_{e,-1} = 0$ と基準化
- 介入発生からの期間 l と介入を受ける時期 e (コホート)に応じて、異なる平均効果を便宜的に推定

2.10 推定

• 各コホート e と control group を使って、コホート単位で平均動学効果を推定する。

2.11 例. コホート期間別平均効果

```
Model = feols(
   Y ~ sunab(Group, Period) | ID + Period,
   DataLong,
   cluster = ~ID
)
summary(Model, agg = FALSE)
```

```
OLS estimation, Dep. Var.: Y
Observations: 4,000
Fixed-effects: ID: 500, Period: 4
Standard-errors: Clustered (ID)
                   Estimate Std. Error t value
                                                Pr(>|t|)
Period::-3:cohort::4 0.270844 0.785870 0.344642 7.3051e-01
Period::-2:cohort::3 -0.291966  0.814571 -0.358429 7.2017e-01
Period::0:cohort::3    1.385846    0.753185    1.839983    6.6365e-02 .
Period::0:cohort::4 1.343240 0.850692 1.578997 1.1497e-01
Period::1:cohort::3 5.771876 0.803727 7.181386 2.5221e-12 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
RMSE: 9.23578
              Adj. R2: 0.012318
              Within R2: 0.015296
```

2.12 期間別平均効果

• $\beta_{e,l}$ の e についての平均値

```
summary(Model, agg = "period")
```

2.13 コホート別平均効果

• β_{el} の l についての平均値

```
summary(Model, agg = "cohort")
```

2.14 平均効果

・ $\beta_{e,l}$ の平均値

```
summary(Model, agg = "ATT")
```

RMSE: 9.23578 Adj. R2: 0.012318 Within R2: 0.015296

2.15 コントロール変数との併用

- ・ 個人内で変化する変数 X は導入可能 $\beta_1 X_{1.it} + ... \beta_L X_{L.it}$
- 問題点: Cross section と同様に、介入の影響を受けない変数のみ導入すべき
 - ・過去のイベントの影響を受けない変数とは???
- Callaway & Sant'Anna (2021): 時間を通じて変化しない変数 (生まれ年、性別等)について、"マッチング"し推定
 - ► did

2.16 まとめ

- 介入変数 D が 2 値の場合、推奨は
 - ▶ 2期間パネル: ずっと介入を受け続けているグループを排除し、通常の Two-way fixed effect model で推定
 - 多期間パネル: Staggered design になっているか確認し、問題なければ Sun & Abraham (2021) (他の手法は、Roth et al. (2023), Miller (2023), De Chaisemartin & d'Haultfoeuille (2023) などを参照) などの手法を用いて推定
- D が連続変数のケースなどの一般化は可能? (Callaway et al., 2024)

3 Reference

Bibliography

- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. Journal of Econometrics, 225(2), 200–230.
- Callaway, B., Goodman-Bacon, A., & Sant'Anna, P. H. (2024). Difference-in-differences with a continuous treatment.
- De Chaisemartin, C., & d'Haultfoeuille, X. (2023). Two-way fixed effects and differences-in-differences with heterogeneous treatment effects: A survey. The Econometrics Journal, 26(3), C1–C30.
- Miller, D. L. (2023). An introductory guide to event study models. Journal of Economic Perspectives, 37(2), 203–230.
- Roth, J., Sant'Anna, P. H., Bilinski, A., & Poe, J. (2023). What's trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature. Journal of Econometrics.

Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175–199.