# Imaging Math

tomixy

March 27, 2025

# **Contents**

Ι	Im	agini	ng Mathematics	9
1	有限	の数学	!	11
	1.1	数列		11
		1.1.1	数列を語る言葉	11
		1.1.2	等差数列	12
		1.1.3	漸化式	12
		1.1.4	「離散的な関数」としての視点..........................	12
	1.2	場合の	)数	13
		1.2.1	和の法則	13
		1.2.2	積の法則	14
		1.2.3	順列	15
		1.2.4	階乗	15
		1.2.5	組合せ	15
		1.2.6	二項展開とパスカルの三角形	15
2	基本	的な関	数 Table Table Ta	17
	2.1	絶対値	值	17
		2.1.1	数直線上の原点からの距離	17
		2.1.2	絶対値の性質	18
		2.1.3	数直線上の2点間の距離・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
		2.1.4	max 関数による表現	20
		2.1.5	三角不等式	20
	2.2	三角関	『数	22
		2.2.1	円周率	22
		2.2.2	直角三角形の相似	23
		2.2.3	直角三角形による測量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25

		2.2.4	三角比	26
		2.2.5	扇形の弧長と角	27
	2.3	指数関	数数	27
		2.3.1	同じ数のかけ算の指数による表記	27
		2.3.2	指数法則	27
		2.3.3	指数の拡張と指数関数	29
		2.3.4	指数関数の底の変換	32
	2.4	対数関	数	33
		2.4.1	対数:指数部分を関数で表す	33
		2.4.2	対数の性質	33
		2.4.3	常用対数と桁数	35
		2.4.4	指数関数の底の変換:対数を用いた表現	36
3	<b>少</b>	·と積分		37
3			関数の微分	37
	3.1	3.1.1	接線:拡大したら直線に近似できる	37
		3.1.2	接線の傾きとしての導関数	39
		3.1.3	微分とその関係式	41
		3.1.4	不連続点と微分可能性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
		3.1.5	導関数のさまざまな記法	42
		3.1.6	微分の性質	43
		3.1.7	<b>冪関数の微分</b>	46
		3.1.8	定数関数の微分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
		3.1.9	合成関数の微分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
		3.1.10	逆関数の微分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
			三角関数の微分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
			ネイピア数	59
			ネイピア数を底とする指数関数の微分	59
			一般の指数関数の微分	62
		3.1.15	対数関数の微分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
		3.1.16	対数微分法	63
	3.2		(分とテイラー展開	66
		3.2.1	高階微分とその表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
		3.2.2	<b>冪関数の高階微分</b>	67
		3.2.3	指数関数の高階微分	68

		0.0.4	マノミ ・見明	00
			テイラー展開	69
	3.3		関数の積分	75
		3.3.1	区分求積法:面積の再定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
		3.3.2	定積分:面積を求める積分	77
		3.3.3	微小範囲の定積分から微分へ	79
		3.3.4	不定積分:原始関数を求める積分	80
		3.3.5	原始関数による定積分の表現	81
		3.3.6	定積分の性質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
		3.3.7	不定積分の性質	86
4	線形	代数		89
			、ルの作り方	89
		4.1.1	移動の表現としてのベクトル	89
		4.1.2	高次元への対応:数ベクトル	91
		4.1.3	ベクトルの和	92
		4.1.4	ベクトルのスカラー倍	94
		4.1.5	一次結合	95
		4.1.6	基底	95
	4.2		- ルの測り方	96
5	多変	数関数	r	97
				91
6	複素		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	99
6	複素 6.1	数と複		99
6		数と複	素関数	<b>99</b> 99
6		数と複 虚数の	「 <b>素関数</b> )導入	<b>99</b> 99
6		数と複 虚数の 6.1.1	素関数   	99 99 99 100
6		態数と複 虚数の 6.1.1 6.1.2 6.1.3	[素関数 ) 導入	<ul><li>99</li><li>99</li><li>100</li><li>101</li></ul>
6	6.1	態数と複 虚数の 6.1.1 6.1.2 6.1.3	i 素関数	<ul><li>99</li><li>99</li><li>100</li><li>101</li><li>102</li></ul>
6	6.1	虚数の 6.1.1 6.1.2 6.1.3 複素数	素関数   	<ul><li>99</li><li>99</li><li>100</li><li>101</li><li>102</li><li>102</li></ul>
6	6.1	虚数の 6.1.1 6.1.2 6.1.3 複素数 6.2.1	(素関数         (2) 導入         (x² = -1 の解は存在するか?         (回転で捉える数直線の拡張)         (虚数の定義)         (数の表現)         複素数と複素平面	99 99 99 100 101 102 102
6	6.1	虚数と複 虚数の 6.1.1 6.1.2 6.1.3 複素数 6.2.1 6.2.2 6.2.3	(基素関数         (本)	99 99 99 100 101 102 102
6	6.1	虚数と複 虚数の 6.1.1 6.1.2 6.1.3 複素数 6.2.1 6.2.2 6.2.3	[素関数         0導入         x² = -1 の解は存在するか?         回転で捉える数直線の拡張         虚数の定義         枚の表現         複素数と複素平面         複素数の絶対値と偏角         複素数の極形式         枚の演算	99 99 99 100 101 102 102 104
6	6.1	虚数と複 虚数の 6.1.1 6.1.2 6.1.3 複 6.2.1 6.2.2 6.2.3 複素数	「素関数 D導入	99 99 100 101 102 102 104 106 107
6	6.1	虚数と複 虚数の 6.1.1 6.1.2 6.1.3 複素数 6.2.1 6.2.2 6.2.3 複素数 6.3.1	素関数   2   2   3   3   3   3   3   3   3   3	99 99 100 101 102 102 104 106 107 107

	6.4	オイラ	アーの公式	111
7	フー	リエ解	析	113
	7.1	波の2	つの捉え方	113
		7.1.1	空間的に捉える波・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
		7.1.2	時間的に捉える波	114
	7.2	角周波	<b>署数と正弦波</b>	114
		7.2.1	角周波数と振動数の関係	115
		7.2.2	角周波数と周期の関係	116
	7.3	偶関数	ひと奇関数	116
		7.3.1	偶関数と奇関数は異なる対称性を持つ	117
		7.3.2	積に関する性質	118
		7.3.3	和に関する性質	119
		7.3.4	偶関数・奇関数の積分	119
	7.4	直交関	別数系としての三角関数	120
		7.4.1	関数の内積と直交関数系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120
		7.4.2	sin と cos の直交性	
	7.5	フーリ	工級数	123
		7.5.1	そもそも級数とは	123
		7.5.2	有限区間で定義された関数のフーリエ級数展開	124
		7.5.3	フーリエ級数展開の周期関数への拡張	124
		7.5.4	不連続点におけるフーリエ級数の値	
		7.5.5	フーリエ級数展開の意味	
		7.5.6	フーリエ級数展開のさまざまな表現式	127
		7.5.7	奇関数のフーリエ級数(フーリエ正弦級数)	130
		7.5.8	偶関数のフーリエ級数(フーリエ余弦級数)	131
II	Αŗ	plyin	ng Mathematics	135
8	線形	システ	<u>ل</u>	137
	8.1	システ	- ムの線形性	137
II	I R	edefi	ning Mathematics	139
9	ε - δ	論法に	こよる無限の記述	141
	91	実数の	)集合	141

	9.1.1	区間	141
9.2	数列の	極限	143
	9.2.1	$\epsilon$ で「一致」をどう表現するか	143
	9.2.2	ε-N 論法による数列の収束1	145
	9.2.3	数列の極限の一意性	147
	9.2.4	定数数列の極限 1	148
	9.2.5	数列の極限の線形性	150
	9.2.6	数列の積の極限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	153
	9.2.7	数列の商の極限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	156
	9.2.8	数列の極限の大小関係の保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	158
	9.2.9	はさみうちの原理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	158
	9.2.10	ε-N 論法による数列の発散1	160
	9.2.11	追い出しの原理	163
	9.2.12	発散数列の和と積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	163
	9.2.13	数列の偶数番目と奇数番目の極限による判定 1	164
	9.2.14	数列の極限と絶対値	164
	9.2.15	逆数の数列の発散条件	164
	9.2.16	等比数列の極限 1	164
	9.2.17	項の比による収束判定	164
	9.2.18	発散数列の増加速度の比較	164
9.3	級数 .		164
9.4	関数の	極限	164
	9.4.1	$\epsilon$ - $\delta$ 論法による関数の極限	164
	9.4.2	関数の極限と数列の極限の関係	167
	9.4.3	関数の極限の性質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	167
	9.4.4	はさみうち法	167
	9.4.5	合成関数の極限	167
	9.4.6	右極限と左極限	167
9.5	関数の	連続性	167
10 実数	の連続	性 1	69
			169
		上界と下界	170
		上限と下限	
		上限定理	
			-

10.2	数列の極限再訪	171
	10.2.1 アルキメデスの公理	171
	10.2.2 収束列の有界性	171
	10.2.3 単調数列	171
	10.2.4 有界な単調数列の収束性	171
10.3	区間縮小法	172
10.4	収束する部分列	172
	10.4.1 部分列	172
	10.4.2 収束する数列の部分列の極限	172
	10.4.3 ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理	172
10.5	コーシー列と実数の完備性	172
	10.5.1 コーシー列	172
	10.5.2 実数の完備性	172
10.6	上限定理再訪	172

# Part I

# Imagining Mathematics

# Chapter 1

# 有限の数学

この章では、数を「並べる」「数える」といった、自然数がもととなる数学を考える。

# 1.1 数列

数列は、「数の並びの規則性に着目しよう」という話題として語られる。 数の並びの規則性から、賢く足し算をする知恵も導かれる。

## 1.1.1 数列を語る言葉

ある規則によって数を並べた列を数列という。

$$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$$

無限個の数が並んでいるものは無限数列、有限個の数が並んでいるものは有限数列という。

並んでいる数を項といい、最初の数は初項、有限数列の場合は最後の数を末項という。 先頭から数えてn番目の数を第n項、これは一般項ともよばれる。

具体的な数をそのまま1つずつ並べて書いてもよいが、長くなってしまう上、規則性が見えにくい。 一般項だけを {} で囲むことで、一般項で表される数の集合として

 $\{a_n\}$ 

と書くことも多い。

\* \* \*

さて、重要な規則性を持つ数列には、名前がつけられている。 まずは簡単なものから見ていこう。

## 1.1.2 等差数列

次のような規則で定まる数列は等差数列とよばれる。

初項 a<sub>1</sub> に次々と一定の数 d を足してつくられている数列



等差数列では、隣り合った 2 つの項の差がいつも一定の値 d になり、この d を等差数列の公差 という。

### 1.1.3 漸化式

初項と、項と項の間の関係を表す式があれば、その式によって初項の次の数、またその次の数、… というように、数列を復元することができる。

これはいわばドミノ倒しのようなもので、具体的に触れるのは初項だけでよい。あとは規則に従って数が決まっていく。

## 1.1.4 「離散的な関数」としての視点

数を「並べる」ということは、位置を表す自然数と、その位置にある数とのマッピング (対応づけ) としても捉えられる。

すなわち、位置を与えたらその位置にある数を返す関数

$$f(n) = a_n$$

という形で数列を捉えることもできる。

このとき、数列という名前の関数 f は、n から  $a_n$  を定める規則のことになる。

1.2. 場合の数

自然数 1, 2, 3, ... のそれぞれに対して、数  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ... が定まっているとき、この対応づける規則を数列という。





## [Topo 1: 図:点で数列をプロットしたグラフ]

f(n) のグラフを書こうとしても、「線」にはならない。

n は自然数 (1, 2, 3, ...) という飛び飛びに並んだ数であるため、各自然数の間の数に対しては f(n) の値が決まらない。そのため、f(n) はぽつりぽつりと点を並べて表すしかない。

このように、飛び飛びに並んでいるものは離散的と言われる。

離散的なデータを扱う場面では、データを数列(離散的な関数)として見て調べる視点も重要になる。

# 1.2 場合の数


何通りの「場合」が起こり得るかを数え上げたものを場合の数という。

## 1.2.1 和の法則

たとえば、A市からB市まで行ける路線が、


- 電車で4路線
- バスで3路線


あるとする。



このとき、電車かバスの「どちらか」でA市からB市まで行くときには、4+3=7パターンの路線から選ぶことになる。

₹∏Ø	法則													
		£1 = +3 >	r		<b>-</b> 7									
	Bは同時													
$\mathbf{A} \mathcal{O}_{\mathbf{A}}$	起こりた	iかm i	<b>通り、</b> ]	3 の走	己こり	方が、	n 通り	)ある	るとき	`				






## 1.2.2 積の法則

今度は、A市からB市へ、駅を経由して行く場合を考えてみる。

A市から駅までは電車で、駅からB市まではバスで行くとする。 つまり、電車とバスを「両方使って」移動することになる。


- A市から駅までの電車は4路線
- 駅からB市までのバスは3路線

どの路線の電車で行くかを決めたら、今度はどの路線のバスに乗るかを選ぶことになる。




4通りの中からどの路線の電車を選んでも、次に乗るバスは3通りの中から選ぶ必要があるので、 電車の路線1つにつき、次に乗るバスの路線は3パターン考えられる。

「電車1路線につきバス3路線」というパターンの数は、かけ算で表すことができそうだ。 電車とバスを乗り継ぐ場合の路線の選び方は、3×4 = 12 通りになる。 1.2. 場合の数



「AとBがともに起こる」とは、Aが起こった後にBが起こる場合を指す。



- 1.2.3 順列
- 1.2.4 階乗
- 1.2.5 組合せ
- 1.2.6 二項展開とパスカルの三角形


# Chapter 2

# 基本的な関数

# 2.1 絶対値

## 2.1.1 数直線上の原点からの距離

実数 a の絶対値は、数直線上の原点 0 から a までの距離として定義される。 3 と -3 を例に考えると、どちらも絶対値は 3 となる。




-3 の絶対値が 3 であるように、負の数の絶対値は元の数から符号を取ったもの(元の数を -1 倍したもの)となる。

まとめると、

- 正の数の絶対値は元の数そのまま(0の絶対値もそのまま0)
- 負の数の絶対値は元の数の -1 倍


というように、絶対値は場合分けして定義される。



## 2.1.2 絶対値の性質

#### 絶対値は0以上の数

負の数の場合は、符号を取って正の数にしたものを絶対値とすることから、絶対値が負の数になることはない。




## 中身の符号によらず絶対値は同じ

3も-3も、絶対値はともに3だった。つまり、

$$|3| = |-3| = 3$$


このことを一般化したのが、次の性質である。

2.1. 絶対値 19



#### 積の絶対値は絶対値の積

絶対値の計算と、積の計算は、どちらを先に行っても結果が同じになる。



aとbがともに正の数なら、

- $a \ge b$  は正の数なので、|a| = a、|b| = b
- ab も正の数なので、|ab| = ab

となり、|ab| = |a||b|が成り立つことがわかる。

では、片方が負の数の場合はどうだろうか。  $a \rightarrow b$  のどちらかにマイナスの符号をつけてみると、

$$|-ab| = |-a||b|$$

$$|-ab| = |a|| - b|$$

のどちらかとなるが、前の節で解説した |-X|=|X| の関係から、これらはどちらも |ab|=|a||b| に帰着する。

aとbの両方が負の数の場合は、

$$|ab| = |-a||-b|$$


となるが、これも |-X| = |X| の関係を使えば、やはり |ab| = |a||b| に帰着する。

## 2.1.3 数直線上の2点間の距離



### 2.1.4 max 関数による表現


実数 a の絶対値は、「a と -a のうち大きい方を選ぶ」という考え方でも表現できる。 たとえば、3 と -3 の絶対値はともに 3 だが、これは 3 と -3 のうち大きい方(正の数の方)を絶対値として採用した、という見方もできる。



ここで登場した max は、「複数の数の中から最大のものを選ぶ」という操作を表している。

## 2.1.5 三角不等式

2 つの実数 a と b の「絶対値の和」と「和の絶対値」の間には、次のような大小関係がある。






この形の不等式は、実は今後登場するベクトルの長さ (ノルム) や、複素数の絶対値に対して も成り立つ。三角不等式と呼ばれる所以は、ベクトルに関する三角不等式で明らかになる。 2.1. 絶対値 21

絶対値の定義から、この不等式の証明を考えてみよう。

a の絶対値 |a| は、a から符号を取り払ったものであるから、逆に絶対値 |a| に + か - の符号をつけることで、元の数 a に戻すことができる。

a が負の数だったなら、-|a| とすれば a に戻る。正の数だったなら、|a| がそのまま a に一致する。



a は原点からの距離が |a| の場所にあり、a は -|a| か |a| のどちらかに一致する。 どちらに一致するかはわからないので、次のような不等式で表しておく。

$$-|a| \le a \le |a|$$

b についても、同じように考えることができる。

$$-|b| \le b \le |b|$$

これらの不等式を使って、さらに式変形を行うことで、三角不等式を導くことができる。

Proof: 絶対値に関する三角不等式

絶対値の定義から、次の不等式が成り立つ。

 $-|a| \le a \le |a|$ 

 $-|b| \le b \le |b|$ 

両辺を足し合わせて、次の不等式を得る。

$$-(|a| + |b|) \le a + b \le |a| + |b|$$

 $-(|a|+|b|) \le a+b$  の両辺を -1 倍することで、次の関係も得られる。(不等式の両辺を -1 倍すると、不等号の向きが逆転することに注意)

$$|a| + |b| \ge -(a+b)$$

ここまでで得られた、a+bについての不等式をまとめると、次のようになる。

$$|a| + |b| \ge a + b$$
$$|a| + |b| \ge -(a + b)$$

一方、a+bの絶対値は、定義より次のように表せる。

$$|a + b| = \max\{a + b, -(a + b)\}\$$

a+b と -(a+b) のうち大きい方が |a+b| となるが、a+b と -(a+b) はどちらも |a|+|b| 以下となることがすでに示されているので、


$$|a+b| \le |a| + |b|$$

となり、定理は示された。 ■

# 2.2 三角関数

## 2.2.1 円周率

すべての円は、お互いを拡大もしくは縮小した関係にある。



円  $C_2$  が、円  $C_1$  を k 倍に拡大したものだとすると、その直径や円周も  $C_1$  の k 倍となる。

$$d_2 = k \cdot d_1$$

$$l_2 = k \cdot l_1$$


2.2. 三角関数 23

この2つの式を各辺どうし割ることで、kが約分されて消え、直径と円周の比が等しくなることがわかる。

$$\frac{d_2}{l_2} = \frac{d_1}{l_1}$$

円の直径と円周の比ずべての円において、直径と円周の長さの比は一定である。

そして、この一定の比率は、円周率πとして知られている。



πの定義式を変形すると、円周の長さを求める式が得られる。


半径をrとすると、直径d=2rであるから、

$$l = \pi \cdot d = 2\pi r$$

円周の長さ 円の円周の長さ l は、半径 r を使って次のように表される。  $l=2\pi r$ 

## 2.2.2 直角三角形の相似

ある図形のすべての辺をr倍したとき、元の図形とr倍後の図形は相似であるという。



元の図形の辺の比をa:b:cとすると、r倍後の図形の辺の比はra:rb:rc=a:b:cとなる。

このように、相似な図形には「辺の比が等しい」という性質がある。

#### 2 つの角が一致する三角形同士は相似

三角形の内角の和は 180° であるから、2 つの角の大きさが等しければ、もう 1 つの角の大きさも等しくなる。

つまり、2 つの角の大きさが一致する 2 つの三角形は、辺の間の角度は変わらず、各辺の長さを一 定倍したものなので、相似といえる。

「辺の間の角度がすべて同じ」ことと「各辺の長さが一定倍されている」ことがうまく結びつか ない人は、次の図を見てみよう。


もしも辺の長さの拡大率が辺によって異なるとしたら、辺の間の角度を変えない限り、頂点として辺同士を結ぶことができない。



#### 1 つの鋭角が一致する直角三角形同士は相似

ある1つの角が直角である三角形を、直角三角形という。

2つの角が一致する三角形同士が相似であるなら、直角三角形の場合は、1つの鋭角が一致するだけで相似であることがわかる。



2.2. 三角関数 25

つまり、鋭角が等しいすべての直角三角形は、お互いを拡大もしくは縮小した関係(互いに相似の関係)にあり、3辺の比も等しくなる。

言い換えれば、

直角三角形の3辺の比は、1つの鋭角の大きさで決まる




ということになる。

## 2.2.3 直角三角形による測量

直角三角形では、3辺の比の値が1つの角によって決まる。

角度が同じであれば比の値は一致するので、小さな直角三角形で角度に応じた辺の比の値を計算 しておけば、同じ角度を持つ大きな直角三角形でも同じ比の値を使って計算できる。

これにより、たとえば建物の高さを直接測らなくても、視点からの距離と見上げる角度を使って、 建物の高さを計算で求めることができる。



辺の比の値は角度によって決まるため、関数の記号を真似て 比の値 ( $\theta$ ) と書いている。


比の値  $(\theta)$  を(たとえば同じ角度  $\theta$  を持つ小さな三角形で)事前に求めておけば、このような測量に利用することができる。

実際に、直角三角形の辺の比の値を角度の関数とみて、その対応関係や値を調べてみることで、他 にもさまざまな応用先が見つかるのではないだろうか。

その発想の第一歩が、三角比という概念である。


## 2.2.4 三角比

直角三角形の3辺の比の値を角度の関数として見つめ直すにあたって、3辺すべての比を一度に考えようとすると、比の値(分数)が複雑になって扱いづらい。



そこで、2辺ごとに長さの比を考えることにする。

2辺ずつの比の組み合わせは6通りあり、それぞれの比の値に名前がつけられている。




これらをまとめて三角比という。

特に重要なのは sin, cos, tan の 3 つであり、他の 3 つはこれらの逆数として表されるので、あまり 使われることはない。

2.3. 指数関数 27

三角比は、1つの鋭角 $\theta$ の大きさによって決まるので、比の名前に基準となる角度 $\theta$ をつけて表記する。




## 2.2.5 扇形の弧長と角

扇形の弧の長さ

扇形の弧長と半径による中心角の表現

# 2.3 指数関数

## 2.3.1 同じ数のかけ算の指数による表記




## 2.3.2 指数法則

指数を「かける回数」と捉えれば、いくつかの法則が当たり前に成り立つことがわかる。

#### 「かける回数」の和

例えば、a e m 回かけてから、続けて a e n 回かける式を書いてみると、a は m+n 個並ぶことになる。


$$\overbrace{a \times a \times a}^{a^3} \times \overbrace{a \times a}^{a^2} = \overbrace{a \times a \times a \times a \times a \times a}^{a^5}$$



#### 「かける回数」の差


例えば、 $a \in m$ 回かけたものを、 $a \in n$ 回かけたもので割ると、m-n個のaの約分が発生する。

$$\underbrace{\frac{\overrightarrow{a \times a \times a \times a \times a \times a \times a \times a}}_{\underbrace{a \times a}} = \underbrace{a^{3}}_{\underbrace{a \times a \times a \times a \times a}}$$



#### 「かける回数」の積

例えば、[aem回かけたもの]emundedであると、<math>aumemandedemundedであると、<math>aumemandedemundedになる。



2.3. 指数関数 29

## 2.3.3 指数の拡張と指数関数

底を固定して、指数を変化させる関数を考えたい。

指数部分に入れられる数を拡張したいが、このとき、どんな数を入れても指数法則が成り立つよ うにしたい。


#### 0の指数

指数法則  $a^m \times a^n = a^{m+n}$  において、m = 0 の場合を考える。

$$a^0 \times a^n = a^{0+n}$$

$$a^0 \times a^n = a^n$$

この式が成り立つためには、a<sup>0</sup> は1である必要がある。



そもそも、指数法則  $a^m \times a^n = a^{m+n}$  は、「指数の足し算が底のかけ算に対応する」ということを表している。

- 「何もしない」足し算は +0
- 「何もしない」かけ算は×1

なので、 $a^0 = 1$ は「何もしない」という観点で足し算とかけ算を対応づけたものといえる。

#### 負の指数


指数法則  $a^m \times a^n = a^{m+n}$  において、正の数 n を負の数 -n に置き換えたものを考える。

$$a^m \times a^{-n} = a^{m-n}$$

さらに、指数法則  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$  も成り立っていてほしいので、

$$a^m \times a^{-n} = \frac{a^m}{a^n}$$

この式は、 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$  とすれば、当たり前に成り立つものとなる。



## 有理数の指数

指数法則  $a^m \times a^n = a^{m+n}$  において、指数 m,n を  $\frac{1}{2}$  に置き換えたものを考える。

$$a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = a$$

 $a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{2}}$  は、 $(a^{\frac{1}{2}})^2$  とも書けるので、

$$(a^{\frac{1}{2}})^2 = a$$

つまり、 $a^{\frac{1}{2}}$ は、2乗すると a になる数 (a の平方根) でなければならない。

$$a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$$

同様に、 $a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{3}}$  を考えてみると、

$$a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = a$$

 $a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{3}}$  は、 $(a^{\frac{1}{3}})^3$  とも書けるので、

$$(a^{\frac{1}{3}})^3 = a$$

つまり、 $a^{\frac{1}{3}}$ は、3乗するとaになる数(aの3乗根)でなければならない。

$$a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$$

2.3. 指数関数 31

このようにして、 $a^{\frac{1}{n}}$ は、n乗するとaになる数 (aのn乗根) として定義すればよい。

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

さて、分子が1ではない場合はどうだろうか?  $(a^m)^n = a^{mn} \ \hbox{ct} \ \hbox{tt} \ \hbox{ct} \ \hbox{cm} \ \hbox{e} \ \frac{m}{n} \ \hbox{ct} \ \hbox{tt} \ \hbox{e} \ \hbox$ 

$$(a^{\frac{m}{n}})^n = a^{\frac{m}{n} \times n} = a^m$$

となるので、 $a^{\frac{m}{n}}$ は、n乗したら $a^{m}$ になる数として定義すればよい。

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

有理数の指数						
m,n が整数で	、 <i>n</i> が正の整	数であるとき	き、 $\frac{m}{n}$ 乗を	欠のように定	義する。	
		a	$\frac{m}{n} = \sqrt[n]{a}$	$a^m$		
			, , , ,			

#### 実数への拡張

有理数は無数にあるので、指数 x を有理数まで許容した関数  $y = a^x$  のグラフを書くと、十分に繋がった線になる。

指数が無理数の場合は、まるでグラフ上の点と点の間を埋めるように、有理数の列で近似してい くことで定義できる。

これで、xを実数とし、関数  $y = a^x$  を定義できる。

指数関数							
a を正の実数。	とし、x を実績	数とするとき	、次のよう	な関数を指導	数関数とい	う。	
			$y = a^x$				

## 2.3.4 指数関数の底の変換

用途に応じて、使いやすい指数関数の底は異なる。

• e: 微分積分学、複素数、確率論など

● 2:情報理論、コンピュータサイエンスなど

10:対数表、音声、振動、音響など

よって、これらの底を互いに変換したい場面もある。

指数の底を変えることは、指数の定数倍で実現できる。

例えば、底が4の指数関数4xを、底が2の指数関数に変換したいとすると、

$$4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$$

のように、指数部分を2倍することで、底を4から2へと変換できる。

当たり前だが、この変換は、 $4=2^2$ という関係のおかげで成り立っている。

「4は2の何乗か?」がすぐにわかるから、4から2への底の変換が簡単にできたのだ。

より一般に、 $a^x$  と  $b^X$  において、 $a = b^c$  という関係があるとする。 つまり、a は b の c 乗だとわかっているなら、

$$a^x = (b^c)^x = b^{cx}$$

のように、底をaからbへと変換できる。

指数関	数の底	の変	变換																		
指数を対	定数倍	iする	3 Z	اع	は、	底	を変	え	るこ	. と	と同	] U:	操作	ミに	なる	) <sub>o</sub>					
$a = b^c$	という	関係	系が	ある	るな	ら、	次	の	変換	が	或り	立.	つ。								
									a	!X	=	$b^c$	x								


ここで重要なのは、指数関数の底を変換するには、「a は b の何乗か?」がわかっている必要があるということだ。


次章では、 $a = b^c$  となるような c を表す道具として、対数を導入する。

2.4. 対数関数 33

## 2.4 対数関数


## 2.4.1 対数:指数部分を関数で表す





対数は、指数関数の指数部分を表す。

 $a^y = x \, Oy \, C$ 、 $y = \log_a x \, e$ 代入することで、次のような式にまとめることもできる。



## 2.4.2 対数の性質

指数法則を対数に翻訳することで、対数の性質を導くことができる。

### 真数のかけ算は log の足し算


 $x_1 = a^m, x_2 = a^n$  として、指数法則  $a^m \times a^n = a^{m+n}$  を考える。

$$x_1 x_2 = a^m \times a^n$$
$$= a^{m+n}$$

対数は指数部分を表すので、 $m+n=\log_a(x_1x_2)$ がいえる。

また、 $x_1 = a^m$  より  $m = \log_a x_1$ 、 $x_2 = a^n$  より  $n = \log_a x_2$  と表せるから、

$$m + n = \log_a x_1 + \log_a x_2 = \log_a(x_1 x_2)$$



#### 真数の割り算は log の引き算


 $x_1 = a^m, x_2 = a^n$  として、指数法則  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$  を考える。

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{a^m}{a^n}$$
$$= a^{m-n}$$

対数は指数部分を表すので、 $m-n=\log_a\left(\frac{x_1}{x_2}\right)$ がいえる。 また、 $x_1=a^m$  より  $m=\log_a x_1$ 、 $x_2=a^n$  より  $n=\log_a x_2$  と表せるから、

$$m - n = \log_a x_1 - \log_a x_2 = \log_a \left(\frac{x_1}{x_2}\right)$$

2.4. 対数関数 35




### 真数の冪乗は log の指数倍

 $x = a^m$  として、指数法則  $(a^m)^n = a^{mn}$  を考える。

$$x^n = (a^m)^n$$
$$= a^{mn}$$


対数は指数部分を表すので、 $mn = \log_a x^n$  がいえる。 また、 $x = a^m$  より  $m = \log_a x$  と表せるから、

$$mn = n \log_a x \log_a x^n$$



### 2.4.3 常用対数と桁数





## 2.4.4 指数関数の底の変換:対数を用いた表現

指数関数の底aからbに変換するには、「aはbの何乗か?」がわかっている必要があった。


## REVIEW

 $a = b^c$  という関係があるなら、

$$a^x = b^{cx}$$

今では、 $a = b^c$  となるような c を、対数で表すことができる。

$$b^c = a \iff c = \log_b a$$



# Chapter 3


# 微分と積分

# 3.1 1変数関数の微分

微分とは、複雑な問題も「拡大して見たら簡単に見える (かもしれない)」という発想で、わずかな変化に着目して入力と出力の関係 (関数) を調べる手法といえる。

# 3.1.1 接線:拡大したら直線に近似できる

関数 y=f(x) について、引数の値を  $x=x_0$  からわずかに増加させて、 $x=x_0+\Delta x$  にした場合の出力の変化を考える。



このとき、増分の幅  $\Delta x$  を狭くしていく( $\Delta x$  の値を小さくしていく)と、 $x=x_0$  付近において、関数 y=f(x) のグラフは直線にほとんど重なるようになる。



このように、関数 f(x) は、ある点  $x_0$  の付近では、

$$f(x) \simeq a(x - x_0) + b$$

という直線に近似することができる。

ここで、 $f(x_0)$  の値を考えると、

$$f(x_0) = a(x_0 - x_0) + b$$
$$= a \cdot 0 + b$$
$$= b$$

であるから、実は $b = f(x_0)$ である。

3.1. 1変数関数の微分 39

一方、*a* はこの直線の傾きを表す。

そもそも、傾きとは、xが増加したとき、yがどれだけ急に(速く)増加するかを表す量である。

関数のグラフを見ると、急激に上下する箇所もあれば、なだらかに変化する箇所もある。

つまり、ある点でグラフにぴったりと沿う直線(接線)を見つけたとしても、その傾きは場所に よって異なる。

そこで、「傾きは位置 x の関数」とみなして、次のように表現しよう。

$$a = f'(x)$$


これで、先ほどの直線の式を完成させることができる。

関数の各点での直線	による近似			
関数 <i>f</i> (x) は、ある点	. x <sub>0</sub> の付近では			
	<i>C(</i> )			
	$f(x) \simeq$	$f(x_0) + f'(x)(x - x_0) = f(x_0) $	$-x_0$ )	
という傾き f'(x) のi	直線に近似でき	5.		

# 3.1.2 接線の傾きとしての導関数

傾きは位置 x の関数 f'(x) としたが、この関数がどのような関数なのか、結局傾きを計算する方法がわかっていない。

直線の傾きはxとyの増加率の比として定義されているから、まずはそれぞれの増加率を数式で表現しよう。



この図から、yの増加率 Δy は次のように表せることがわかる。


$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

この両辺を  $\Delta x$  で割ると、x の増加率  $\Delta x$  と y の増加率  $\Delta y$  の比率が表せる。

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

図では  $\Delta x$  には幅があるが、この幅を限りなく 0 に近づけると、幅というより点になる。 つまり、 $\Delta x \to 0$  とすれば、 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  は任意の点 x での接線の傾きとなる。

「任意の点xでの傾き」もxの関数であり、この関数を導関数と呼ぶ。



3.1. 1変数関数の微分 41


## 3.1.3 微分とその関係式

微分 関数 f(x) から、その導関数 f'(x) を求める操作を微分という。

関数のグラフから離れて、微分という「計算」を考えるにあたって、先ほどの導関数の定義式よりも都合の良い表現式がある。

 $x \to 0$  とした後の  $\Delta x$  を dx と書くことにして、 $\lim_{\Delta x \to 0}$  を取り払ってしまおう。

$$f'(x) = \frac{f(x+dx) - f(x)}{dx}$$
 両辺  $\times dx$   $f'(x)dx = f(x+dx) - f(x)$   $f(x)$  を移項




# 3.1.4 不連続点と微分可能性

 $\le x$  において連続な関数であれば、幅  $\Delta x$  を小さくすれば、その間の変化量  $\Delta y$  も小さくなるはずである。



しかし、不連続な点について考える場合は、そうはいかない。

下の図を見ると、 $\Delta x$  の幅を小さくしても、 $\Delta y$  は不連続点での関数の値の差の分までしか小さくならない。



このような不連続点においては、どんなに拡大しても、関数のグラフが直線にぴったりと重なる ことはない。

「拡大すれば直線に近似できる」というのが微分の考え方だが、不連続点ではこの考え方を適用 できないのだ。

関数の不連続点においては、微分という計算を考えることがそもそもできない。 ある点での関数のグラフが直線に重なる (微分可能である) ためには、 $\Delta x \to 0$  としたときに  $\Delta y \to 0$  となる必要がある。

# 3.1.5 導関数のさまざまな記法

微分を考えるときは、 $\Delta x \rightarrow 0$  としたときに  $\Delta y \rightarrow 0$  となる前提のもとで議論する。

 $\Delta x \to 0$  とした結果を dx、 $\Delta y \to 0$  の結果を dy とすると、ある点 x での接線の傾きは、次のようにも表現できる。

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

この接線の傾きがxの関数であることを表現したいときは、次のように書くこともある。


$$\frac{dy}{dx}(x)$$

これも一つの導関数(位置に応じた接線の傾きを表す関数)の表記法である。


この記法は、どの変数で微分しているかがわかりやすいという利点がある。



特に、 $\frac{d}{dx}f(x)$  という記法は、 $\frac{d}{dx}$  の部分を微分操作を表す演算子として捉えて、「関数 f(x) に微分という操作を施した」ことを表現しているように見える。



ところで、これまで使ってきた f'(x) という導関数の記法にも、名前がついている。



この記法は、「fという関数から導出された関数がf'である」ことを表現している。

導関数はあくまでも関数 f から派生したものであるから、f という文字はそのまま、加工されたことを表すために、f をつけたものと解釈できる。

## 3.1.6 微分の性質

微分の関係式を使うことで、微分に関する有用な性質を導くことができる。

# REVIEW

微分の関係式

元の関数 導関数 
$$f(x+dx) = f(x) + f'(x) dx$$


#### 関数の一次結合の微分

 $\alpha f(x) + \beta g(x)$  において、 $x \in dx$  だけ微小変化させてみる。

$$\alpha f(x + dx) + \beta g(x + dx) = \alpha \{f(x) + f'(x)dx\} + \beta \{g(x) + g'(x)dx\}$$

元の関数

$$\alpha f(x + dx) + \beta g(x) + \beta g(x) + \beta g'(x) + \beta g'(x) \} dx$$



#### 関数の積の微分


f(x)g(x) において、x を dx だけ微小変化させてみる。

$$f(x + dx)g(x + dx) = \{f(x) + f'(x)dx\}\{g(x) + g'(x)dx\}$$

$$= f(x)g(x) + f'(x)g(x)dx + f(x)g'(x)dx + f'(x)g'(x)dx^{2}$$
2 次以上の微小量
$$= f(x)g(x) + \{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\}dx + f'(x)g'(x)dx^{2}$$

ここで、 $dx^2$  は、dx より速く 0 に近づくので無視できる。

荒く言ってしまえば、dx でさえ微小量なのだから、 $dx^2$  なんて存在しないも同然だと考えてよい。 このことは、次の図を見るとイメージできる。 3.1. 1 変数関数の微分 45



 $dx \to 0$  のとき  $dy \to 0$  となる場合に微分という計算を定義するのだから、dx を小さくしていくと、 dy にあたる f(x+dx)-f(x) (これは f'(x)dx と等しい)も小さくなっていく。 同様にして、g(x+dx)-g(x) (これは g'(x)dx と等しい)も小さくなっていく。

## REVIEW

微分の関係式 f(x+dx) = f(x) + f'(x)dx より、

$$f'(x)dx = f(x + dx) - f(x)$$

dx を小さくした場合を図示すると、



#### 2 次以上の微小量

 $f'(x)g'(x)dx^2$  に相当する左上の領域は、ほとんど点になってしまうことがわかる。

このように、dx<sup>2</sup> の項は無視してもよいものとして、先ほどの計算式は次のようになる。

元の関数  

$$f(x+dx)g(x+dx) = f(x)g(x) + \{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\}dx$$



## 3.1.7 冪関数の微分

具体的な関数の導関数も、微分の関係式をもとに考えることができる。 まずは、基本的な例として、冪関数  $y = x^n$  の微分を考えてみよう。

 $y = x^2$  の微分

 $y = f(x) = x^2$  において、x を dx だけ微小変化させると、y は dy だけ変化するとする。 すると、微分の関係式は  $y + dy = f(x + dx) = (x + dx)^2$  となるが、これを次のように展開して考える。

$$y + dy = (x + dx)(x + dx)$$

右辺の (x+dx)(x+dx) からは、

- x²の項が1つ
- xdx の項が2つ
- dx<sup>2</sup> の項が1つ

現れることになる。

数式で表すと、

$$y + dy = x^2 + 2xdx + dx^2$$


ここで $y = x^2$  なので、左辺のyと右辺の $x^2$  は相殺される。

#### 高次の微小量

$$dy = 2xdx + dx^2$$

さらに、 $dx^2$  の項は無視することができる。

なぜなら、dx を小さくすると、 $dx^2$  は dx とは比べ物にならないくらい小さくなってしまうからだ。



というわけで、次のような式が得られる。

$$dy = 2xdx$$

よって、 $y = x^2$  の導関数は、y' = 2x となることがわかった。

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

 $y = x^3$  の微分

同じように、 $y = x^3$  の微分を考えてみよう。

$$y + dy = (x + dx)(x + dx)(x + dx)$$

右辺の (x+dx)(x+dx)(x+dx) からは、

- x³の項が1つ
- x²dx の項が3つ
- dx<sup>3</sup> の項が1つ

現れることになる。

$$y + dy = x^3 + 3x^2 dx + dx^3$$

ここで $y = x^3$  なので、左辺のy と右辺の $x^3$  は相殺される。

#### 高次の微小量


$$dy = 3x^2 dx + dx^3$$

さらにここでは、dx<sup>3</sup> の項を無視することができる。

次の図を見てみよう。

各辺 dx の立方体は、dx を小さくすると、ほぼ点にしか見えないほど小さくなる。

つまり、各辺 dx の立方体の体積 dx3 は、考慮する必要がない。



というわけで、 $y = x^3$  の導関数は、 $y' = 3x^2$  となることがわかった。

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

 $y = x^n$  の微分 (n が自然数の場合)

n が自然数だとすると、 $y = x^n$  の微分は、 $y = x^2$  や  $y = x^3$  の場合と同じように考えられる。

$$y + dy = \underbrace{(x + dx)(x + dx) \cdots (x + dx)}_{n \text{ (fill)}}$$

右辺の $(x+dx)(x+dx)\cdots(x+dx)$ を展開しようすると、次のような3種類のかけ算が発生する。

- x どうしのかけ算
- xとdxのかけ算

dx どうしのかけ算

つまり、右辺からは、

- x<sup>n</sup> の項が1つ
- x<sup>n-1</sup>dx の項が n 個
- dx<sup>n</sup> の項が1つ

という項が現れることになる。

そして、 $x^n$  は左辺のy と相殺され、 $dx^n$  の項は高次の微小量として無視できる。


すると、残るのは次のような式になるだろう。

$$dy = nx^{n-1}dx$$

この式は、 $y = \alpha x$  という直線の式によく似ている。

高次の dx の項  $dx^n$  を無視し、1次の dx の項だけ残したのは、微分という計算が微小範囲における直線での近似であるからだ。

あくまでも微小範囲での直線の式であることを表すために、x,y を dx,dy として、 $dy = \alpha dx$  という形の式になっていると考えればよい。



 $y = x^n$  の微分 (n が整数の場合)

指数法則を使うことで、nが負の整数の場合にも拡張することができる。

まずは、 $y = x^{-1}$ の微分を考えてみよう。

指数法則より、 $y = x^{-1}$  は次のように変形できる。

$$y = \frac{1}{x}$$

$$xy = 1$$

両辺  $\times x$ 

微小変化を加えた微分の関係式を作って、次のように展開していく。

$$(x+dx)(y+dy) = 1$$
  
高次の微小量  
$$xy + xdy + ydx + dydx = 1$$

ここで、微小量の掛け合わせである dydx は無視できるほど小さい。

また、 $y = \frac{1}{x}$  より、xy = 1 なので、左辺の xy と右辺の 1 は相殺される。

すると、残った式は、

$$xdy + ydx = 0$$
  
 $xdy = -ydx$   
 $ydx$  を移項  
 $x\frac{dy}{dx} = -y$   
 $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$   
両辺  $\nabla \cdot x$ 

yが残ってしまっているので、 $y = \frac{1}{x}$ を代入すると、

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2}$$
$$= -x^{-2}$$

これは、冪が自然数の場合の冪関数の微分  $\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$  において、n = -1 を代入したものになっている。

n が任意の負の整数の場合も、同様に考えられる。

$$y = x^{-n} \not\in x^n$$
  $x^n y = 1 \succeq U \subset x$ 

$$(x + dx)(x + dx) \cdots (x + dx) \times (y + dy) = 1$$
 高次の微小量 
$$(x^n + nx^{n-1}dx + dx^n) \times (y + dy) = 1$$
 高次の微小量を無視 
$$(x^n + nx^{n-1}dx) \times (y + dy) = 1$$
 高次の微小量 
$$x^n y + x^n dy + nx^{n-1}y dx + nx^{n-1}dx dy = 1$$
 相殺&無視

移項してさらに整理すると、

$$x^n dy = -nx^{n-1}y dx$$
 $x^n \frac{dy}{dx} = -nx^{n-1}y$ 
 $\frac{dy}{dx} = -nx^{n-1}x^{-n}y$ 
 $= -nx^{n-1}x^{-n}x^{-n}$ 
 $y = x^{-n}$ 
 $y = x^{-n}$ 

これもやはり、冪が自然数の場合の冪関数の微分  $\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$  において、n を -n に置き換えたものになっている。

つまり、自然数(正の整数)だけでなく、負の整数も許容して、次のことがいえる。



#### $y = x^n$ の微分(n が実数の場合)

n が有理数の場合はどうだろうか。実はこれも、指数法則によって拡張することができる。 m と n はどちらも自然数として、 $y=x^{\frac{m}{n}}$  の微分を考える。

まず、 $y = x^{\frac{m}{n}}$  は、 $y^n = x^m$  とまったく同じ式である。

というわけで、 $y^n = x^m$ を微小変化させて、展開してみよう。

$$\underbrace{(y+dy)(y+dy)\cdots(y+dy)}_{n \text{ (II)}} = \underbrace{(x+dx)(x+dx)\cdots(x+dx)}_{m \text{ (III)}}$$

ここで、 $n \ge m$  は自然数なのだから、自然数冪のときと同じように考えて、次のような式が残ることになる。

$$ny^{n-1}dy = mx^{m-1}dx$$

よって、 $\frac{dy}{dx}$  の式の y を含まない形を目指すと、

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mx^{m-1}}{ny^{n-1}}$$

$$= \frac{mx^{m-1}}{nx^{\frac{m}{n}(n-1)}}$$

$$= \frac{mx^{m-1}}{nx^{m-\frac{m}{n}}}$$

$$= \frac{mx^{m}x^{-1}}{nx^{m}x^{-\frac{m}{n}}}$$

$$= \frac{mx^{-1}}{nx^{-\frac{m}{n}}}$$

$$= \frac{m}{n} \cdot \frac{x^{-1}}{x^{-\frac{m}{n}}}$$

$$= \frac{m}{n} \cdot x^{-1-(-\frac{m}{n})}$$
指数法則  $\frac{a^{m}}{a^{n}} = a^{m-n}$ 


$$= \frac{m}{n} \cdot x^{-1+\frac{m}{n}}$$

$$= \frac{m}{n} \cdot x^{\frac{m}{n}-1}$$

これは、冪が自然数の場合の冪関数の微分  $\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$  において、n を  $\frac{m}{n}$  に置き換えたものになっている。


つまり、整数だけでなく、有理数に対しても同様の導関数の式が成り立つ。

ここまで来ると、無理数はどうだろうか?という疑問が生まれるが、無理数への拡張は指数法則 では対応できない。 無理数に対しては、極限操作によって同様の導関数の式を導くことができ、実数全体に対して同 じ導関数の式が成り立つことが示される。



## 3.1.8 定数関数の微分

常に一定の値 c を返す定数関数 f(x) = c の微分はどうなるだろうか。 関数のグラフを描いて考えてみよう。



定数関数のグラフは、x 軸に対して平行な直線であり、この直線の傾きは見るからに0 である。 実際、導関数の定義に従って計算することで、定数関数の導関数は0 になることを確かめられる。

## REVIEW


導関数の定義

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

どの点xにおいてもf(x)がcを返すということは、 $f(x + \Delta x)$ もcであるため、

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{c - c}{\Delta x}$$
$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0}{\Delta x}$$
$$= 0$$

となり、定数関数 f(x) = c の微分の結果は c に依存せず、常に 0 になる。



#### 3.1.9 合成関数の微分

合成関数の微分の一般的な式は、いろいろな関数の微分を考える上で重要な公式である。

#### 関数の微小変化量

関数 f(x) において、変数 x を dx だけ微小変化させた式は、これまで何度も登場した。

増えた分 
$$f(x+dx) = f(x) + f'(x)dx$$

この式は、 $\int x \, \delta \, dx$  だけ微小変化させることで、関数 f の値は f'(x)dx だけ増加した」と捉えることもできる。

言い換えれば、関数 f の微小変化量は f'(x)dx だということだ。

変化量という観点で眺めるには、次のように移項した式がわかりやすいかもしれない。

区間 
$$dx$$
 での変化 変化量  $f(x+dx)-f(x)=f'(x)dx$ 

関数 f の微小変化量 f'(x)dx を、df と表すことにしよう。

#### 合成関数の微分の関係式

今回はさらに、t = f(x) を関数 g(t) に放り込むことを考える。 g(t) についても、次のような微分の関係式が成り立つはずだ。

$$g(t + dt) = g(t) + g'(t)dt$$

合成関数 g(f(x)) を作るため、t = f(引数(x)) を省略して書いた関数 f(x))を代入する。

$$g(f + df) = g(f) + g'(f)df$$

 $f \in f(x)$  に、 $df \in f'(x)dx$  に書き戻すと、

$$g(f(x) + f'(x)dx) = g(f(x)) + g'(f(x))f'(x)dx$$

となり、左辺のg(x)の中身f(x) + f'(x)dxはf(x + dx)と書き換えられるので、次の式を得る。

元の関数 導関数 
$$g(f(x+dx)) = g(f(x)) + g'(f(x))f'(x) dx$$

#### 連鎖律としての表現

ニュートン記法による表現はなかなかに覚えづらい式に見えるが、ライプニッツ記法を使って書き直すと、実は単純な関係式になっている。

- (g(f(x)))' は、g(f(x)) を x で微分したもの: $\frac{d}{dx}g(f(x))$
- f'(x) は、f(x) を x で微分したもの: $\frac{d}{dx}f(x)$
- g'(f(x)) は、g(t) を t で微分したもの  $\frac{d}{dt}g(t)$  に、t=f(x) に代入したもの: $\frac{d}{df}g(f(x))$

として書き直すと、


$$\frac{d}{dx}g(f(x)) = \frac{d}{dx}f(x) \cdot \frac{d}{df}g(f(x))$$

さらに、引数を省略して書くと、

$$\frac{dg}{dx} = \frac{df}{dx} \cdot \frac{dg}{df}$$

これは、df を約分できると考えたら、当たり前の式になっている。

$$\frac{dg}{dx} = \frac{df}{dx} \cdot \frac{dg}{df}$$



## 3.1.10 逆関数の微分

関数 y = f(x) の逆関数  $x = f^{-1}(y)$  の微分も、ライプニッツ記法で考えると、ごく当たり前の式として導出できる。

ネタバレすると、次の式がそのまま逆関数の微分を表すものになっている。

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

 $\frac{dy}{dx}$  を f'(x) と表記するなら、

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f'(x)}$$

である。この発想を納得するために、もう少し詳しく見ていこう。

\* \* \*

y = f(x) の導関数 f'(x) は、ライプニッツ記法では  $\frac{dy}{dx}$  と表記される。

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

ライプニッツ記法  $\frac{dy}{dx}$  には、「y で表される関数を x で微分する」という意味がこめられている。ならば、逆関数  $x=f^{-1}(y)$  の導関数は、「x で表される関数を y で微分する」という意味で、 $\frac{dx}{dy}$  と表記できる。

$$\frac{dx}{dy} = (f^{-1})'(y)$$


ここで、 $\frac{dy}{dx} = f'(x)$  という式から、次の等式も成り立つと考えられる。

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f'(x)}$$

これは逆関数の導関数になっているが、逆関数がyの関数なのだから、その導関数  $\frac{dx}{dy}$  も y の関数であってほしい。


そこで、xを消すために  $x = f^{-1}(y)$ を代入することで、逆関数の導関数を完成させる。


$$\left. \frac{dx}{dy} = \frac{1}{f'(x)} \right|_{x=f^{-1}(y)}$$



# 3.1.11 三角関数の微分

角度  $\theta$  を  $d\theta$  だけ微小変化させたときの、三角形の高さの変化が  $\sin\theta$  の微小変化であり、底辺の長さの変化が  $\cos\theta$  の微小変化である。








## sin の微分

三角形の高さは、 $d\theta\cos\theta$ だけ増えているので、






## cos の微分

三角形の底辺の長さは、 $d\theta \sin \theta$  だけ減っているので、

3.1. 1変数関数の微分

$$\cos(\theta + d\theta) = \cos \theta - \sin \theta d\theta$$
元の関数 導関数
 $\cos(\theta + d\theta) = \cos \theta + (-\sin \theta) d\theta$ 



#### 3.1.12 ネイピア数

指数関数を定義した際に、「どんな数も0乗したら1になる」と定義した。

つまり、指数関数  $y = a^x$  において、x = 0 での関数の値は1である。

ここでさらに、x=0 でのグラフの傾きも1となるような a を探し、その値をネイピア数と呼ぶことにする。



この定義では、 $\int x = 0$  では関数の値も傾きも等しく1 になる」という、 $\int x = 0$  での振る舞いにしか言及していない。

だが、実はネイピア数を底とする指数関数は、「微分しても変わらない(すべてのxにおいて、関数の値と傾きが一致する)」という性質を持つ。

# 3.1.13 ネイピア数を底とする指数関数の微分

指数関数  $y = e^x$  の微分は、導関数の定義から次のように計算できる。

$$\frac{d}{dx}e^{x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{x + \Delta x} - e^{x}}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{x} \cdot e^{\Delta x} - e^{x}}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{x} \cdot (e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x}$$

$$= e^{x} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

ここで、 $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$  は x によらない定数であり、

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{0 + \Delta x} - e^0}{\Delta x}$$

というように、これはx=0 における傾き(導関数にx=0 を代入したもの)を表している。 そもそも、ネイピア数eの定義は「x=0での $e^x$ の傾きが1」というものだったので、

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1$$

となり、「e<sup>x</sup> は微分しても変わらない」という性質が導かれる。

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$



## 指数が定数倍されている場合

 $y=e^{kx}$  のように、指数が定数倍 (k 倍) されている場合は、合成関数の微分の公式を使って計算できる。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dt}{dx} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$= \frac{d}{dx}(kx) \cdot \frac{d}{dt}(e^t)$$

$$= k\frac{dx}{dx} \cdot e^t$$

$$= ke^t$$

$$= ke^{kx}$$

となり、 $e^{kx}$  自体は変わらず、指数の係数 k が e の肩から「降りてくる」形になる。



#### 指数が関数の場合


指数が関数になっている場合  $y = e^{f(x)}$  の微分も、合成関数の微分を使って考えればよい。 t = f(x) とおくと、

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$$

$$= \frac{d}{dt}e^t \cdot \frac{d}{dx}f(x)$$

$$= e^t \cdot f'(x)$$

$$= e^{f(x)} \cdot f'(x)$$



## 3.1.14 一般の指数関数の微分

指数関数の底の変換公式より、a を底とする指数関数の微分は、ネイピア数 e を底とする指数関数の微分(指数が定数倍されている場合)に帰着できる。

# REVIEW

指数関数の底の変換公式

$$a^x = b^{(\log_b a)x}$$

指数関数の底の変換公式において、b = e の場合を考えると、

$$a^x = e^{(\log a)x}$$


となるので、指数が $\log a$  倍された、e を底とする指数関数の微分として考えればよい。

$$\frac{d}{dx}a^{x} = \frac{d}{dx}e^{(\log a)x}$$

$$= (\log a)e^{(\log a)x}$$

$$= (\log a)a^{x}$$


$$e^{(\log a)x} = a^{x}$$



## 3.1.15 対数関数の微分

自然対数の微分(底がネイピア数の対数の微分)

底がネイピア数である対数は、自然対数と呼ばれる。



 $y = \log x$  は  $x = e^y$  の逆関数であるから、 $e^y$  の微分  $e^y$  の逆数を考えればよい。

$$\frac{d}{dx}\log x = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}$$



# 3.1.16 対数微分法

#### 真数が関数である自然対数の微分

 $y = \log f(x)$  の微分は、対数微分法と呼ばれる微分テクニックの原理となる。 この微分は、t = f(x) として合成関数の微分を考えることで計算できる。


$$\frac{d}{dx}\log f(x) = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$$

$$= \frac{d}{dt}\log t \cdot \frac{d}{dx}f(x)$$

$$= \frac{1}{t} \cdot f'(x)$$

$$= \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$$


$$= \frac{f'(x)}{f(x)}$$



ここで、この式を  $f'(x) = \dots$  の形に直してみよう。

$$f'(x) = f(x) \cdot \frac{d}{dx} \log f(x)$$

関数 f(x) の微分 f'(x) は、 $\log$  を取ってから微分したもの  $\frac{d}{dx}\log f(x)$  に、元の関数 f(x) をかけることでも計算できることがわかる。



この原理によって、f(x)の微分計算を、 $\log f(x)$ の微分計算に置き換えることが可能になる。 対数を取ることで、対数の性質が使えるようになるため、微分が簡単になることがある。そんな ときにこの原理が役に立つ。

## 対数微分法でライプニッツ則(関数の積の微分)を導く

f(x)g(x) の微分を、対数経由で計算してみよう。

まず、 $\log(f(x)g(x))$ の微分は、「積の対数が対数の和になる」という対数の性質を用いて、次のように計算できる。

$$\frac{d}{dx}\log(f(x)g(x)) = \frac{d}{dx}\left(\log f(x) + \log g(x)\right)$$

$$= \frac{d}{dx}\log f(x) + \frac{d}{dx}\log g(x)$$

$$= \frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{g'(x)}{g(x)}$$

$$= \frac{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}{f(x)g(x)}$$

対数微分法の原理より、この式に f(x)g(x) をかけたものが、f(x)g(x) の微分になる。

$$(f(x)g(x))' = f(x)g(x) \cdot \frac{d}{dx} \log(f(x)g(x))$$
$$= f(x)g(x) \cdot \frac{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}{f(x)g(x)}$$
$$= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

これは、関数の積の微分公式である、ライプニッツ則の式に一致している。

## 対数微分法で分数関数の微分(関数の商の微分)を考える

続いて、 $\frac{f(x)}{g(x)}$  の微分も対数微分法で計算してみよう。

 $\log rac{f(x)}{g(x)}$  の微分は、「商の対数が対数の差になる」という対数の性質を用いて、次のように計算できる。

$$\frac{d}{dx}\log\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{d}{dx}\left(\log f(x) - \log g(x)\right)$$

$$= \frac{d}{dx}\log f(x) - \frac{d}{dx}\log g(x)$$

$$= \frac{f'(x)}{f(x)} - \frac{g'(x)}{g(x)}$$


$$= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{f(x)g(x)}$$

対数微分法の原理より、この式に  $\frac{f(x)}{g(x)}$  をかけたものが、 $\frac{f(x)}{g(x)}$  の微分になる。

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{d}{dx} \log \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$= \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{f(x)g(x)}$$

$$= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$



#### 関数の積・商の微分の比較

対数を取ってから微分すると、ライプニッツ則と分数関数の微分の違いがシンプルに表現される。

$$\frac{d}{dx}\log(f(x)g(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{g'(x)}{g(x)}$$
$$\frac{d}{dx}\log\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)}{f(x)} - \frac{g'(x)}{g(x)}$$

あとは、これらに f(x)g(x) や  $\frac{f(x)}{g(x)}$  をかけることで、元の関数の微分の式が導ける。

# 3.2 高階微分とテイラー展開

## 3.2.1 高階微分とその表記


関数 f(x) を微分したもの f'(x) をさらに微分して、その結果をさらに微分して…というように、「導関数の導関数」を繰り返し考えていくことを高階微分という。

まずは、2回微分した場合について定義しよう。

f(x) を 2 回微分したものは、ニュートン記法では f''(x) と表される。


ライプニッツ記法で表現するには、次のように考えるとよい。

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{d}{dx}f(x)\right) = \left(\frac{d}{dx}\right)^2 f(x) = \frac{d^2}{dx^2}f(x)$$



n 階微分も同様に定義される。

n が大きな値になると、プライム記号をつける表記では f''''''(x) のようになってわかりづらいので、 $f^{(n)}(x)$  のようにプライムの数 n を添える記法がよく使われる。



#### 3.2.2 冪関数の高階微分

n次の冪関数  $f(x) = x^n$  を k 回微分すると、次のようになる。

$$f(x) = x^{n}$$

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f''(x) = n(n-1)x^{n-2}$$

$$f'''(x) = n(n-1)(n-2)x^{n-3}$$

$$\vdots$$

$$f^{(k)}(x) = n(n-1)(n-2)\cdots(n-(k-1))x^{n-k}$$

$$= n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)x^{n-k}$$

$$f^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2)\cdots(n-n+1)x^{n-n}$$


$$= n(n-1)(n-2)\cdots 1 \cdot x^{0}$$

$$= n(n-1)(n-2)\cdots 1$$

$$= n!$$

となり、n 階微分した時点で定数 n! になるので、これ以上微分すると 0 になる。

$$f^{(n+1)}(x) = 0$$



## 3.2.3 指数関数の高階微分

ネイピア数を底とする指数関数  $f(x) = e^x$  は、何度微分しても変わらない関数である。

$$f(x) = e^{x}$$


$$f'(x) = e^{x}$$

$$f''(x) = e^{x}$$

$$f'''(x) = e^{x}$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = e^{x}$$



指数が k 倍されている場合  $f(x) = e^{kx}$  は、微分するたびに k が前に落ちてきて、n 階微分すると  $k^n$  が前につくことになる。

$$f(x) = e^{kx}$$


$$f'(x) = ke^{kx}$$

$$f''(x) = k^{2}e^{kx}$$

$$f'''(x) = k^{3}e^{kx}$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = k^{n}e^{kx}$$



# 3.2.4 テイラー展開

微分の導入として話した、関数の各点での直線による近似に立ち返ろう。

# REVIEW

関数 f(x) は、ある点  $x_0$  の付近では、

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x)(x - x_0)$$

という傾き f'(x) の直線に近似できる。

この式に $x = x_0$ を代入すると、

$$f(x_0) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x_0 - x_0)$$
$$f(x_0) \simeq f(x_0) + f'(x_0) \cdot 0$$
$$\therefore \quad f(x_0) = f(x_0)$$

となり、たしかに点 x<sub>0</sub> では一致することがわかる。

ここで、両辺を高階微分しても、点 xo で一致するような近似式を作りたい。

一階微分が一致するなら点  $x_0$  でのグラフの傾きが等しく、二階微分が一致するなら点  $x_0$  でのグラフの曲がり具合が等しい、…といった具合に、高階微分を一致させていけば、どんどん本物の関数 f(x) に近い近似式が得られるからだ。

n 階微分してから  $x = x_0$  を代入しても、 $f^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0)$  が成り立つようにするには、近似式の右辺  $f(x_0) + f'(x)(x - x_0)$  をどのように変更すればよいだろうか?

 $f'(x)(x-x_0)$  の n 階微分

右辺を微分した時点で定数項  $f(x_0)$  は消えてしまうので、 $f'(x)(x-x_0)$  の微分結果だけが残ることになる。

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n}{dx^n} \left( f'(x)(x - x_0) \right)$$

そこで、 $f'(x)(x-x_0)$  の高階微分がどうなるかを探っていく。1階微分から順に見ていこう。

この計算では、関数の積の微分(ライプニッツ則)を思い出す必要がある。

## REVIEW

関数の積の微分 (ライプニッツ則)

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = \frac{d}{dx}f(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot \frac{d}{dx}g(x)$$

積の各項の微分を計算しておくと、

$$\frac{d}{dx}f'(x) = f''(x)$$

$$\frac{d}{dx}(x - x_0) = \frac{d}{dx}x - \frac{d}{dx}x_0 = 1 - 0 = 1$$

となるので、ライプニッツ則より、1階微分は次のようになる。

$$\frac{f'(x) \, \mathcal{O}微分}{dx} (x - x_0) \, \mathcal{O}微分$$

$$= f''(x) (x - x_0) + f'(x) \cdot \mathbf{1}$$

$$= f''(x)(x - x_0) + f'(x)$$

この結果をもう一度微分すると、2階微分が求まる。

$$\frac{d^2}{dx^2} (f'(x)(x - x_0)) = \frac{d}{dx} (f''(x)(x - x_0) + f'(x))$$

$$= \frac{d}{dx} f''(x)(x - x_0) + \frac{d}{dx} f'(x)$$

$$f''(x) \text{ (x - x_0) } \text{ (x - x_0)}$$

$$= f'''(x) (x - x_0) + f''(x) \cdot 1 + f''(x)$$

$$= f'''(x)(x - x_0) + 2f''(x)$$

さらにもう一度微分することで、3階微分が求められる。

$$\frac{d^3}{dx^3} (f'(x)(x - x_0)) = \frac{d}{dx} (f'''(x)(x - x_0) + 2f''(x))$$

$$= \frac{d}{dx} f'''(x)(x - x_0) + 2\frac{d}{dx} f''(x)$$

$$f'''(x) の微分 \qquad (x - x_0) の微分$$

$$= f''''(x) (x - x_0) + f'''(x) \cdot 1 + 2f'''(x)$$

$$= f''''(x)(x - x_0) + 3f'''(x)$$

プライム記号の数が増えてきたので、 $f''' = f^{(3)}$ のように書き直して結果をまとめると、

$$\frac{d}{dx}(f'(x)(x-x_0)) = f^{(2)}(x)(x-x_0) + f^{(1)}(x)$$

$$\frac{d^2}{dx^2}(f'(x)(x-x_0)) = f^{(3)}(x)(x-x_0) + 2f^{(2)}(x)$$

$$\frac{d^3}{dx^3}(f'(x)(x-x_0)) = f^{(4)}(x)(x-x_0) + 3f^{(3)}(x)$$

$$\vdots$$

$$\frac{d^n}{dx^n}(f'(x)(x-x_0)) = f^{(n+1)}(x)(x-x_0) + nf^{(n)}(x)$$

のように続き、n 階微分の結果が得られる。

 $x = x_0$  を代入すると…

これで、f(x) の n 階微分  $f^{(n)}(x)$  は、次のように表せることがわかった。

$$f^{(n)}(x) = f^{(n)}(x)(x - x_0) + nf^{(n-1)}(x)$$

ここに、 $x = x_0$  を代入してみると、

#### 定数の微分は0

$$f^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0)(\underbrace{x_0 - x_0}_{0}) + n f^{(n-1)}(x_0)$$

$$= f^{(n)}(x_0) \cdot 0 + n \cdot 0$$

$$= 0$$

というように、右辺の項がすべて消えて、0 になってしまう。  $f^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0)$  を成り立たせるには、右辺に項が足りないということになる。

n 階微分して  $x = x_0$  を代入しても 0 にならず、 $f^{(n)}(x_0)$  として生き残るような項を、元の近似式の右辺に追加する必要がある。

#### 近似式の続きを予想する

具体的にどんな項を加えていけばよいかは、式の規則性から予想していくことにする。

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

という式を、次のように読み替えてみよう。

$$f(x) \simeq f^{(0)}(x_0)(x-x_0)^0 + f^{(1)}(x_0)(x-x_0)^1$$
0次の項 1次の項

 $f(x_0)$  は 0 階微分(微分を 1 回もしていない、そのままの関数)と考えて、 $f^{(0)}(x_0)$  と書いた。また、0 乗は必ず 1 になるので、 $f(x_0)$  の後ろには  $(x-x_0)^0=1$  が隠れていると考えることができる。

このように書き換えた式をみると、なんとなく次のような続きを予想できる。

$$f(x) \stackrel{?}{=} f^{(0)}(x_0)(x-x_0)^0 + f^{(1)}(x_0)(x-x_0)^1 + f^{(2)}(x_0)(x-x_0)^2 + f^{(3)}(x_0)(x-x_0)^3 + \cdots$$
0 次の項 2 次の項 3 次の項

この式が正しいかどうかはわからないが、この式をベースに調整を加えていくアプローチを試してみよう。

#### 2次の項を加えた近似式

まず2次の項だけ加えた状態で、f(x)の2階微分を考えてみる。

$$f(x) \stackrel{?}{=} f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0)(x - x_0)^2$$

このとき、元の近似式は2階微分すると0になってしまうので、元の近似式にあった0次の項と1次の項は2階微分によって消えてしまうことになる。

よって、f(x)の2階微分は、2次の項だけの微分として考えればよい。

定数なので外に出せる
$$f''(x) \stackrel{?}{=} \frac{d^2}{dx^2} \left( f''(x_0) (x - x_0)^2 \right)$$

$$= f''(x_0) \cdot \frac{d^2}{dx} (x - x_0)^2$$

$$= f''(x_0) \cdot \frac{d}{dx} \left\{ \frac{d}{dx} (x - x_0)^2 \right\}$$

$$= f''(x_0) \cdot \frac{d}{dx} (2(x - x_0))$$

$$= f''(x_0) \cdot 2 \frac{d}{dx} (x - x_0)$$

$$= f''(x_0) \cdot 2 \cdot 1$$

$$= 2f''(x_0)$$

 $x = x_0$  を代入すると、

$$f''(x_0) = 2f''(x_0)$$

という、微妙に惜しい結果が得られる。

この結果から、2 次の項に  $\frac{1}{2}$  をかけておけば、 $f''(x_0) = f''(x_0)$  が成り立たせることができるとわかる。

つまり、近似式は次のように修正すればよい。

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f^{(2)}(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots$$
2 次の項

#### 3次の項を加えた近似式

3階微分した場合、先ほど追加した2次の項も消えてしまうので、さらに3次の項を加える必要がある。

$$f'''(x) \stackrel{?}{=} \frac{d^3}{dx^3} \left( f'''(x_0)(x - x_0)^3 \right)$$

$$= f'''(x_0) \cdot \frac{d}{dx} \left( \frac{d}{dx} \left( \frac{d}{dx} \left( (x - x_0)^3 \right) \right) \right)$$

$$= f'''(x_0) \cdot \frac{d}{dx} \left( \frac{d}{dx} \left( 3(x - x_0)^2 \right) \right)$$

$$= f'''(x_0) \cdot \frac{d}{dx} \left( 3 \cdot 2(x - x_0) \right)$$

$$= f'''(x_0) \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

先ほどと同じように考えて、3 次の項に  $\frac{1}{3\cdot 2\cdot 1}=\frac{1}{3!}$  をかけておけば、 $f'''(x_0)=f'''(x_0)$  が成り立たせることができる。

これで、近似式は次のようになる。

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f^{(2)}(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(x_0)(x - x_0)^3 + \cdots$$

2!=2·1=2 なので、2次の項の係数も階乗で書き直している。

0 次の項と 1 次の項についても、0! = 1、1! = 1 を使って書き換えれば、次のような規則的な式になっていることがわかる。

$$f(x) \simeq \frac{1}{0!} f^{(0)}(x_0)(x - x_0)^0 + \frac{1}{1!} f^{(1)}(x_0)(x - x_0)^1 + \frac{1}{2!} f^{(2)}(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{3!} f^{(3)}(x_0)(x - x_0)^3 + \cdots$$
0 次の項 2 次の項 3 次の項

これで、n次の項まで加えていった一般形が想像つくようになったのではないだろうか。


3.3. 1変数関数の積分 75

#### 無限に項を加えた近似式:テイラー展開


同じような考え方で、n次の項まで加えた近似式を作ることができる。

$$f(x) \simeq \sum_{n=0}^{n} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

 $n \to \infty$  とした場合のこの近似式には、テイラー展開という名前がつけられている。



特に、 $x_0 = 0$  の場合のテイラー展開には、マクローリン展開という別な名前がつけられている。



## 3.3 1変数関数の積分

積分とは、「部分を積み重ねる」演算である。

微小部分を調べる微分と、微小部分を積み重ねる積分は、互いに逆の操作になっている。

### 3.3.1 区分求積法:面積の再定義

長方形の面積は、なぜ「縦×横」で求められるのだろうか?


そこには、長方形の横幅分の長さを持つ線分を、長方形の高さに達するまで積み重ねるという発 想がある。

面積の計算を「線を積み重ねる」という発想で捉えると、あらゆる形状の面積を考えることができる。


長方形では、積み重ねる線の長さは一定だが、他の形状では、積み重ねる線の長さが変化する。 積み重ねるべき線の長さを、関数で表すことができたら…

\* \* \*

関数 y = f(x) が与えられたとき、高さ f(x) の線分を a から b までの区間で積み重ねることで、x 軸とグラフに挟まれた部分の面積を求めることを考える。



この考え方は、面積を求めたい部分を長方形に分割し、長方形の幅を限りなく 0 に近づけるという操作で表現できる。




3.3. 1変数関数の積分 77

 $a \le x \le b$  の区間を n 等分して、 $x_1, x_2, \ldots, x_n$  とする。

分割された各長方形は、幅が $\Delta x$  で、高さがf(x) であるので、各長方形の面積は次のように表せる。

$$\Delta S = f(x) \cdot \Delta x$$

どんどん Δx を小さくしていくと、細かい長方形分割で、面積を求めたい図形を近似できる。



つまり、求めたい面積は、分割した長方形の面積をすべて足し合わせることで近似できる。

$$S \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \cdot \Delta x$$

 $\Delta x \to 0$  の果てでは、幅を持たなくなった長方形は線分とみなせるので、もはや近似ですらなくなるだろう。

$$S = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \cdot \Delta x$$

このような考え方は、区分求積法と呼ばれる。

#### 3.3.2 定積分:面積を求める積分


ここで、区間  $a \le x \le b$  における関数 y = f(x) と x 軸の間の面積 S を求める式を、次のように表記する。

$$S = \int_{a}^{b} f(x) \, dx$$


 $\Sigma$  は離散的な和を表す記号であり、例えば  $\sum_{i=0}^n$  であれば、i を 1 ずつ増やして n に達するまで足し合わせることを意味する。

一方、ここで新たに導入した $\int$ は連続的な和を表す記号であり、微小変化を繰り返しながら足し合わせることを意味する。

 $\Sigma$  は間隔を取って足し合わせるのに対し、 $\int$  は間隔を限りなく小さくして足し合わせる。 足し合わせる間隔を限りなく小さくするという操作は、極限を取る操作に相当するので、 $\Sigma$  の極限を取ったもの  $\lim \sum$  をまとめて  $\int$  という記号で表記したと捉えることができる。 さらに、 $\lim_{\Delta x \to 0}$  とした果ての  $\Delta x$  は、微小変化を意味する dx と書き換えられている。



f(x) の値が負になる区間では、定積分の値も負になるため、定積分は符号付き面積を表す。



3.3. 1変数関数の積分

#### 79

#### 3.3.3 微小範囲の定積分から微分へ

定積分  $\int_a^b f(x)dx$  は、積分区間の取り方  $(a \, b \, o \, di)$  を変えると、当然異なる計算結果になる。

ここで、下端 a は固定し、上端 b を変化させて積分区間を広げていくことを考えよう。


上端が変化することを強調するため、上端はxと表記することにする。

このとき、定積分  $\int_a^x f(t)dt$  は、上端 x の関数として捉えられる。

$$S(x) = \int_{a}^{x} f(t)dt$$



 $\int$ の中で使っている変数 t は、積分区間の下端から上端まで動く変数であり、どんな文字を使ってもよい。 $\lceil t$  が下端 a から上端 x まで動く」なら違和感なく聞こえるが、 $\lceil x$  が下端 a から上端 x まで動く」というのはややこしいので、上端 x と区別するために t を使うことにした。




x を  $\Delta x$  だけ増加させたときに増える面積は、

$$S(x + \Delta x) - S(x) = \int_{x}^{x + \Delta x} f(t)dt$$

となるが、ここでさらに  $\Delta x$  を小さくしていくと…

増えた領域は、幅dx、高さf(x)の長方形とみなせるので、その面積はf(x)dxとなる。



よって、 $\Delta x \rightarrow 0$  としたときには、


$$S(x + dx) - S(x) = f(x)du$$

という式が成り立ち、これは実は見慣れた微分の関係式と同じ形をしている。

元の関数 導関数 
$$S(x+dx) = S(x) + f(x) du$$

この式は、定積分したもの F(x) を x で微分すると、積分前の関数 f(x) に戻るということを示している。


このような「積分したものを微分すると、元の関数に戻る」という事実は、微積分学の基本定理 として知られている。



## 3.3.4 不定積分:原始関数を求める積分

定積分の定義は面積から始まったが、定積分という操作で「微分したら元の関数に戻る」ような 関数を作ることもできた。

ここで、「微分したら元の関数に戻る」関数を次のように定義する。




「微分したら元の関数に戻る」関数の1つが、前節で調べた $S(x) = \int_a^x f(t)dt$  であったが、実はこのような関数は他にも存在する。

例えば、定数を微分すると 0 になるため、S(x) に任意の定数 C を加えた関数 S(x)+C を作っても、その微分結果は変わらず元の関数になる。

このことは、「原始関数には定数 C 分の不定性がある」などと表現されることがある。

「微分したら元の関数に戻る」関数を求める演算、すなわち「微分の逆演算」として捉えた積分を新たに定義してみよう。



## 3.3.5 原始関数による定積分の表現

少し前に、定積分  $\int_a^x f(t)dt$  を上端 x の関数 S(x) とみて、x を微小変化させることで、S(u) が f(u) の原始関数である(S(u) を u で微分したら f(u) になる)ことを確かめた。

## REVIEW

区間  $\Delta x$  での面積の増分を考え、

$$S(x + \Delta x) - S(x) = \int_{x}^{x + \Delta x} f(t)dt$$

 $\Delta x \to 0$  とすれば、次のような微分の関係式が得られる。

元の関数 導関数 S(x+dx) = S(x) + f(x) dx

さらに前節では、「微分したら元に戻る」原始関数は1つだけではなく、任意の定数Cを用いたF(x) + Cも、f(x)の原始関数であることを述べた。

そこで、f(x) の任意の原始関数を F(x) とおくことにする。

原始関数は任意の定数 C 分だけ異なるので、f(x) の原始関数の1つである S(x) は、f(x) の他の原始関数 F(x) を C 分ずらしたものになるはずである。

$$S(x) = F(x) + C$$

ここで、 $S(x) = \int_a^x f(t)dt$  に、x = a を代入すると、下端と上端が一致する領域の面積(定積分)は明らかに 0 なので、

$$S(a) = \int_{a}^{a} f(t)dt = 0$$

なんとここから、Cを求めることができる。

$$C = -F(a)$$

この C を用いて、S(x) を次のように表現できる。

$$S(x) = F(x) - F(a)$$

x = b を代入することで、積分区間の上端をbに戻した定積分を考えると、

$$S(b) = F(b) - F(a)$$
$$S(b) = \int_{a}^{b} f(x)dx$$


という、*S(b)* について2通りの表現が得られる。



上端を表すxという変数が現れなくなったので、 $\int$ の中で使っていた変数tはしれっとxに戻している。 $\int$ の中のxは「下端aから上端bまで動く」という意味しか持っていないので、何の文字を使っても意味は変わらない。

得られた2通りの表現式を組み合わせることで、次のような関係が成り立つ。

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = F(b) - F(a)$$





## 3.3.6 定積分の性質

面積としての理解だけではうまく想像できない性質も、原始関数との関係を使うことで数式で確 かめられるようになる。

#### 積分区間の結合

2 つの定積分があり、それらの積分区間が連続していれば、1 つの定積分としてまとめて計算で きる。






面積として考えれば明らかな性質だが、原始関数を使って証明することもできる。 f(x) の原始関数を F(x) とすると、

$$\int_{a}^{b} f(x)dx + \int_{b}^{c} f(x)dx = F(b) - F(a) + F(c) - F(b)$$
$$= F(c) - F(a)$$
$$= \int_{a}^{c} f(x)dx$$

として、式が成立することがわかる。

#### 積分区間の反転

積分区間の上限と下限を入れ替わると、符号が変わる。




これは、積分区間が連続する定積分の和の性質における、c = a の場合の式である。

$$\int_{a}^{b} f(x)dx + \int_{b}^{a} f(x)dx = \int_{a}^{a} f(x)dx$$
$$= 0$$
$$\int_{a}^{b} f(x)dx = -\int_{b}^{a} f(x)dx$$

#### 定積分の線形性

微分や ∑記号などと同様に、定積分も線形性を持つ。



この性質は、微分の線形性から導かれる。

f(x) の原始関数を F(x)、g(x) の原始関数を G(x) とすると、微分の線形性より、

$$\frac{d}{dx} \{ \alpha F(x) + \beta G(x) \} = \alpha \frac{d}{dx} F(x) + \beta \frac{d}{dx} G(x)$$
$$= \alpha f(x) + \beta g(x)$$

となるから、 $\alpha f(x) + \beta g(x)$  の原始関数は  $\alpha F(x) + \beta G(x)$  である。 よって、定積分を原始関数を使って書き表すと、


$$\int_{a}^{b} \left\{ \alpha f(x) + \beta g(x) \right\} dx = \alpha F(b) - \alpha F(a) + \beta G(b) - \beta G(a)$$
$$= \alpha \left\{ F(b) - F(a) \right\} + \beta \left\{ G(b) - G(a) \right\}$$
$$= \alpha \int_{a}^{b} f(x) dx + \beta \int_{a}^{b} g(x) dx$$

となり、原始関数を使うことで、微分の線形性から定積分の線形性につながることがわかる。


#### 3.3.7 不定積分の性質

原始関数は、微分によって元の関数に戻る関数だった。

そして、元の関数から原始関数を求める演算が不定積分である。



原始関数という言葉にとらわれないように表現すると、結局は次のような関係が成り立っている。



不定積分と微分は逆の演算 関数を微分すると導関数になり、導関数を不定積分すると元の関数に戻る。

このような関係によって、微分が持つ性質から、不定積分の性質を導くことができる。

#### 不定積分の線形性

微分の線形性から、不定積分の線形性も成り立つ。

#### REVIEW

微分の線形性

$$(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x)$$

微分の線形性の式の両辺を不定積分すると、左辺は微分する前の関数  $\alpha F(x) + \beta G(x)$  に戻るので、

$$\int (\alpha F(x) + \beta G(x))' dx = \int \{\alpha F'(x) + \beta G'(x)\} dx$$
$$\alpha F(x) + \beta G(x) = \int \{\alpha F'(x) + \beta G'(x)\} dx$$

ここで、導関数を不定積分すると元の関数に戻ることから、

$$F(x) = \int F'(x)dx$$
$$G(x) = \int G'(x)dx$$


と置き換えることができる。

これらを使って左辺を書き換えると、

$$\alpha \int F'(x)dx + \beta \int G'(x)dx = \int \left\{ \alpha F'(x) + \beta G'(x) \right\} dx$$

F(x) は f(x) の原始関数、G(x) は g(x) の原始関数であるとすると、微分したらそれぞれ元に戻るので、次のように書き表せる。

$$\alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx = \int \left\{ \alpha f(x) + \beta g(x) \right\} dx$$



## Chapter 4

# 線形代数

線形代数は、高次元に立ち向かうための強力な道具となる。

どれだけ高次元に話を広げたとしても、「関係」を語る言葉の複雑さが増すことはない。 この章では、そんな状況を実現するための理論を追いかけていく。

## 4.1 ベクトルの作り方

## 4.1.1 移動の表現としてのベクトル

平面上のある点の位置を表すのに、よく使われるのが**直交座標**である。 直交座標では、x 軸と y 軸を垂直に張り、


- 原点 O からの x 軸方向の移動量(x 座標)
- 原点 O からの y 軸方向の移動量(y 座標)

という2つの数の組で点の位置を表す。

座標とは、「x 軸方向の移動」と「y 軸方向の移動」という2回の移動を行った結果である。 右にどれくらい、上にどれくらい、という考え方で平面上の「位置」を特定しているわけだが、単 に「移動」を表したいだけなら、点から点へ向かう矢印で一気に表すこともできる。

ある地点から別のある地点への「移動」を表す矢印をベクトルという。


ベクトルが示す、ある地点からこのように移動すれば、この地点にたどり着く…といった「移動」 の情報は、相対的な「位置関係」を表す上で役に立つ。



#### 平行移動してもベクトルは同じ

座標は「位置」を表すものだが、ベクトルは「移動」を表すものにすぎない。 座標は「原点からの」移動量によって位置を表すが、ベクトルは始点の位置にはこだわらない。

たとえば、次の2つのベクトルは始点の位置は異なるが、同じ向きに同じだけ移動している矢印 なので、同じベクトルとみなせる。




このような「同じ向きに同じだけ移動している矢印」は、平面内では平行な関係にある。 つまり、平行移動して重なる矢印は、同じベクトルとみなすことができる。 **4.1.** ベクトルの作り方 91

#### 移動の合成とベクトルの分解

ベクトルは、各方向への移動の合成として考えることもできる。

純粋に「縦」と「横」に分解した場合は直交座標の考え方によく似ているが、必ずしも直交する 方向のベクトルに分解する必要はない。




### 4.1.2 高次元への対応:数ベクトル

2次元以上の空間内の「移動」を表すには、「縦」と「横」などといった 2 方向だけでなく、もっと多くの方向への移動量を組み合わせて考える必要がある。

また、4次元を超えてしまうと、矢印の描き方すら想像がつかなくなってしまう。それは、方向となる軸が多すぎて、どの方向に進むかを表すのが難しくなるためだ。


そこで、一旦「向き」の情報を取り除くことで、高次元に立ち向かえないかと考える。


移動を表す矢印は「どの方向に進むか」と「どれくらい進むか」という向きと大きさの情報を持っているが、その「どれくらい進むか」だけを取り出して並べよう。



こうして単に「数を並べたもの」もベクトルと呼ぶことにし、このように定義したベクトルを数 ベクトルという。


数を並べるとき、縦と横の2通りがある。それぞれ列ベクトル、行ベクトルとして定義する。





単に「ベクトル」と言った場合は、列ベクトルを指すことが多い。


行ベクトルは、列ベクトルを横倒しにしたもの(列ベクトルの転置)と捉えることもできる。



## 4.1.3 ベクトルの和

ベクトルによって数をまとめて扱えるようにするために、ベクトルどうしの演算を定義したい。

ベクトルどうしの足し算は、同じ位置にある数どうしの足し算として定義する。




i番目の数がaとbの両方に存在していなければ、その位置の数どうしの足し算を考えることはできない。


そのため、ベクトルの和が定義できるのは、同じ次元を持つ(並べた数の個数が同じ)ベクトル どうしに限られる。

#### 移動の合成としてのイメージ

数ベクトルを「どれくらい進むか」を並べたものと捉えると、同じ位置にある数どうしを足し合わせるということは、同じ向きに進む量を足し合わせるということになる。

たとえば、x 軸方向に  $a_1$ 、y 軸方向に  $a_2$  進んだ場所から、さらに x 軸方向に  $b_1$ 、y 軸方向に  $b_2$  進む…というような「移動の合成」を表すのが、ベクトルの和である。





#### 平行四辺形の法則



[Topo 2: 平行移動しても同じベクトルなので…]

ベクトルの差:逆向きにしてから足す

[Topo 3: irobutsu-linear-algebra 2.1.2 ベクトルの差]




#### 矢に沿った移動で考える

[Topo 4: 手持ちの画像を参考に、和と差の両方について書く]





## 4.1.4 ベクトルのスカラー倍

「どれくらい進むか」を表す数たち全員に同じ数をかけることで、向きを変えずにベクトルを「引き伸ばす」ことができる。




ここで向きごとにかける数を変えてしまうと、いずれかの方向に多く進むことになり、ベクトル の向きが変わってしまう。そのため、「同じ」数をかけることに意味がある。





そこで、ベクトルの定数倍(スカラー倍)を次のように定義する。




## 4.1.5 一次結合

ベクトルを「引き伸ばす」スカラー倍と、「つなぎ合わせる」足し算を組み合わせることで、ある ベクトルを他のベクトルを使って表すことができる。



[Todo 5: 平行四辺形で図を描き直す]



このように、スカラー倍と和のみを使った形を一次結合もしくは線形結合という。

## 4.1.6 基底

3次元までのベクトルは、矢印によって「ある点を指し示すもの」として定義できる。 しかし、4次元以上の世界に話を広げるため、ベクトルを単に「数を並べたもの」として再定義した。

点を指し示すためのもう一つの概念として、座標がある。

座標も結局は矢印と同様に、x 軸方向にこのくらい進み、y 軸方向にこのくらい進む、というように、「進む方向」と「進む長さ」を持つ。

単なる数の並びを、向きと大きさを持つ量として復元するための道具が、基底である。

## 4.2 ベクトルの測り方



# Chapter 5

# 多変数関数



## Chapter 6

# 複素数と複素関数

## 6.1 虚数の導入

## **6.1.1** $x^2 = -1$ の解は存在するか?

「負の数と負の数をかけたら正の数になる」というのが、中学校で初めて数学の門を叩いて真っ先 に学ぶ事実である。

$$(-1)\times(-1)=1$$

方程式の言葉で書けば、 $x^2 = 1$ の解の一つは x = -1 となる。(もう一つの解は x = 1 だ。) では、次の方程式の解は考えられるだろうか?

$$x^2 = -1$$

 $x^2$  ということは、同じ数 x どうしをかけて -1 にならなければならない。 とはいえ、正の数どうしをかけても正の数になるし、負の数どうしをかけても正の数になる。


つまり、このようなxは「存在しない」ということになる。

しかし、このような方程式の解が存在した方がありがたいと考えた人もいた。(私たちもこの先、 その有り難さを知ることになる。)

「負の数と負の数をかけたら正の数になる」というこれまでの数の体系を壊さずに、 $x^2 = -1$ が成り立つような数を新たに考えよう、という話が始まる。

## 6.1.2 回転で捉える数直線の拡張

これまでの数の体系である実数は、すべて数直線上に存在していた。



 $x^2 = -1$ の解となる x は、少なくともこの数直線上には存在しない。

ならば、数の体系を平面に拡張して考えてみよう。

まずは、平面というスケールに飛び出して (-1)×(-1) = 1 を考えてみる。

$$1 \times (-1) \times (-1) = 1$$

と書き直すと、「-1を2回かけたら1に戻る」ということがいえる。


図示すると、次のようなことが起こっていると考えられないだろうか?




「-1をかける」という操作を、平面上の180度回転と捉える。

すると、2回かけて -1 になる数 ( $x^2 = -1$  の解) は、180 度回転の中間に位置する数と考えることができる。

6.1. 虚数の導入 101



このような方向性で拡張した数を複素数といい、?にあたる数は虚数 i と呼ぶことにする。




## 6.1.3 虚数の定義

前節での話を踏まえて、新たな数を次のように定義する。

	七米	kτ	古:£	무국	<sub>v</sub> 2	_	1 σ	角忍。	<b>の</b> -	 を 「	专料	٠ ١	呼7	k,	;	表で	<del>}-</del>					
J.	<u> </u>		JJ 13	土工	л		1 0.	<i>)</i> /34-1		ار ت	亚女义		+1 C	``	<i>i</i>	10	9 0					

これで、 $x^2 = -1$ の解を、次のように記述できるようになった。




## 6.2 複素数の表現


### 6.2.1 複素数と複素平面

前章では、数直線上の1から 90 度回転したところに、虚数 i という数が存在するという考え方を 導入した。

このような平面において、実数が存在する軸(お馴染みの数直線)を実軸 Re、虚数が存在する軸を虚軸 Im と呼ぶことにする。



では、実軸上にも虚軸上にもない、平面上の点に位置する数は、どう表せばよいだろうか? 平面上の点をベクトル(矢印)で表す考え方を流用して、次のように考えてみる。 6.2. 複素数の表現 103



aというベクトルは実軸上の単位ベクトル1をa倍したもの、biというベクトルは虚軸上の単位ベクトルiをb倍したものと考え、平面上の任意の数はそれらのベクトルの和の形で表す。

このとき、aを実部、bを虚部と呼び、a+biの形で表した数を複素数という。


複	素娄	攵																						
i to	を虚	数单	位、	a,	b t	実	数と	: U	<b>.</b> ?	欠の	形	で表	され	いる	数	を複	素	数。	とい	う。				
												а		hi										
	0.1	٠, ٠,		<i>y</i> ,		7	, ,	-	÷17	la no			1	O i										
ث	0) E	<b>さき</b> 、	. a	を <u>:</u>	美制	\$ .	b E	虚	出	۳	K-31,	0												

b=0 であるとき、複素数 a+bi は実数 a となるので、複素数は実数を含む数の体系(実数の拡張)となっている。

また、数直線の拡張として考えてきた平面は、平面上の各点が複素数に対応するので、複素平面 と呼ばれる。

数直線が実数の集合を表すのに対し、複素平面は複素数の集合を表す。

複素平面 複素数の実部を横軸、虚部を縦軸にとった平面を複素平面と呼ぶ。



複素平面において、実軸を Re、虚軸を Im と表記しているのは、複素数の実部 (Real Part) と虚部 (Imaginary Part) をそれぞれの軸で表しているからである。

#### 6.2.2 複素数の絶対値と偏角


複素数を複素平面上のベクトルとして捉えることで、複素数に幾何学的な意味を持たせることが できる。

そして最終的には、-1 をかける操作が180 度回転であることや、i をかける操作が90 度回転であることの一般化として、複素数のかけ算に複素平面上の回転という解釈を与える。


そのための準備として、まずは複素数に関する「長さ」と「角」を定義しよう。

#### 複素数の「長さ」

実数における絶対値は、数直線上の原点 0 からその数までの距離を表していた。 複素数の絶対値も、同じように「原点からの距離」として定義する。





6.2. 複素数の表現 105



#### 複素数の「回転角」


ここで、複素数zが0でなければ、原点Oからzまでを結ぶベクトルと、実軸 Re の正の向きとのなす角 $\theta$ を考えることができる。






ここで、 $\theta$ を整数回  $2\pi$  シフトさせても(何周回転させても)、同じ複素数  $\pi$  の位置に戻ってくる。

つまり、1つの複素数zに対して偏角の値は複数考えられるので、それが困る場合には、主値と呼ばれる代表値を使うことにする。



## 6.2.3 複素数の極形式

複素数が持つ「長さ」と「角」を定義したところで、それらを使って1つの複素数を表現できないか?ということを考える。




複素数 z = a + bi の絶対値を r、偏角を  $\theta$  とすると、

$$a = r \cos \theta$$

$$b = r \sin \theta$$

となり、複素数々は絶対値と偏角を使った表示(極形式)に置き換えることができる。

6.3. 複素数の演算 107




絶対値を「半径」、偏角を「回転角」とみなし、それらを使って複素数を表現できたことで、複素数と回転との関係についても調べる準備が整った。

## 6.3 複素数の演算

ベクトルとの対応や極形式をもとに、複素数の演算を定義していこう。

## 6.3.1 複素数の和と差

複素数の和・差は、ベクトルの和・差と同じように定義される。



つまり、実部同士・虚部同士の足し算(引き算)を行えばよい。 実部同士を足したものが実部になり、虚部同士を足したものが虚部になる。 この定義は、実部と虚部を並べたベクトルの和(差)と一致している。

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \pm c \\ b \pm d \end{pmatrix}$$

#### 6.3.2 複素数の積

複素数の積は、ベクトルの演算から定義をそのまま流用することはできない。(そもそも、ベクトルの積とは何か?という問題になる。)

複素数のかけ算で成り立っていてほしい性質は、-1 をかける操作が 180 度回転であることや、i をかける操作が 90 度回転であることだ。

というわけで、複素数の積は回転を表すものとして定義したい。

#### 回転行列から定義を探る

複素数 z = a + bi の実部と虚部を並べたベクトル  $\binom{a}{b}$  を、原点を中心に  $\theta$  だけ回転させたベクトル は、2 次元の回転行列を左からかけた形で次のように表せる。

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\cos \theta - b\sin \theta \\ a\sin \theta + b\cos \theta \end{pmatrix}$$

ここで、絶対値が1、偏角が $\theta$ である複素数w = c + diの実部と虚部は、

$$c = \cos \theta$$
$$d = \sin \theta$$

と表せるから、これらを使って回転行列を書き直してみる。


$$\begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd \\ ad + bc \end{pmatrix}$$

これは、複素数 z=a+bi の実部と虚部を並べたベクトルを、複素数 w=c+di の実部と虚部だけを使って回転させたものと捉えられる。

つまり、zにwをかけることでzを回転させたいのなら、zとwの積を

$$zw = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

と考えればよいのではないだろうか。



6.3. 複素数の演算 109

ここでは、回転行列を経由して、回転としての複素数の積の定義を探ってみたが、実は2つの複素数の積を展開して実部と虚部をまとめるだけで、まったく同じ式が得られる。

$$zw = (a + bi)(c + di)$$

$$= ac + adi + bci + bdi^{2}$$

$$= ac + adi + bci - bd$$

$$= (ac - bd) + (ad + bc)i$$

単純な式展開によって得られる定義と、回転行列によって妥当だと思えた定義が一致するのは、と ても不思議なことではないだろうか。


このように、複素数の積は自然と回転を表すものになっている。


#### 6.3.3 複素数の商




#### 6.3.4 共役複素数









#### Proof: 共役複素数と絶対値

複素数z = x + iyとその共役複素数 $\bar{z} = x - iy$ の積を計算する。

$$z\overline{z} = (x + iy)(x - iy)$$


$$= x^2 - ixy + ixy - i^2y^2$$

$$= x^2 + y^2$$

$$= |z|^2$$

6.4. オイラーの公式

## 6.4 オイラーの公式



## Chapter 7

## フーリエ解析

#### 7.1 波の2つの捉え方


波は2つの捉え方ができる。


- 空間的に捉える波:波の形そのもの
- 時間的に捉える波:波の振動

#### 7.1.1 空間的に捉える波

波とは、一定の間隔で同じ形が繰り返されるものである。

空間的に捉える波は、まさにその波の形そのもので、波の形を位置xの関数として表す。






#### 7.1.2 時間的に捉える波


波を時間軸から見たとき、波を構成する最小パターンは幅ではなく時間である。 その最小パターンを周期と呼ぶ。

周期は、波を時間軸から見たときの「波長」の言い換えともいえる。



#### 7.2 角周波数と正弦波

角周波数 動径が単位時間内に進む角を角周波数と呼び、ωで表す。




 $\sin\theta$  や  $\cos\theta$  は、 $\theta = \omega t$  の関係を用いると、動径  $\theta$  ではなく角周波数  $\omega$  の関数とみることができる。



#### 7.2.1 角周波数と振動数の関係

円の1周は $2\pi$ であり、単位時間あたりに進む円周は角周波数 $\omega$ である。

(角周波数は「角」の大きさとして定義したが、弧度法のおかげで、「円周」の長さとしても捉えられる。) ここで、単位時間あたりに進む円周  $\omega$  は、1 周  $2\pi$  のうちのどれくらいだろうか? その答えは、 $\omega$  を「1 周あたりの量」 $2\pi$  で割ったものになる。



ここで、三角関数は円関数とも呼ばれるように、円の1周は三角関数の1振動に対応する。

振動を円周上の回転として表す三角関数のおかげで、「どれくらい回るか?」を「どれくらい振動 するか?」とみることができる。

つまり、動径が単位時間に  $\frac{\omega}{2\pi}$  だけ回転するということは、単位時間に  $\frac{\omega}{2\pi}$  だけ振動するということだ。

角周波数と振動数の関	<b></b>		
角周波数を ω とすると	、振動数νは次のように	こ表せる。	
	v =	$\omega$	
		$2\pi$	


#### 7.2.2 角周波数と周期の関係

ここまでで、振動数 v は 2 通りの表し方ができることがわかった。

- $\nu = \frac{1}{T}$  (周波数:単位時間に含まれる、最小波の時間幅)
- $v = \frac{\omega}{2\pi}$  (振動数:単位時間に含まれる、振動の回数)

この2式を組み合わせて、次のような関係が得られる。

$$\omega = 2\pi v = \frac{2\pi}{T}$$




#### 7.3 偶関数と奇関数


sin 関数と cos 関数は、どちらも正弦波と呼ばれるが、その性質は異なる。 sin は奇関数であり、cos は偶関数である。


この違いが、後に議論するフーリエ級数展開においても重要な役割を果たす。

7.3. 偶関数と奇関数 117

#### 7.3.1 偶関数と奇関数は異なる対称性を持つ







1つの関数が、この両方の性質を持つことはない。

つまり、偶関数であり奇関数でもある関数は存在しない。

#### 7.3.2 積に関する性質

偶関数と奇関数の積 偶関数と奇関数の積は、奇関数となる。

Proof: 偶関数と奇関数の積

f(x) を奇関数、g(x) を偶関数とすると、

となり、引数を-1倍すると符号が反転するため、f(x)g(x)は奇関数である。

奇関数どうしの積 奇関数と奇関数の積は、偶関数となる。

Proof: 奇関数どうしの積

f(x),g(x) を奇関数とすると、

$$f(x)g(x) = -f(-x) \cdot \{-g(-x)\}$$
$$= f(-x)g(-x)$$

となり、引数を-1倍しても符号がそのままなので、f(x)g(x)は偶関数である。

偶関数どうしの積 偶関数と偶関数の積は、偶関数となる。


Proof: 偶関数どうしの積

f(x),g(x) を偶関数とすると、

となり、引数を-1倍しても符号がそのままなので、f(x)g(x)は偶関数である。

7.3. 偶関数と奇関数 119

#### 7.3.3 和に関する性質



Proof: 奇関数どうしの和

f(x), g(x)を奇関数とすると、

$$f(x) + g(x) = -f(-x) - g(-x)$$

$$= -\{f(-x) + g(-x)\}$$

$$f(-x) + g(x) = -\{f(x) + g(x)\}$$
両辺 -1 倍して両辺入れ替え

となり、引数を-1倍すると符号が反転するため、f(x) + g(x)は奇関数である。

偶関数どうしの和 偶関数と偶関数の和は、偶関数となる。


Proof: 偶関数どうしの和


f(x), g(x) を偶関数とすると、


$$f(x) + g(x) = f(-x) + g(-x)$$


となり、引数を -1 倍しても符号がそのままなので、f(x) + g(x) は偶関数である。

#### 7.3.4 偶関数・奇関数の積分









#### 7.4 直交関数系としての三角関数

sin は奇関数であり、cos は偶関数であることから導かれる、sin と cos の重要な性質がある。

#### 7.4.1 関数の内積と直交関数系


ベクトルの内積は、次のように定義されていた。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

ここで、離散的な和  $\Sigma$  を、連続的な足し合わせ  $\int$  に置き換えることで、この内積の定義を関数に拡張する。


$$\langle f, g \rangle = \int_{a}^{b} f(x)g(x)dx$$

このように拡張して定義された関数の内積は、ベクトルの内積と同様の性質を持つことが知られている。




ベクトルの内積では、「2つのベクトルが直交しているとき、その内積は0になる」という性質があった。内積が0というのは、「互いに共通な成分を一切持たない」ということであり、図形的には2つのベクトルのなす角が直角であることを意味していた。

関数の内積においても、「異なる関数どうしの内積が 0 であれば、2 つの関数は直交している」と表現しよう。



そして、互いに直交する関数の集合は、直交関数系と呼ばれる。




直交関数系は、基底としての役割も果たす。

直交しているベクトルを基底ベクトルとして使うことで、基底ベクトルの一次結合で他のベクトルを表現できるのと同じように、直交関数系を使うことで、関数を「直交基底関数の一次結合」として表現できる。


#### 7.4.2 sin と cos の直交性

1、sin、cos という 3 つの関数は、直交関数系をなすことが知られている。 実際に内積を計算することで、その事実を確認してみよう。


#### sin どうしの内積



#### cos どうしの内積




#### sin と cos の内積




7.5. フーリエ級数 123

#### 1どうしの内積



#### 7.5 フーリエ級数

#### 7.5.1 そもそも級数とは



級数展開は、近似や性質の分析に役立つ。

代表的な級数展開:マクローリン展開

f(x) が無限回微分可能なとき、f(x) は多項式関数  $\{x^0, x^1, x^2, \dots\}$  を使って級数展開できる。

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$


このような級数展開をマクローリン展開という。

代表的な級数展開:フーリエ級数展開

f(x) が特定の条件を満たすとき、f(x) は三角関数を使って級数展開できる。

このような級数展開をフーリエ級数展開といい、これからの議論の対象となる。

#### 7.5.2 有限区間で定義された関数のフーリエ級数展開



#### 7.5.3 フーリエ級数展開の周期関数への拡張


元の関数 f(t) には区間の制限を設けていたが、フーリエ級数を構成する三角関数は、無限区間で定義されている。

そして、三角関数は、区間幅Tだけずらしても同じ値をとる、周期Tの周期関数である。

つまり、特定の区間内の関数 f(t) の形を、無限区間内で T ずつずらしていっても、それを表現するフーリエ級数の式は変わらない。

関数 f(t) が、区間の制限をなくしても同じ形を繰り返すだけ(周期関数)であれば、先ほどのフーリエ級数展開がそのまま成り立つことになる。


7.5. フーリエ級数 125




#### 7.5.4 不連続点におけるフーリエ級数の値

次のような矩形波 f(t) では、 $t = \frac{T}{n}$  が不連続な点となる。

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (-\pi \le t < 0) \\ 1 & (0 \le t < \pi) \end{cases}$$



この関数をフーリエ級数展開し、k項までの和を求めた結果が、 $s_k$ のような波形となる。




k が大きくなるほど、 $s_k$  は元の矩形波 f(t) に近づいていることがわかる。 ここで、元の関数の不連続点である  $t=\frac{T}{n}$  において、 $s_k$  は不連続点を通過している。 例えば、t=0 において、t=0 より左側では -A に近い値、右側では A に近い値をとる。

- t=0 に右から近づいていくと、 $s_k$  は A に近づいていく(右極限は A)
- t=0 に左から近づいていくと、 $s_k$  は -A に近づいていく(左極限は -A)

そして、t=0において、 $s_k$ はAと-Aの間の値(原点)を通過している。

一般に、不連続となるtにおいて、フーリエ級数展開の値は、その点での左右の極限値の平均値となる。



#### 7.5.5 フーリエ級数展開の意味

フーリエ級数展開の式は、

- 1の係数が a<sub>0</sub>
- $\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)$  の係数が  $a_n$
- $\sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)$  の係数が  $b_n$

となっていた。

フーリエ級数展開は、次の基本関数系を使った級数展開といえる。

$$\left\{1,\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right),\sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)\right\}$$

ここで、

7.5. フーリエ級数 127


#### REVIEW

 $\sin \omega t$  や  $\cos \omega t$  は、角周波数  $\omega$  の正弦波と呼ばれる

ことを思い出すと、フーリエ級数展開を構成する基本関数系は、角周波数  $\omega_n = \frac{2\pi n}{T}$  の正弦波である。

 $(1 \, \text{tcos} \, \frac{2\pi nt}{T} \, \text{における}, n = 0 \, \text{の場合だと考えることができる}_{\circ})$ 

つまり、フーリエ級数展開は、関数 f(t) を角周波数  $\omega_n$  の正弦波に分解することである。




関数 f(t) がどのような周波数成分で構成されているか?を解き明かすのがフーリエ級数展開で、フーリエ係数は時間領域から周波数領域へのマッピングの役割を果たしている。

#### 7.5.6 フーリエ級数展開のさまざまな表現式

フーリエ級数展開の式は、文献によって異なるいくつかの形で表現される。


#### 定数項をまとめた表現

定数項  $a_0$  を、 $a_n$  の n=0 の場合として考えることができる。 その場合、フーリエ級数展開は次のように表される。



#### 角周波数を使った表現

角周波数  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$  を使って、フーリエ級数展開の式を書き換えることもできる。



7.5. フーリエ級数


が成り立つとしたら、フーリエ係数 
$$a_0, a_n, b_n$$
 は次のようになる。 
$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt$$
 
$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos \omega_0 nt dt$$
 
$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin \omega_0 nt dt$$

#### 区間を 0 始まりにずらした表現

有限区間  $-\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2}$  で定義された関数のフーリエ級数展開を考えてきたが、その有限区間は区間幅が T であればなんでもよい。

特に、 $0 \le t \le T$  で定義された関数のフーリエ級数展開を考えることも多い。

区間を変えても、周期関数への拡張は同様の議論により成り立ち、次のことがいえる。



このフーリエ係数の式は、区間  $-\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2}$  の場合の式を平行移動+置換積分することで示される。

#### 7.5.7 奇関数のフーリエ級数(フーリエ正弦級数)

f(t) が奇関数の場合、それを表現するフーリエ級数には、奇関数しか入らない。

奇関数と奇関数の和が奇関数になることから、そう予想できる。

偶関数 cos の項が消え、奇関数 sin の項だけが残ることを確かめるため、各フーリエ係数を計算してみよう。

#### 定数項 $a_0$

原点に対して対称な範囲での奇関数の積分は0になるから、

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt$$
$$= 0$$

 $\cos$  の項の係数  $a_n$ 

∫の中身を見ると、奇関数と偶関数の積は奇関数になるので、積分結果は0になる。

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

$$= 0$$

sin の項の係数 *b*<sub>n</sub>

∫の中身を見ると、奇関数と奇関数の積は偶関数になるので、

#### REVIEW

偶関数の積分公式

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2 \int_{0}^{a} f(x)dx$$

を使って計算する。

7.5. フーリエ級数 131


$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

$$= \frac{2}{T} \cdot 2 \int_{0}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

$$= \frac{4}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

まとめ:フーリエ正弦級数

以上より、 $a_0$ 、 $a_n$  は 0 になるため、奇関数のフーリエ級数は、 $\sin$  の項だけで表現される。 奇関数のフーリエ級数は、フーリエ正弦級数と呼ばれる。



#### 7.5.8 偶関数のフーリエ級数(フーリエ余弦級数)

f(t) が偶関数の場合、それを表現するフーリエ級数には、偶関数しか入らない。

偶関数と偶関数の和が偶関数になることから、そう予想できる。

奇関数 sin の項が消え、偶関数 cos の項だけが残ることを確かめるため、各フーリエ係数を計算してみよう。

定数項  $a_0$ 

偶関数の積分公式を使って計算する。

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{f(t)}{f(t)} dt$$
$$= \frac{1}{T} \cdot 2 \int_{0}^{\frac{T}{2}} f(t) dt$$
$$= \frac{2}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} f(t) dt$$

 $\cos$  の項の係数  $a_n$ 

 $\int$ の中身を見ると、偶関数と偶関数の積は偶関数になるので、偶関数の積分公式を使って計算する。

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

$$= \frac{2}{T} \cdot 2 \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

$$= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

 $\sin$  の項の係数  $b_n$ 

 $\int$ の中身を見ると、偶関数と奇関数の積は奇関数になるので、積分結果は0になる。


$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{f(t)}{\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}} \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

まとめ:フーリエ余弦級数

以上より、 $b_n$  は 0 になるため、偶関数のフーリエ級数は、 $\cos$  の項だけで表現される。

7.5. フーリエ級数 133

偶関数のフーリエ級数は、フーリエ余弦級数と呼ばれる。




# Part II Applying Mathematics

## Chapter 8

## 線形システム

#### 8.1 システムの線形性



## Part III

## Redefining Mathematics

### Chapter 9

## $\varepsilon$ - $\delta$ 論法による無限の記述

ここまでのこの本では、極限というものを厳密に定義していなかった。また、微分と積分において、イメージで導出できることを最重視し、厳密な議論を避けた箇所が多くある。


厳密には、極限は $\varepsilon$ - $\delta$ 論法によって定義され、微分積分の基礎理論は極限の議論に基づいている。  $\varepsilon$ - $\delta$ 論法に踏み込んでいない私たちは、極限というものを語る言葉をまだ持ち合わせていない。

#### 9.1 実数の集合

厳密な理論を展開する上で、知っておくべき言葉の定義を行う。

#### 9.1.1 区間

2つの実数の間の範囲は、区間と呼ばれる。



区間は、端点を含むかどうかによって、開区間、閉区間、半開区間に分類される。

#### 開区間


端点を含まない区間を開区間という。


# 開区間 $a \le x \le b$ となる実数 x の集合を 開区間 といい、(a,b) と表す。



#### 閉区間

端点を含まない区間を閉区間という。







#### 半開区間

一方の端点を含み、他方の端点を含まない区間を半開区間という。

9.2. 数列の極限 143





#### 9.2 数列の極限


微分を定義するには関数の極限を考えるが、関数の極限の諸性質は、数列の極限から導かれる。 まずは、 $\varepsilon-\delta$  論法(数列の場合は  $\varepsilon-N$  論法とも呼ばれる)によって数列の極限を定義し、その 性質をひとつひとつ確かめていこう。

#### 9.2.1 εで「一致」をどう表現するか

「限りなく近づく」という表現では、「限りなく」の部分に無限という概念が含まれてしまう。 有限の値 $\epsilon$ を使って、無限を表現しようとするのが $\epsilon$ - $\delta$  論法である。


\* \* \*

 $\varepsilon$  -  $\delta$  論法で極限を定義する前に、有限値  $\varepsilon$  を使った議論の例を見てみよう。



実数は連続である(数直線には穴がない)ため、 $a \geq b$ が異なる実数であれば、 $a \geq b$ の間には無 数の実数が存在する。

つまり、 $a \ge b$  が異なる限り、その間の距離 |a-b| は絶対に 0 にはならない。



|a-b| が 0 にならないということは、ここでも実数の連続性によって、|a-b| より小さい実数が存 在してしまう。

たとえば、 $a \ge b$  の間の中点  $x = \frac{|a-b|}{2}$  は、|a-b| よりも小さい。



a と b の間の中点というと  $\frac{a-b}{2}$  だが、正の数  $\varepsilon$  と比較するため、絶対値をつけて  $\frac{|a-b|}{2}$  としている

|a-b| より小さい実数が存在してしまうと、「任意の」 $\varepsilon > 0$  に対して、 $|a-b| < \varepsilon$  を成り立たせる ことができない。

 $\varepsilon$ はなんでもよいのだから、|a-b|より小さい実数を $\varepsilon$ として選ぶこともできてしまう。 しかし、|a-b| より小さい実数を  $\varepsilon$  としたら、 $|a-b| < \varepsilon$  は満たされない。

|a-b| が 0 でないという状況下では、あらゆる実数  $\varepsilon$  より |a-b| を小さくすることは不可能である。 したがって、 $|a-b| < \varepsilon$  を常に成り立たせるなら、|a-b| = 0、すなわち a = b となる。

ここまでの考察から直観を取り除いて、この定理の数学的な証明をまとめておこう。

**Proof**: 有限値 $\varepsilon$ の不等式による一致の表現

 $a \neq b$  と仮定する。

 $\varepsilon_0 = \frac{|a-b|}{2}$  とおくと、絶対値 |a-b| が正の数であることから、 $\varepsilon_0$  も正の数となる。 よって、 $|a-b|<\varepsilon_0$  が成り立つので、

$$|a-b| < \frac{|a-b|}{2}$$
   
  $2|a-b| < |a-b|$    
  $2|a-b| - |a-b| < 0$    
  $|a-b| < 0$ 

絶対値が負になることはありえないので、 $a \neq b$  の仮定のもとでは矛盾が生じる。したがって、a = b でなければならない。

なお、 $|a-b| < \varepsilon$ の右辺を定数倍し、 $|a-b| < k\varepsilon$  などとしても、この定理は成り立つ。

定理「有限値 $\varepsilon$ の不等式による一致の表現」は、定数をkとして、次のように書き換えることもできる。

$$|a - b| < k\varepsilon \implies a = b$$

この場合、証明で $\epsilon_0 = \frac{|a-b|}{2k}$ とおけば、まったく同様の議論が成り立つからだ。

実際に、 $|a-b| < 2\varepsilon$  とした場合のこの定理を、後に登場する数列の極限の一意性の証明で使うことになる。

## 9.2.2 ε-N 論法による数列の収束

 $arepsilon - \delta$  論法は、数列の極限に適用する場合、arepsilon - N 論法と呼ばれることが多い。


「数列が $\{a_n\}$  が $\alpha$  に収束する」ことの $\varepsilon-N$  論法による表現を、まずはイメージで掴んでみよう。

\* \* \*


まず、 $\alpha$ の周りに、両側それぞれ $\varepsilon$ だけ広げた区間を考える。

 $\varepsilon$ は正の数ならなんでもよいとすれば、 $\varepsilon$ を小さな数に設定し、いくらでも区間を狭めることができる。

そして、「ここから先の項はすべて区間内に収まる」といえる位置に、Nという印をつけておく。




 $\varepsilon$ を小さくしていくと、 $\varepsilon$ による  $\alpha$  周辺の区間に入る項は少なくなる。 それでも、N をずらしていけば、N 以降はこの区間に収まる項だけになる。 これこそが「収束」という現象だと定義するのが、 $\varepsilon-N$  論法の考え方である。



区間幅 (の半分) となる  $\varepsilon$  をどんなに小さくしても、[ N 番目以降は区間内に収まる項だけになる」といえるような N を設定できるか?が肝心で、そのような N が存在するなら、数列は収束するといえる。

このことを、数学の言葉でまとめておこう。



 $\varepsilon - \delta$  論法によるこの定義を用いることで、数列の収束に関する諸性質を証明できるようになる。

#### 9.2.3 数列の極限の一意性

数列が最終的に複数の極限値に散らばるとしたら、それは収束と呼べるだろうか?  $\varepsilon - \delta$  論法による収束の定義は、そのような状況をきちんと除外するようになっている。

数列が複数の値に収束することはない。このことを示すのが、次の定理である。

÷	粉刀	آبا ہ	机石	日の	7	字 州																		
3	メスフ	י וי	157-	F S. II	, ,,	L 7	+	ک <sub>ت</sub> اے	·	21	1 to 1	7 <b>11</b> /-	<del>[:</del> ), ],	ナュナ		~ 17	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	J- 7						
Ź	数列	IJ { <i>C</i>	$l_n\}$	Ω+ЦХ	果	96	び	りに	٠,	₹0,	)悭	限征	まは	7C 7:	Z 1 '	つに	- 疋	よる	۰ (					

#### Proof: 数列の極限の一意性

数列  $\{a_n\}$  が  $\alpha$  と  $\beta$  の 2 つの極限値を持つと仮定する。

このとき、任意の正の数 $\varepsilon$ に対して、

$$n \ge N_1 \implies |a_n - \alpha| < \varepsilon$$
  
 $n \ge N_2 \implies |a_n - \beta| < \varepsilon$ 

が成り立つような自然数 N<sub>1</sub> と N<sub>2</sub> が存在する。

ここで、 $N = \max\{N_1, N_2\}$  とおくと、 $n \ge N$  のとき、 $N_1$  と  $N_2$  の大きい方が n 以下に収まることから、 $n \ge N_1$  と  $n \ge N_2$  がともに成り立つ。

よって、 $n \ge N$  のとき、 $|\alpha - \beta|$  を考えると、

$$\begin{aligned} |\alpha - \beta| &= |\alpha - \beta + \underbrace{a_n - a_n}| \\ &= |(\alpha - a_n) + (a_n - \beta)| \\ &\leq |\alpha - a_n| + |a_n - \beta| \end{aligned}$$
 三角不等式 
$$= |-(a_n - \alpha)| + |a_n - \beta|$$
 
$$= |a_n - \alpha| + |a_n - \beta|$$
 
$$= |a_n - \alpha| + |a_n - \beta|$$
 
$$< \varepsilon + \varepsilon$$
 
$$= 2\varepsilon$$
 
$$\therefore |\alpha - \beta| < 2\varepsilon$$

したがって、有限値εの不等式による一致の表現より、

$$\alpha = \beta$$


これで、数列  $\{a_n\}$  の極限値はただ1つに定まることが示された。


### 9.2.4 定数数列の極限

最も単純な数列の極限値を、 $\varepsilon - N$  論法で考えてみよう。


ここでは、同じ数だけを並べた数列(定数数列)の極限を考える。

定数数列の極限を考えておくことで、のちに数列の定数倍の極限へと発展させることができる。





定数 c を並べた数列では、n を大きくしたときの  $a_n$  の値も変わらず c なのだから、極限値も当然 c となりそうである。



このような当たり前に聞こえる事実も、 $\varepsilon-N$  論法では「当たり前」という直観を排除して議論できる。

#### Proof: 定数数列の極限

 $\varepsilon$  を任意の正の数とする。

 $a_n$  は n の値によらず c であるから、任意の n に対して次の式が成り立つ。

$$|a_n - c| = |c - c| = 0 < \varepsilon$$

$$|a_n - c| < \varepsilon$$


したがって、

$$n \ge N \quad \Rightarrow \quad |a_n - c| < \varepsilon$$

となるような自然数 N は存在する(というか N はなんでもよい)。 よって、 $\{a_n\}$  は収束し、その極限値は c である。


#### 9.2.5 数列の極限の線形性

数列の極限についても、線形性が成り立つ。



この線形性の式は、数列の和の極限と、数列の定数倍の極限を組み合わせたものになっている。 それぞれ証明することで、この線形性の式が成り立つことを確認しよう。

#### 数列の和の極限



 $\{a_n\}$  の極限値を  $\alpha$ 、 $\{b_n\}$  の極限値を  $\beta$  とすると、最終的に次のような関係を導くことで、この定理が証明される。

$$n \ge N \implies |(a_n + b_n) - (\alpha + \beta)| < \varepsilon$$

 $|(a_n+b_n)-(\alpha+\beta)|$  は、 $a_n+b_n$  と  $\alpha+\beta$  がどれだけ近いか、すなわち  $a_n+b_n$  と  $\alpha+\beta$  の誤差を表している。そして、この誤差を  $\varepsilon$  より小さくする必要がある。

そのためには、 $a_n$  と  $\alpha$  の誤差を  $\frac{\varepsilon}{2}$  より小さくし、 $b_n$  と  $\beta$  の誤差も  $\frac{\varepsilon}{2}$  より小さくできればよい。

#### Proof: 数列の和の極限

 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ 、  $\lim_{n\to\infty} b_n = \beta$  とおき、 $\varepsilon$  を任意の正の数とする。

このとき、 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$  より、次のような自然数  $N_1$  が存在する。

$$n \ge N_1 \implies |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$$

同様に、 $\lim_{n\to\infty} b_n = \beta$  より、次のような自然数  $N_2$  が存在する。

$$n \ge N_2 \implies |b_n - \beta| < \frac{\varepsilon}{2}$$

ここで、 $N = \max\{N_1, N_2\}$  とおくと、 $n \ge N$  のとき、 $n \ge N_1$  と  $n \ge N_2$  がともに成り立つ。

$$n \geq N \implies |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{then } |b_n - \beta| < \frac{\varepsilon}{2}$$

よって、 $n \ge N$  のとき、三角不等式より、

$$|(a_n + b_n) - (\alpha + \beta)| = |(a_n - \alpha) + (b_n - \beta)|$$

$$\leq |a_n - \alpha| + |b_n - \beta|$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$= \varepsilon$$

$$\therefore |(a_n+b_n)-(\alpha+\beta)|<\varepsilon$$

という不等式が成り立つことで、 $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=\alpha+\beta$  が示された。

数列  $\{a_n\}$  が  $\alpha$  に収束するということは、 $\varepsilon-N$  論法による数列の収束の定義より、

$$n \ge N \Longrightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$$

という関係が成り立つということである。

ここでの $\varepsilon$ は「任意の」正の数であるから、 $\varepsilon$ の部分にどんな正の数を当てはめても、この関係が成り立つことになる。

数列の和の極限の証明では、 $\varepsilon$  の部分に  $\frac{\varepsilon}{2}$  を当てはめた関係を利用している。

#### 数列の定数倍の極限

数列の定数倍	の極限			
数列 {a <sub>n</sub> } が収	双束するとき、	c を実数とすると、	数列 $\{ca_n\}$ も収束する。	
そして、その	極限値は次の	ようになる。		
		1. (	1.	
		$\lim_{n\to\infty}(ca_n)=$	$C \lim_{n\to\infty} a_n$	

 $\{a_n\}$  の極限値を  $\alpha$  とすれば、 $ca_n$  と  $c\alpha$  の誤差を  $\varepsilon$  より小さくする必要がある。 あとから誤差が最大 |c| 倍されても大丈夫なように、 $a_n$  と  $\alpha$  の誤差は  $\frac{\varepsilon}{|c|}$  より小さくできればよい。



c は正の数とは限らない。誤差は任意の正の数  $\varepsilon$  と比較するために正の数として評価したいので、絶対値をつけている。

|c| が分母にあるので、c=0 の場合は除外して考える必要がある。 c=0 の場合は、定数数列の極限として考えることで、0 に収束することがわかる。

#### Proof: 数列の定数倍の極限

c = 0と $c \neq 0$ の場合に分けて証明する。

(\* c = 0 の場合

c=0 のとき、右辺は、

$$c \lim_{n \to \infty} a_n = 0 \cdot \lim_{n \to \infty} a_n = 0$$

また、左辺は、定数数列の極限として考えて、

$$\lim_{n\to\infty}(ca_n)=\lim_{n\to\infty}0=0$$

したがって、c=0 の場合は、 $\lim_{n\to\infty}(ca_n)=c\lim_{n\to\infty}a_n=0$  が成り立つ。

#### (\* c ≠ 0 の場合

 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$  とおき、 $\varepsilon$  を任意の正の数とする。

このとき、 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$  より、次のような自然数 N が存在する。

$$n \ge N \implies |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{|c|}$$

よって、 $n \ge N$  のとき、

$$|ca_{n} - c\alpha| = |c(a_{n} - \alpha)|$$

$$= |c||a_{n} - \alpha|$$

$$< |c| \cdot \frac{\varepsilon}{|c|}$$


$$= \varepsilon$$

$$\therefore |ca_{n} - c\alpha| < \varepsilon$$

という不等式が成り立つことで、  $\lim_{n\to\infty} ca_n = c\alpha$  がいえる。

以上より、いずれの場合も、数列  $\{ca_n\}$  は  $c\alpha$  に収束することが示された。

## 9.2.6 数列の積の極限



 $\{a_n\}$  の極限値を  $\alpha$ 、 $\{b_n\}$  の極限値を  $\beta$  とすると、最終的に次のような関係を導くことで、この定理が証明される。

$$n \ge N \implies |a_n b_n - \alpha \beta| < \varepsilon$$

 $a_n b_n$  と  $\alpha \beta$  の誤差  $|a_n b_n - \alpha \beta|$  を、三角不等式で見積もっておこう。

$$|a_n b_n - \alpha \beta| = |a_n b_n - a_n \beta + a_n \beta - \alpha \beta|$$
$$= |a_n (b_n - \beta) + \beta (a_n - \alpha)|$$
$$\leq |a_n||b_n - \beta| + |\beta||a_n - \alpha|$$

ここで、 $\{a_n\}$ の極限値が $\alpha$ 、 $\{b_n\}$ の極限値が $\beta$ であることから、任意の正の数を $\varepsilon'$  として、 $|a_n-\alpha|<\varepsilon'$ 、 $|b_n-\beta|<\varepsilon'$  という関係を使うことができる。

ここまでで得られた不等式において、 $|a_n|$  の部分も  $|\alpha|$  に置き換えたいが、このときに  $a_n$  と  $\alpha$  の誤  $\hat{E}$   $\epsilon'$  を考慮する必要がある。

$$|a_n| - |\alpha| \le |a_n - \alpha| < \varepsilon'$$
  
 $|a_n| < |\alpha| + \varepsilon'$ 

これを使うことで、

$$|a_n b_n - \alpha \beta| \le |a_n| |b_n - \beta| + |\beta| |a_n - \alpha|$$

$$< (|\alpha| + \varepsilon') |b_n - \beta| + |\beta| |a_n - \alpha|$$

$$= (|\alpha| + \varepsilon') \varepsilon' + |\beta| \varepsilon'$$

$$< |\alpha| \varepsilon' + {\varepsilon'}^2 + |\beta| \varepsilon'$$

$$= (|\alpha| + |\beta| + \varepsilon') \varepsilon'$$

また、 $\varepsilon'$  は任意の正の数であるが、結局はどんどん小さな数に狭めていくものなので、最初から1 未満に設定して  $0 < \varepsilon' < 1$  としてもよい。

$$|a_n b_n - \alpha \beta| < (|\alpha| + |\beta| + \varepsilon')\varepsilon'$$
  
 $< (|\alpha| + |\beta| + 1)\varepsilon'$ 

以上の考察を、次のような証明として落とし込む。

#### Proof: 数列の積の極限

 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ 、 $\lim_{n\to\infty} b_n = \beta$  とおき、 $\varepsilon$  を任意の正の数とする。

極限を考えるので、 $0<\varepsilon<|\alpha|+|\beta|+1$ としてもよい。 そこで、

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{|\alpha| + |\beta| + 1}$$

とおくと、 $0 < \varepsilon' < 1$ である。

このとき、 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$  より、次のような自然数  $N_1$  が存在する。

$$n \ge N_1 \implies |a_n - \alpha| < \varepsilon'$$

同様に、 $\lim_{n\to\infty} b_n = \beta$  より、次のような自然数  $N_2$  が存在する。

$$n \ge N_2 \implies |b_n - \beta| < \varepsilon'$$

ここで、 $N = \max\{N_1, N_2\}$  とおくと、 $n \ge N$  のとき、 $n \ge N_1$  と  $n \ge N_2$  がともに成り立つ。

$$n \ge N \implies |a_n - \alpha| < \varepsilon' \quad \beta > 0 \quad |b_n - \beta| < \varepsilon'$$

よって、 $n \ge N$  のとき、三角不等式と $0 < \varepsilon' < 1$  より、

$$|a_n b_n - \alpha \beta| \le |a_n| |b_n - \beta| + |\beta| |a_n - \alpha|$$

$$< (|\alpha| + \varepsilon') \varepsilon' + |\beta| \varepsilon'$$

$$= (|\alpha| + |\beta| + \varepsilon') \varepsilon'$$


$$< (|\alpha| + |\beta| + 1) \varepsilon'$$

$$= \varepsilon$$

$$|a_n b_n - \alpha \beta| < \varepsilon$$

という不等式が成り立つことで、 $\lim_{n\to\infty}(a_nb_n)=lpha\beta$  が示された。  $\blacksquare$ 

#### 9.2.7 数列の商の極限



 $\{a_n\}$  の極限値を lpha とすると、最終的に次のような関係を導くことで、上の式は証明される。

$$n \ge N \implies \left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{\alpha} \right| < \varepsilon$$

ここでも、 $\frac{1}{a_n}$  と  $\frac{1}{\alpha}$  の誤差  $\left|\frac{1}{a_n} - \frac{1}{\alpha}\right|$  を、三角不等式で見積もっておく。

$$\left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{\alpha} \right| = \left| \frac{\alpha - a_n}{a_n \alpha} \right|$$
$$= \frac{|a_n - \alpha|}{|a_n \alpha|}$$

ここで、 $0 < \varepsilon' < \frac{|\alpha|}{2}$  とすると、

$$|a_n - \alpha| < \varepsilon' < \frac{|\alpha|}{2}$$
  
 $\therefore |a_n - \alpha| < \frac{|\alpha|}{2}$ 

また、三角不等式より、

$$||a_n| - |\alpha|| \le |a_n - \alpha| < \frac{|\alpha|}{2}$$

$$-\frac{|\alpha|}{2} < |a_n| - |\alpha| < \frac{|\alpha|}{2}$$

$$|\alpha| - \frac{|\alpha|}{2} < |a_n|$$

$$\frac{2|\alpha|}{2} - \frac{|\alpha|}{2} < |a_n|$$

$$\therefore \frac{|\alpha|}{2} < |a_n|$$

が成り立つことを利用して、

$$\left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{\alpha} \right| < \frac{|a_n - \alpha|}{|a_n \alpha|}$$

$$< \frac{|a_n - \alpha|}{\frac{|\alpha|}{2} \cdot |\alpha|}$$

$$= \frac{2}{|\alpha|^2} |a_n - \alpha|$$

このような不等式から、次のように証明を組み立てる。

#### Proof: 数列の逆数の極限

 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ 、  $\lim_{n\to\infty} b_n = \beta$  とおき、 $\varepsilon$  を任意の正の数とする。

 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$  より、次のような自然数  $N_1$  が存在する。

$$n \ge N_1 \implies |a_n - \alpha| < \frac{|\alpha|}{2}$$

このとき、 $n \ge N_1$  ならば、三角不等式より次のような不等式が成り立つ。

$$\frac{|\alpha|}{2} < |a_n|$$

よって、 $n \ge N_1$  とすると、 $a_n \ne 0$  である。 このとき、次のような不等式も得られる。

$$\left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{\alpha} \right| < \frac{|a_n - \alpha|}{|a_n \alpha|} < \frac{2}{|\alpha|^2} |a_n - \alpha|$$

一方、 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$  より、次のような自然数  $N_2$  も存在する。

$$n \ge N_2 \quad \Longrightarrow \quad |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{\frac{2}{|\alpha|^2}}$$

ここで、 $N=\max\{N_1,N_2\}$  とおくと、 $n\geq N$  のとき、 $n\geq N_1$  と  $n\geq N_2$  がともに成り立つ。

よって、n > N のとき、

$$\left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{\alpha} \right| < \frac{2}{|\alpha|^2} |a_n - \alpha|$$

$$< \frac{2}{|\alpha|^2} \cdot \frac{\varepsilon}{\frac{2}{|\alpha|^2}}$$


$$= \varepsilon$$

$$\therefore \left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{\alpha} \right| < \varepsilon$$

という不等式が成り立つことで、  $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=\frac{1}{\alpha}$  が示された。

今示した数列の逆数の極限と、数列の積の極限を組み合わせることで、数列の商の極限も求める ことができる。

$$\lim_{n \to \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{a_n} \cdot \lim_{n \to \infty} b_n$$



## 9.2.8 数列の極限の大小関係の保存

[ Topo 6: 定理 2.5]

# \$


## 9.2.9 はさみうちの原理


はさみうちの原理は、

ある数列が2つの数列に挟まれていて、その2つの数列の極限値が同じなら、挟まれた数列の極限値も同じになる。

という内容の定理である。

この定理により、直接極限を求めにくい数列でも、簡単な数列で挟むことで極限値を求めること が容易になる。





すべての自然数nに対して $a_n \le c_n \le b_n$ である必要はない。

たとえば、5 以上のn に対して $a_n \le c_n \le b_n$  が成り立つ場合( $n_0 = 5$  の場合)にも、はさみうちの定理は適用できる。

Proof: 数列の極限に関するはさみうちの定理

 $\varepsilon$  を任意の正の数とする。

このとき、 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$  より、次のような自然数  $N_1$  が存在する。

$$n \ge N_1 \implies |a_n - \alpha| < \varepsilon$$

同様に、 $\lim_{n \to \infty} b_n = \beta$  より、次のような自然数  $N_2$  が存在する。

$$n \ge N_2 \implies |b_n - \beta| < \varepsilon$$

ここで、 $N = \max\{N_1, N_2, n_0\}$  とおくと、 $n \ge N$  のとき、 $n \ge n_0$ 、 $n \ge N_1$ 、 $n \ge N_2$  がすべて成り立つ。


## 9.2.10 ε-N論法による数列の発散

数列がどんな実数にも収束しないとき、その数列は発散するという。


#### 正の無限大への発散

数列の項が先に進むにつれて限りなく大きくなる場合に、その数列は正の無限大に発散するという。

「ここから先の項はすべて K より大きくなる」といえる位置に、N という印をつけるようにしよう。




どれだけKを大きくしても、Nをずらしていけば、N以降はKを超える項だけになる。



このような状況が、正の無限大への発散である。

K をどんなに大きくしても、「N 番目以降の項は K よりも大きくなる」といえるような N を設定できるか?が肝心で、そのような N が存在するなら、数列は正の無限大に発散すると定義する。


<b>料別の正の無</b>	阻士への	発散									
*#### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			/1L + - <del>1</del> /								
数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ に	-9n (,	次の条	件を考	える。							




#### 負の無限大への発散

逆に、数列の項が先に進むにつれて限りなく小さくなる場合には、その数列は<mark>負の無限大に発散</mark> するという。


「ここから先の項はすべてKより小さくなる」といえる位置に、Nという印をつけるようにする。



どれだけ K を小さくしても、N をずらしていけば、N 以降は K より小さい項だけになる。



このような状況が、負の無限大への発散である。



## 9.2.11 追い出しの原理



[ Topo 7: 定理 2.18]

## 9.2.12 発散数列の和と積



[ Topo 8: 定理 2.18]

#### 9.2.13 数列の偶数番目と奇数番目の極限による判定

[ Topo 9: 命題 2.13]



#### 9.2.14 数列の極限と絶対値

[ Topo 10: 定理 2.15]



#### 9.2.15 逆数の数列の発散条件

[Topo 11: 定理 2.16] [Topo 12: 定理 2.17]



#### 9.2.16 等比数列の極限

[ Topo 13: 命題 3.1]



#### 9.2.17 項の比による収束判定

[ Topo 14: 定理 3.8]




#### 9.2.18 発散数列の増加速度の比較

[ Topo 15: 例題 3.9]



## 9.3 級数

Under construction...




#### 9.4.1 ε-δ 論法による関数の極限

 $\varepsilon$  がどんなに小さい正の数であっても、x と a の誤差を  $\delta$  以内に収めることで f(x) と b の誤差が  $\varepsilon$  以内に収まるとき、関数 f(x) は点 a で b に収束するという。

\* \* \*


まず、y = b の周りに、両側それぞれ  $\varepsilon$  だけ広げた区間を考える。(この区間を青い帯と呼ぶことにする。)

9.4. 関数の極限 165



x=a の周りには、両側それぞれ  $\delta$  だけ広げた区間を考える。(この区間をピンクの帯と呼ぶことにする。)


このとき、「このxであれば、f(x)が青い帯に収まる」というxを探して、そのxをピンクの帯で包むように $\delta$ を設定する。



 $\varepsilon$  は正の数ならなんでもよいとすれば、 $\varepsilon$  を小さな数に設定し、いくらでも青い帯を狭めることができる。

しかしこのとき、xをピンクの帯に収まるようにしなければならない。

ピンクの帯の中心はaなので、xをピンクの帯に収めようとすると、xはaに近づいていくことになる。




青い帯の幅 $\varepsilon$  がどんなに小さくても、ピンクの帯の幅 $\delta$  を小さくしていけば、x と f(x) をそれぞれ帯の中に収めることができる。


このように、x を a に近い範囲に閉じ込めれば、f(x) も b に近い範囲に閉じ込められるという状況を、点 a での関数の収束と定義する。

青い帯の幅 $\varepsilon$  がどんなに小さくても、「このx であれば、f(x) が青い帯に収まる」というx がピンクの帯からはみ出ないように $\delta$  を小さくしていけるなら、自動的にx も f(x) もそれぞれ帯の中に収まる。

つまり、 $\delta$  に課された制約が肝心で、「このx であれば、f(x) が青い帯に収まる」というx を包めるような $\delta$  の存在が、収束を保証することになる。



9.5. 関数の連続性 167





[ Topo 16: 定義 1.1]

9.4.2 関数の極限と数列の極限の関係



[ Topo 17: 定理 1.7]

9.4.3 関数の極限の性質



[ Topo 18: 定理 1.8]

[ Topo 19: 定理 1.9]

9.4.4 はさみうち法



[ Topo 20: 定理 1.10]

9.4.5 合成関数の極限



[ Topo 21: 定理 1.11]

9.4.6 右極限と左極限



[ Topo 22: 定義 1.15]

[ Topo 23: 定義 1.16]

[ Topo 24: 定理 1.19]

9.5 関数の連続性

Under construction...

# Chapter 10

# 実数の連続性


ε-δ論法によって微分積分の理論を再定義しても、その議論は実数の連続性に依存している。 この章では、「実数は連続である」、平たく言えば「数直線には穴がない」という表現を観察する。

## 10.1 区間の限界を表す

区間の最大値や最小値は、その区間の中で最大もしくは最小となる数を指す。

閉区間の場合は、区間の端点が最大値・最小値となるが、開区間では端点を含まないため、「区間の中で」最大(もしくは最小)といえる数は存在しないことになる。

しかし、「最大値(最小値)がない=区間は限りなく続く」というわけではない。 もしそうだとしたら、次の3つの開区間が区別できないことになる。




そこで、最大値・最小値とは別に、区間に限界があることを表す概念を導入する。

#### 10.1.1 上界と下界

区間内の数がとりうる値に「限界が有る」ことを、有界という概念で表す。

#### 上界、上に有界


ある区間に属するどの数も、ある数M以下であるとき、この区間は上に有界であるといい、このMを上界という。





#### 下界、下に有界

ある区間に属するどの数も、ある数 N 以上であるとき、この区間は下に有界であるといい、この N を下界という。







10.2. 数列の極限再訪 171

#### 有界

ある区間が上にも下にも有界であるとき、この区間は有界であるという。





- 10.1.2 上限と下限
- 10.1.3 上限定理



- 10.2 数列の極限再訪
- 10.2.1 アルキメデスの公理



[ Topo 26: 命題 3.2]

10.2.2 収束列の有界性



[ Topo 27: 定理 2.11]

10.2.3 単調数列



[ Topo 28: 定義 5.1]

10.2.4 有界な単調数列の収束性



[Topo 29: 定理 5.4]

## 10.3 区間縮小法

[ Topo 30: 定理 5.11]



## 10.4 収束する部分列

10.4.1 部分列

[ Topo 31: 定義 6.5]



## 10.4.2 収束する数列の部分列の極限

[ Topo 32: 定理 6.7]



## 10.4.3 ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理

[ Topo 33: 定理 6.8]



## 10.5 コーシー列と実数の完備性

10.5.1 コーシー列

[Topo 34: 定義 6.9]



#### 10.5.2 実数の完備性

[ Topo 35: 定理 6.11]



## 10.6 上限定理再訪

[ Topo 36: 定理 6.12]



## Zebra Notes

Type	Number
todo	36