

5.) a.)

$A \in \mathbb{Z}_n^{m \times m}$  is invertible  $\Leftrightarrow \gcd(n, \det(A)) = 1$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_n^{m \times m}$$

It holds  $A^{-1} = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mm} \end{pmatrix} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \dots & \tilde{a}_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ \tilde{a}_{m1} & \dots & \tilde{a}_{mm} \end{pmatrix}^T \text{ with}$$

$$\tilde{a}_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & & a_{i-1,m} \\ \hline a_{i+1,1} & & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & & a_{i+1,m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & & a_{m,j-1} & a_{m,j+1} & & a_{m,m} \end{vmatrix}$$

i/j row/col  
skipped

$$\Rightarrow b_{ij} = \frac{1}{\det(A)} \tilde{a}_{ji} \pmod{n}$$

$$\tilde{a}_{ji} \in \mathbb{Z}_n \quad b_{ij} \text{ exists} \Leftrightarrow \det(A)^{-1} \text{ exists} \\ \Leftrightarrow \gcd(n, \det(A)) = 1$$

last equivalence: see next homework  $\Leftrightarrow m=1$

b.)

$$M = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 9 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{2 \times 2}$$

$$\det(M) = 7 \cdot 2 - 1 \cdot 9 = 5 \Rightarrow \gcd(26, 5) = 1$$

with a.)  $M$  is invertible.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \text{if } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$k = \det(A)^{-1} \pmod{26} \Leftrightarrow 5k = 26 \cdot l + 1$$

$$26 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow 26 \cdot 4 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow 26 \cdot 4 + 1 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow k = \frac{26 \cdot 4 + 1}{5} = \frac{25 \cdot 4 + 5}{5} = 21$$

$$\Rightarrow M^{-1} = 21 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -9 & 7 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 76 & 5 \\ 19 & 17 \end{pmatrix} \pmod{26}}}$$

$$21 \cdot 17 = 21 \cdot 13 + 21 \cdot 4 = \dots$$

4.)

$$\underline{a.)} \quad \underline{c} = A \cdot \underline{m} \quad \underline{m}(m_1, m_2, m_3) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_2^{3 \times 3}$$

$$\Rightarrow \underline{c} = (c_1, c_2, c_3) = (m_1 + m_2 + m_3, m_1 + m_2, m_1 + m_3) \\ = e(\underline{m})$$

4. b.)

$$\underline{\text{ES. a.)}} \Rightarrow \gcd(m, \det(A)) \stackrel{!}{=} 1$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 1 + 1 + 1 = 1 \pmod{2}$$

$$\Rightarrow \gcd(2, 1) = 1 \stackrel{\text{ES. a.)}}{\Rightarrow} A \text{ is invertible}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_2 + R_3 \\ R_1 + R_2}]{R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 + R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d(c) = A^{-1} \cdot c$$

E6.) a.) # of possible keys

substitution cipher. Keys are given as permutations over symbol alphabet  $\Sigma$ .

$$|\Sigma| = m$$

$\Rightarrow n!$  permutations, i.e.,  $n!$  keys

b.) affine ciphers with 26 symbols in

$$\text{alphabet } c_i = a \cdot m_i + b \pmod{26}$$

$$m_i = a^{-1}(c_i - b) \pmod{26}$$

$\Rightarrow a^{-1}$  has to exist for decryption

before:  $a^{-1}$  exists, if  $\gcd(a, 26) = 1$

$$26 = 2 \cdot 13 \Rightarrow S = \{a \mid \gcd(a, 26) = 1\} \\ = \{a \mid 2 \nmid a \wedge 13 \nmid a\} \subset \mathbb{Z}_{26}$$

$$\Rightarrow |S| = |\mathbb{Z}_{26}^*| = \frac{26}{2} - 1 = \underline{12}$$

No restriction for  $b$

$$\Rightarrow 26 \cdot 12 = 312 \text{ possible keys}$$

c.) Permutation cipher with block length  $k$

$$\Rightarrow k! \text{ permutations. } \Rightarrow k! \text{ keys}$$

Ex.)

a.)  $e_{k_2}(e_{k_1}(m)) = e_{k_3}(m)$

subst.  $\pi_3 = \pi_1 \circ \pi_2$ , i.e.,  $x_i \rightarrow x_{\pi_2(\pi_1(i))} = x_{\pi_3(i)}$

Affine:  $c_i' = a_1 \cdot m_i + b_1 \pmod{n}$

$$c_i = a_2(a_1 \cdot m_i + b_1) + b_2 \pmod{n}$$

$$\Rightarrow c_i = a_1 \cdot a_2 \cdot m_i + a_2 b_1 + b_2 \pmod{26}$$

$$= a \cdot m_i + b \quad \text{with } a = a_1 \cdot a_2 \pmod{26}$$

$$b = a_2 b_1 + b_2 \pmod{26}$$

with  $\gcd(a_1, n) = \gcd(a_2, n) = 1$

$$\Rightarrow \gcd(a = a_1 \cdot a_2, n) = 1$$

Perm.

$$\pi_3 = \pi_1 \circ \pi_2, \quad m_i \rightarrow m_{\pi_2(\pi_1(i))} = m_{\pi_3(i)}$$