مسودة: قيد المراجعة السريرية

صيام رمضان بأمان مع السكري

خطّط مع طبيبك، وافحص السكر، واعرف متى تفطر

خمس نقاط تذكّرها

- راجع طبيبك **قبل رمضان بـ 6 إلى 8 أسابيع** لتخطّط لصيامك وأدويتك.
- فحص السكر **لا يفطّر**.
- أفطر فورًا إذا كان السكر **أقل من 70** أو **أعلى من 300** ملغ/دسل، أو إذا شعرت بتعب.
- لا تترك **السحور**، وأخّره قدر ما تستطيع.
- لا تغيّر أدويتك ولا توقفها من نفسك.

هل أستطيع الصيام؟

كثير من مرضى السكري يصومون بأمان، لكن بعضهم معرّض لخطر كبير. سيحسب طبيبك درجة الخطر لديك بناءً على ضبط السكر والأدوية وحالتك الصحية.

قد يكون الصيام **غير آمن** إذا كنتِ حاملًا ومصابة بالسكري، أو أصابك هبوط سكر شديد أو متكرر، أو ارتفاع شديد في السكر أو حماض كيتوني، أو لديك مشكلات خطيرة في الكلى أو القلب.

أباح الإسلام الفطر لمن يضرّه الصيام. ويمكنك مناقشة ذلك مع طبيبك ومع عالم دين تثق به.

كيف أفحص السكر وأنا صائم؟

- وخز الإصبع أو جهاز قياس السكر المستمر (الحسّاس) **لا يفطّر**.
- افحص أكثر من المعتاد، وسيخبرك طبيبك بعدد المرات.
- أوقات مناسبة للفحص: قبل السحور، وفي منتصف الصباح، والظهر، والعصر، وقبل الإفطار، وبعد الإفطار بساعتين.
- افحص **في أي وقت** تشعر فيه برجفة أو تعرّق أو تشوّش أو تعب.

قراءة السكر	ماذا أفعل؟
أقل من 70 ملغ/دسل (3.9 ملمول/لتر)	**أفطر الآن** وعالج الهبوط (انظر أدناه).
أعلى من 300 ملغ/دسل (16.7 ملمول/لتر)	**أفطر الآن** واشرب الماء وتواصل مع طبيبك.
بين هاتين القيمتين	أكمل صيامك إذا كنت تشعر بأنك بخير.

كيف أعالج هبوط السكر؟

- خذ **15 غرامًا من سكر سريع**: 3 ملاعق صغيرة من السكر مذابة في الماء، أو نصف كوب (120 مل) من العصير العادي.
- أعد الفحص بعد 15 دقيقة. وإذا بقي أقل من 70، فكرّر.
- عندما يرتفع فوق 70، تناول وجبة صغيرة.

ماذا آكل؟

السحور	الإفطار
أخّره قدر ما تستطيع، قبيل الفجر.	افطر على 1 إلى 3 تمرات مع الماء.
اختر أطعمة بطيئة الهضم: الخبز الأسمر، الشوفان، الفول أو البقوليات.	ثم طبق متوازن: نصفه خضار، وبعض البروتين، وقليل من الأرز أو الخبز.
أضف البروتين: البيض أو اللبنة أو الجبن أو الزبادي.	قلّل المقليات (السمبوسة) والحلويات (الكنافة والقطايف).
اشرب ماءً كافيًا.	تجنّب المشروبات السكرية مثل الفيمتو والعصائر المحلّاة.

- اشرب الماء على فترات بين الإفطار والسحور.
- صلاة التراويح تُعدّ نشاطًا بدنيًا. تجنّب الرياضة الشاقة وأنت صائم، خاصةً قبيل الإفطار.

ماذا عن أدويتي؟

- بعض الأدوية تحتاج إلى **تعديل الجرعة أو الوقت** في رمضان، خاصةً الإنسولين وحبوب مثل جليكلازايد وجليميبرايد.
- بعض الحبوب، مثل داباغليفلوزين وإمباغليفلوزين، تحتاج إلى عناية إضافية بشرب السوائل.
- إذا كان لديك السكري من النوع الأول، **فلا توقف الإنسولين أبدًا**.
- بعد رمضان، عُد إلى جرعاتك المعتادة كما نصحك طبيبك، وانتبه لحلويات العيد.

اطلب المساعدة فورًا: اتصل بـ 997 أو اذهب إلى الطوارئ إذا:

- بقي السكر أقل من 70 بعد علاجه مرتين، أو أصبحت مشوّشًا أو نعسانًا جدًا.
- تقيّأت ولم تستطع شرب السوائل.
- صاحب ارتفاعَ السكر ألمٌ في البطن أو قيء أو تنفّس سريع وعميق.
- ظهرت علامات الجفاف: جفاف شديد في الفم، أو دوخة عند الوقوف، أو قلة شديدة في البول.

خطتي في رمضان

درجة الخطر (من طبيبي): _____

أدوية السحور: _____

أدوية الإفطار: _____

رقم هاتف العيادة: _____

AA

إعداد وإشراف طبي: د. البراء البواب، طب الأسرة
المؤسس والمحرر الطبي، أدلة طب الأسرة

تقدّم هذه النشرة معلومات عامة، ولا تغني عن نصيحة طبيبك الذي يعرف حالتك. أحضرها معك في زيارتك القادمة واسأل عن أي شيء غير واضح. صيغت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وراجعها المحرر الطبي، وما زالت قيد المراجعة مع الزملاء.

آخر تحديث: أكتوبر 2026 · **المراجعة القادمة:** أكتوبر 2027، أو قبل ذلك إذا تغيّرت التوصيات

المصادر:

1. IDF-DAR Practical Guidelines: Diabetes and Ramadan. International Diabetes Federation & DAR International Alliance, 2021
2. Afandi B, et al. The 2026 update of the IDF-DAR risk calculator for fasting in people with diabetes. J Diabetes Endocr Pract 2026;9(1)
3. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes: 2026, Section 5 (Rec 5.32 and Table 5.3, pre-fasting risk assessment) and Section 6 (hypoglycemia). Diabetes Care 2026;49(Suppl 1)
4. Johns Hopkins Aramco Healthcare. Managing diabetes during fasting in Ramadan (patient guidance)