مرجع سريع · أدلة طب الأسرة

الإرشاد في طب الأسرة

خمس استراتيجيات مبنية على الدليل لاستشارة مدتها 5–10 دقائق

اختر الاستراتيجية

- **مستعد ومتقبّل** ← الخطوات الخمس أو FRAMES
- **المشكلة في الدافعية** ← حدّد المرحلة ثم المقابلة التحفيزية
- **مشكلة عاطفية / نفسية اجتماعية** ← BATHE مع الدواء عند الحاجة
- **لا استجابة بعد 2–3 تدخلات مختصرة** ← أحِل
- يمكن معالجة عدة سلوكيات معًا؛ واغتنم **اللحظة القابلة للتعلّم** (مرض حاد، حمل، تشخيص جديد).

مراحل التغيير

المرحلة	التعرّف	هدفك
ما قبل التفكير	لا خطة خلال 6 أشهر	ارفع الوعي؛ احترم الاختيار
التفكير	يفكر خلال 6 أشهر؛ متردد	استكشف الإيجابيات والسلبيات
الاستعداد	سيبدأ خلال 30 يومًا	خطة وتاريخ محددان
الفعل	غيّر منذ أقل من 6 أشهر	عزّز؛ حلّ المشكلات
المحافظة	غيّر منذ أكثر من 6 أشهر	امنع الانتكاس؛ طبّع الهفوات

التدخلات المطابقة للمرحلة ليست أفضل من غيرها (كوكرين): استخدم المرحلة لاختيار الحوار، وأعد السؤال في كل زيارة.

الخطوات الخمس (5A's)

اسأل	في كل زيارة وعن كل منتج
انصح	واضحة وشخصية ومرتبطة بمشكلة اليوم: «أنصحك...»
قيِّم	المعرفة والاستعداد للمحاولة الآن
ساعد	خطة، تاريخ، دواء، دعم، نشرة
رتِّب	حجز المتابعة: الخطوة الأكثر إهمالًا

غير مستعد؟ الـ 5R's: الصلة · المخاطر · المكاسب · العوائق · التكرار. **لديك 30 ثانية؟** اسأل · انصح · تصرّف.

FRAMES

التغذية الراجعة	الخطر الشخصي بأرقامه هو
المسؤولية	«القرار قرارك.»
النصيحة	واضحة محايدة مستندة إلى معيار
قائمة الخيارات	عدة خيارات يختار منها
التعاطف	دفء وعكس للمشاعر بلا أحكام
الكفاءة الذاتية	ابنِ على نجاحات سابقة

اطلب الإذن قبل مشاركة المعلومة. مناسب لتقليل الضرر وللتغذية الراجعة في الأمراض المزمنة.

أحِل: الإرشاد المختصر لا يكفي

- أفكار أو خطة أو نية انتحارية
- ذهان، هوس، اكتئاب شديد
- خطر انسحاب خطير (الكحول، البنزوديازيبينات، الأفيونات)
- عنف أسري أو قلق على حماية طفل
- اضطراب أكل مع عدم استقرار جسدي
- لا استجابة بعد 2–3 تدخلات مختصرة

المرشد الفعّال

التعاطف · الصدق · التقبّل غير المشروط · الإصغاء الفعّال · الوعي الذاتي · احترام الاستقلالية · السرّية · التواضع الثقافي · الأمل

المقابلة التحفيزية

- **الروح:** الشراكة · التقبّل · الرحمة · التمكين (الاستخراج)
- **المهام الأربع:** الإشراك ← التركيز ← الاستخراج ← التخطيط
- **OARS:** أسئلة مفتوحة · إشادة · عبارات عاكسة · تلخيص
- **حديث التغيير:** DARN (الرغبة، القدرة، الأسباب، الحاجة) ← CAT (الالتزام، التهيؤ، اتخاذ خطوات). واستجب بـ EARS.
- **استخرج–قدِّم–استخرج** لتقديم المعلومة؛ **عبارتان عاكستان لكل سؤال**؛ «و» لا «لكن».
- قاوم **نزعة الإصلاح**؛ اعكس حديث الاستمرار ولا تجادل أبدًا.

مسطرة الاستعداد (0–10)

- الأهمية 4 أو أقل ← اعمل على الأهمية (القيم، التباين).
- الأهمية 5 فأكثر والثقة 4 أو أقل ← ابنِ الكفاءة الذاتية.
- كلاهما 7 أو أكثر ← خطّط.
- اسأل **«لماذا 6 وليس 3؟»**: لا «لماذا ليس 10؟»

BATHE: نحو 5 دقائق

الخلفية	«ما الذي يجري في حياتك هذه الأيام؟»
المشاعر	«كيف تشعر تجاه ذلك؟»
المشكلات	«ما أكثر ما يزعجك في الأمر؟»
التعامل	«كيف تتدبّر الأمر؟»
التعاطف	«يبدو هذا صعبًا فعلًا.»

ليس سيرة مرضية كاملة. لا تفترض المشكلة. تكيّف مركّز على المشكلة لما يمكن حله، ومركّز على المشاعر لما لا يمكن التحكم فيه.

الإقلاع عن التبغ في 10 دقائق

- اسأل عن **السجائر والشيشة والسجائر الإلكترونية والمدواخ والتبغ غير المُدخَّن**.
- ترتفع مستويات كلوزابين وأولانزابين عند الإقلاع: خفّض الجرعة وراقب.
- يوم إقلاع خلال أسبوعين · متابعة خلال أسبوع · احجز عيادة الإقلاع في **صحتي**.

مؤشر شدة التدخين (HSI)

النقاط	أول سيجارة بعد الاستيقاظ	السجائر يوميًا
3	خلال 5 دقائق	31 أو أكثر
2	6–30 دقيقة	21–30
1	31–60 دقيقة	11–20
0	بعد 60 دقيقة	10 أو أقل

المجموع: 0–1 منخفض · 2–4 متوسط · 5–6 مرتفع. للسجائر فقط.

الدواء	النظام	تنبيه
فارينيكلين	يُبدأ قبل يوم الإقلاع بـ 1–2 أسبوع: 0.5 ملغ يوميًا (الأيام 1–3) · 0.5 ملغ مرتين (الأيام 4–7) · ثم 1 ملغ مرتين لمدة 12 أسبوعًا	غثيان، أحلام؛ تُخفض إن كانت التصفية أقل من 30
بدائل النيكوتين المركّبة	لصقة 21 ملغ/24 ساعة إن كان أكثر من 10 يوميًا أو أول سيجارة خلال 30 دقيقة (وإلا 14 ملغ) + علكة أو أقراص استحلاب أو جهاز استنشاق؛ 8–12 أسبوعًا	تهيّج الجلد؛ آمنة في أمراض القلب المستقرة
بوبروبيون	يُبدأ قبل بـ 1–2 أسبوع: 150 ملغ يوميًا × 3 أيام، ثم مرتين يوميًا لمدة 7–12 أسبوعًا	لا مع النوبات أو اضطراب الأكل أو مثبطات MAO
سيتيسين	توصي به منظمة الصحة العالمية 2024	تحقّق من توفره محليًا

الدليل بالأرقام

- المقابلة التحفيزية في الرعاية الأولية: **SORT A** (الوزن، الضغط، الكحول)؛ فائدة إضافية 10–15%. وفي التدخين، كوكرين 2019: يقين منخفض ولا فائدة واضحة وحدها.
- نصيحة الطبيب: إقلاع 8.0% مقابل 4.8%. النصيحة + الدواء + الدعم: 15.2% مقابل 8.6% (USPSTF 2021، الدرجة A).
- الخطوات الخمس وFRAMES وBATHE والمراحل: **SORT B**.
- البالغون المستخدمون للتبغ في المملكة: 19.8% (GATS 2019): الرجال 30.0%، النساء 4.2%.

USPSTF 2021 · Searight، Am Fam Physician 2018 · إرشادات منظمة الصحة العالمية للإقلاع 2024 · كوكرين 2010، 2014، 2019 · ميلر ورولنيك 2023 · ستيوارت وليبرمان · GATS 2019 · وزارة الصحة