مرجع سريع · أدلة طب الأسرة

# الإرشاد في طب الأسرة

خمس استراتيجيات مبنية على الدليل لاستشارة مدتها 5–10 دقائق

## اختر الاستراتيجية

- **مستعد ومتقبّل** ← الخطوات الخمس أو FRAMES
- **المشكلة في الدافعية** ← حدّد المرحلة ثم المقابلة التحفيزية
- **مشكلة عاطفية / نفسية اجتماعية** ← BATHE مع الدواء عند الحاجة
- **لا استجابة بعد 2–3 تدخلات مختصرة** ← أحِل
- يمكن معالجة عدة سلوكيات معًا؛ واغتنم **اللحظة القابلة للتعلّم** (مرض حاد، حمل، تشخيص جديد).

## مراحل التغيير

| المرحلة | التعرّف | هدفك |
|---|---|---|
| ما قبل التفكير | لا خطة خلال 6 أشهر | ارفع الوعي؛ احترم الاختيار |
| التفكير | يفكر خلال 6 أشهر؛ متردد | استكشف الإيجابيات والسلبيات |
| الاستعداد | سيبدأ خلال 30 يومًا | خطة وتاريخ محددان |
| الفعل | غيّر منذ أقل من 6 أشهر | عزّز؛ حلّ المشكلات |
| المحافظة | غيّر منذ أكثر من 6 أشهر | امنع الانتكاس؛ طبّع الهفوات |

التدخلات المطابقة للمرحلة ليست أفضل من غيرها (كوكرين) — استخدم المرحلة لاختيار الحوار، وأعد السؤال في كل زيارة.

## الخطوات الخمس (5A's)

| | |
|---|---|
| **اسأل** | في كل زيارة وعن كل منتج |
| **انصح** | واضحة وشخصية ومرتبطة بمشكلة اليوم — «أنصحك...» |
| **قيِّم** | المعرفة والاستعداد للمحاولة الآن |
| **ساعد** | خطة، تاريخ، دواء، دعم، نشرة |
| **رتِّب** | حجز المتابعة — الخطوة الأكثر إهمالًا |

**غير مستعد؟** الـ 5R's: الصلة · المخاطر · المكاسب · العوائق · التكرار. **لديك 30 ثانية؟** اسأل · انصح · تصرّف.

## FRAMES

| | |
|---|---|
| **التغذية الراجعة** | الخطر الشخصي بأرقامه هو |
| **المسؤولية** | «القرار قرارك.» |
| **النصيحة** | واضحة محايدة مستندة إلى معيار |
| **قائمة الخيارات** | عدة خيارات يختار منها |
| **التعاطف** | دفء وعكس للمشاعر بلا أحكام |
| **الكفاءة الذاتية** | ابنِ على نجاحات سابقة |

اطلب الإذن قبل مشاركة المعلومة. مناسب لتقليل الضرر وللتغذية الراجعة في الأمراض المزمنة.

## أحِل — الإرشاد المختصر لا يكفي

- أفكار أو خطة أو نية انتحارية
- ذهان، هوس، اكتئاب شديد
- خطر انسحاب خطير (الكحول، البنزوديازيبينات، الأفيونات)
- عنف أسري أو قلق على حماية طفل
- اضطراب أكل مع عدم استقرار جسدي
- لا استجابة بعد 2–3 تدخلات مختصرة

## المرشد الفعّال

التعاطف · الصدق · التقبّل غير المشروط · الإصغاء الفعّال · الوعي الذاتي · احترام الاستقلالية · السرّية · التواضع الثقافي · الأمل

## المقابلة التحفيزية

- **الروح:** الشراكة · التقبّل · الرحمة · التمكين (الاستخراج)
- **المهام الأربع:** الإشراك ← التركيز ← الاستخراج ← التخطيط
- **OARS:** أسئلة مفتوحة · إشادة · عبارات عاكسة · تلخيص
- **حديث التغيير:** DARN (الرغبة، القدرة، الأسباب، الحاجة) ← CAT (الالتزام، التهيؤ، اتخاذ خطوات). واستجب بـ EARS.
- **استخرج–قدِّم–استخرج** لتقديم المعلومة؛ **عبارتان عاكستان لكل سؤال**؛ «و» لا «لكن».
- قاوم **نزعة الإصلاح**؛ اعكس حديث الاستمرار ولا تجادل أبدًا.

## مسطرة الاستعداد (0–10)

- الأهمية 4 أو أقل ← اعمل على الأهمية (القيم، التباين).
- الأهمية 5 فأكثر والثقة 4 أو أقل ← ابنِ الكفاءة الذاتية.
- كلاهما 7 أو أكثر ← خطّط.
- اسأل **«لماذا 6 وليس 3؟»** — لا «لماذا ليس 10؟»

## BATHE — نحو 5 دقائق

| | |
|---|---|
| **الخلفية** | «ما الذي يجري في حياتك هذه الأيام؟» |
| **المشاعر** | «كيف تشعر تجاه ذلك؟» |
| **المشكلات** | «ما أكثر ما يزعجك في الأمر؟» |
| **التعامل** | «كيف تتدبّر الأمر؟» |
| **التعاطف** | «يبدو هذا صعبًا فعلًا.» |

ليس سيرة مرضية كاملة. لا تفترض المشكلة. تكيّف مركّز على المشكلة لما يمكن حله، ومركّز على المشاعر لما لا يمكن التحكم فيه.

## الإقلاع عن التبغ في 10 دقائق

- اسأل عن **السجائر والشيشة والسجائر الإلكترونية والمدواخ والتبغ غير المُدخَّن**.
- ترتفع مستويات كلوزابين وأولانزابين عند الإقلاع — خفّض الجرعة وراقب.
- يوم إقلاع خلال أسبوعين · متابعة خلال أسبوع · احجز عيادة الإقلاع في **صحتي**.

**مؤشر شدة التدخين (HSI)**

| النقاط | أول سيجارة بعد الاستيقاظ | السجائر يوميًا |
|---|---|---|
| 3 | خلال 5 دقائق | 31 أو أكثر |
| 2 | 6–30 دقيقة | 21–30 |
| 1 | 31–60 دقيقة | 11–20 |
| 0 | بعد 60 دقيقة | 10 أو أقل |

المجموع: 0–1 منخفض · 2–4 متوسط · 5–6 مرتفع. للسجائر فقط.

| الدواء | النظام | تنبيه |
|---|---|---|
| فارينيكلين | يُبدأ قبل يوم الإقلاع بـ 1–2 أسبوع: 0.5 ملغ يوميًا (الأيام 1–3) · 0.5 ملغ مرتين (الأيام 4–7) · ثم 1 ملغ مرتين لمدة 12 أسبوعًا | غثيان، أحلام؛ تُخفض إن كانت التصفية أقل من 30 |
| بدائل النيكوتين المركّبة | لصقة 21 ملغ/24 ساعة إن كان أكثر من 10 يوميًا أو أول سيجارة خلال 30 دقيقة (وإلا 14 ملغ) + علكة أو أقراص استحلاب أو جهاز استنشاق؛ 8–12 أسبوعًا | تهيّج الجلد؛ آمنة في أمراض القلب المستقرة |
| بوبروبيون | يُبدأ قبل بـ 1–2 أسبوع: 150 ملغ يوميًا × 3 أيام، ثم مرتين يوميًا لمدة 7–12 أسبوعًا | لا مع النوبات أو اضطراب الأكل أو مثبطات MAO |
| سيتيسين | توصي به منظمة الصحة العالمية 2024 | تحقّق من توفره محليًا |

## الدليل بالأرقام

- المقابلة التحفيزية في الرعاية الأولية: **SORT A** (الوزن، الضغط، الكحول)؛ فائدة إضافية 10–15%. وفي التدخين، كوكرين 2019: يقين منخفض ولا فائدة واضحة وحدها.
- نصيحة الطبيب: إقلاع 8.0% مقابل 4.8%. النصيحة + الدواء + الدعم: 15.2% مقابل 8.6% (USPSTF 2021، الدرجة A).
- الخطوات الخمس وFRAMES وBATHE والمراحل: **SORT B**.
- البالغون المستخدمون للتبغ في المملكة: 19.8% (GATS 2019) — الرجال 30.0%، النساء 4.2%.

USPSTF 2021 · Searight، Am Fam Physician 2018 · إرشادات منظمة الصحة العالمية للإقلاع 2024 · كوكرين 2010، 2014، 2019 · ميلر ورولنيك 2023 · ستيوارت وليبرمان · GATS 2019 · وزارة الصحة