مسودة — قيد المراجعة السريرية

الحمّى والطفح الجلدي عند الأطفال

كيف تعتني بطفلك في البيت، وتحمي الآخرين، وتعرف متى تطلب المساعدة

خمس نقاط تذكّرها

- معظم حالات الطفح مع الحمّى سببها فيروسات، وتتحسن من تلقاء نفسها.
- قم **باختبار الكأس**. إذا لم تختفِ البقع تحت الكأس، **فاذهب إلى الطوارئ فورًا**.
- للحمّى استخدم **الباراسيتامول**. **لا تعطِ الأسبرين للأطفال أبدًا**، ولا تعطِ الإيبوبروفين في الجديري.
- أبقِ طفلك في البيت و**بعيدًا عن الحوامل والمواليد** حتى يقول الطبيب إن ذلك آمن.
- تأكد أن طفلك أخذ **كل تطعيماته**، ومنها جرعتان من لقاح MMR (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية).

اختبار الكأس

اضغط جانب كأس زجاجي شفاف بقوة على البقع. إذا بقيت البقع ظاهرة من خلال الكأس، فقد تكون علامة على عدوى خطيرة تسمى المكورات السحائية (التهاب السحايا). اذهب إلى الطوارئ أو اتصل بـ 997 فورًا. وعلى البشرة الداكنة افحص باطن الكفين والقدمين وداخل الجفنين.

أشهر أنواع الطفح عند الأطفال

المرض	ما قد تلاحظه	الغياب عن الحضانة أو المدرسة
الحصبة	حمّى عالية، وسعال، وسيلان الأنف، واحمرار العينين، ثم طفح بقعي يبدأ من الوجه وينزل	4 أيام من بداية الطفح
الجديري المائي	بقع تسبب الحكة تتحول إلى فقاعات ثم قشور	حتى تتقشّر كل البقع (نحو 5 أيام)
الحمّى القرمزية	التهاب الحلق، وطفح أحمر خشن كورق الصنفرة، ولسان أحمر	24 ساعة بعد بدء المضاد الحيوي
القوباء	قروح عليها قشور صفراء بنية، غالبًا حول الأنف والفم	حتى تتقشّر، أو يومين بعد بدء المضاد الحيوي
الخد المصفوع (المرض الخامس)	خدّان أحمران زاهيان، ثم طفح شبكي على الذراعين والساقين	لا داعي بعد ظهور الطفح
الوردية	حمّى عالية 3–5 أيام، ثم طفح وردي مع زوال الحمّى	لا داعي بعد التعافي
مرض اليد والقدم والفم	قرح في الفم وفقاعات صغيرة على اليدين والقدمين	لا داعي إن كان بحال جيدة

رعاية طفلك في البيت

- أعطِه **رشفات صغيرة كثيرًا** — ماء أو حليب أو حليب الأم. والمشروبات الباردة تريح الفم المتقرح.
- استخدم **الباراسيتامول** إذا كان طفلك متضايقًا، واتبع الجرعة المكتوبة على العلبة حسب عمره أو وزنه.
- ألبس طفلك ملابس خفيفة. وللبقع المسببة للحكة استخدم غسول الكالامين، وأبقِ الأظافر قصيرة.
- اغسل اليدين كثيرًا واجعل لطفلك منشفة خاصة. وأكمل المضاد الحيوي كاملًا إذا وصفه الطبيب.

احمِ الآخرين

- على **الحامل** التي كانت قريبة من طفلك الاتصال بطبيبها اليوم؛ فبعض أنواع الطفح قد تضر الجنين.
- أبعِد طفلك عن **المواليد** وعن كل من لديه **مناعة ضعيفة** (مثل من يتلقى علاج السرطان أو الكورتيزون).
- **اتصل بالعيادة قبل الحضور** ليحمي العاملون المرضى الآخرين في غرفة الانتظار.

اطلب المساعدة فورًا: اتصل بـ 997 أو اذهب إلى الطوارئ إذا كان طفلك:

- لديه بقع **لا تختفي** باختبار الكأس.
- نعسانًا جدًا، أو يصعب إيقاظه، أو مشوّشًا، أو مرتخي الجسم.
- أصابته نوبة تشنج، أو تيبّس في الرقبة، أو يتنفس بسرعة أو بصعوبة.
- يداه وقدماه باردتان مع حمّى عالية، أو لا يتبول.
- **عمره أقل من 3 أشهر** وحرارته 38 °م أو أكثر.

راجع طبيبك اليوم إذا:

- استمرت الحمّى **5 أيام أو أكثر**، خاصة مع احمرار العينين أو الشفتين أو تورّم اليدين والقدمين.
- لم يشرب طفلك ما يكفي، أو صارت إحدى البقع شديدة الاحمرار أو متورمة أو مؤلمة.
- كان طفلك مصابًا **بفقر الدم المنجلي** أو ضعف المناعة وأصبح شاحبًا أو متعبًا.
- تسكن في منطقة فيها **حمّى الضنك** أو زرتها، ولدى طفلك حمّى مع آلام في الجسم — ولا تعطِه الإيبوبروفين.

خطتي

ما يرى الطبيب أن طفلي مصاب به: _____

الدواء والجرعة: _____

موعد العودة إلى المدرسة: _____

إعداد وإشراف طبي: د. البراء البواب، طب الأسرة
المؤسس والمحرر الطبي، أدلة طب الأسرة

تقدّم هذه النشرة معلومات عامة، ولا تغني عن نصيحة طبيبك الذي يعرف حالتك. أحضرها معك في زيارتك القادمة واسأل عن أي شيء غير واضح. صيغت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وراجعها المحرر الطبي، وما زالت قيد المراجعة مع الزملاء.

آخر تحديث: نوفمبر 2026 · **المراجعة القادمة:** نوفمبر 2027، أو قبل ذلك إذا تغيّرت التوصيات

المصادر:

1. CDC. Isolation precautions guideline, Appendix A: type and duration of precautions (2007, updated 2023)
2. UK Health Security Agency. Health protection in children and young people's settings — exclusion table (updated September 2026)
3. NICE. Fever in under 5s (NG143); Meningitis and meningococcal disease (NG240, 2024); Impetigo (NG153)
4. American Academy of Pediatrics. Red Book 2024–2027
5. Ministry of Health, Saudi Arabia. National immunization schedule (Sehhaty)