مسودة — قيد المراجعة السريرية

خافض الحرارة والمسكّن لطفلك

الجرعة الصحيحة حسب وزن طفلك، ومتى تطلب المساعدة

5 أمور تذكّرها

- الحرارة تساعد الجسم على مقاومة العدوى. الدواء هدفه **راحة طفلك**، لا خفض الرقم.
- أعطِ الجرعة حسب **وزن** طفلك، باستخدام **المحقنة** المرفقة مع الدواء، وليس ملعقة المطبخ.
- الباراسيتامول: كل 4–6 ساعات، **4 جرعات كحدّ أقصى** في 24 ساعة. الإيبوبروفين: كل 6–8 ساعات، **3 جرعات كحدّ أقصى** في 24 ساعة.
- **تأكّد من التركيز** المكتوب على العبوة، فالشراب والقطرة لهما تركيزات مختلفة.
- إذا كان عمر طفلك **أقل من 3 أشهر** وحرارته 38 درجة أو أكثر، فاعرضه على الطبيب **فورًا**.

أيّ دواء أستخدم؟

- **الباراسيتامول** (أدول، بنادول، فيفادول): منذ الولادة، واستشر الطبيب أولًا للرضيع دون 3 أشهر.
- **الإيبوبروفين** (بروفين، نوروفين): من عمر 3 أشهر ووزن 5 كغ، ولا يُعطى مع الجفاف أو أمراض الكلى أو جدري الماء.
- استخدم دواءً **واحدًا**، ولا تنتقل إلى الآخر إلا إذا بقي طفلك متضايقًا قبل موعد الجرعة التالية. ولا تعطِ الدواءين معًا.
- قد تكون الأسماء التجارية المختلفة **للدواء نفسه**، فلا تعطِ منتجَين فيهما باراسيتامول.

كم أعطي؟

وزن الطفل	قطرة باراسيتامول 100 ملغ/مل	شراب باراسيتامول 120 ملغ/5 مل	شراب باراسيتامول 250 ملغ/5 مل	شراب إيبوبروفين 100 ملغ/5 مل
6 كغ	0.9 مل	3.5 مل	1.5 مل	3 مل
8 كغ	1.2 مل	5 مل	2 مل	4 مل
10 كغ	1.5 مل	6 مل	3 مل	5 مل
12 كغ	1.8 مل	7.5 مل	3.5 مل	6 مل
15 كغ	—	9 مل	4.5 مل	7.5 مل
20 كغ	—	12.5 مل	6 مل	10 مل
25 كغ	—	15.5 مل	7.5 مل	12.5 مل
30 كغ	—	18.5 مل	9 مل	15 مل

اختر الوزن الأقرب إلى وزن طفلك **دون أن تتجاوزه**. وإذا زاد الوزن على 30 كغ، فاسأل الطبيب أو الصيدلي.

معلومات مفيدة

- تكفي الملابس الخفيفة وغرفة معتدلة، دون بطانيات ثقيلة.
- لا تمسح جسمه بالماء البارد أو الكحول، فهذا يسبّب الرجفة ولا يفيد.
- أكثِر من السوائل، واستمري في الرضاعة الطبيعية.

اطلب المساعدة فورًا: اتصل بـ 997 أو اذهب إلى الطوارئ إذا كان طفلك:

- عمره أقل من 3 أشهر وحرارته 38 درجة أو أكثر.
- نعسانًا جدًا، أو مرتخيًا، أو يصعب إيقاظه.
- يتنفس بسرعة أو بصعوبة، أو يئنّ مع التنفس.
- لديه طفح جلدي لا يختفي عند الضغط عليه بكأس زجاجية.
- أصيب بتشنّج، أو تيبّس في الرقبة، أو أخذ جرعة زائدة من الدواء بالخطأ.

راجع الطبيب قريبًا (أو اتصل بـ 937 للاستشارة) إذا:

- استمرت الحرارة أكثر من 5 أيام.
- قلّ شرب طفلك أو تبوّله كثيرًا.
- كنت قلقًا، أو بدا أن حالة طفلك تسوء.

خطة طفلي

الوزن (كغ) وتاريخ الوزن: _____

الدواء وتركيزه · الجرعة (مل) · كل كم ساعة · أقصى عدد في 24 ساعة: _____

الجرعات المعطاة

#	اليوم والوقت	الدواء	الجرعة (مل)
1			
2			
3			

إعداد وإشراف طبي: د. البراء البواب، طب الأسرة
المؤسس والمحرر الطبي، أدلة طب الأسرة

تقدّم هذه النشرة معلومات عامة، ولا تغني عن نصيحة طبيبك الذي يعرف حالتك. أحضرها معك في زيارتك القادمة واسأل عن أي شيء غير واضح. صيغت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وراجعها المحرر الطبي، وما زالت قيد المراجعة مع الزملاء.

آخر تحديث: نوفمبر 2026 · **المراجعة القادمة:** نوفمبر 2027، أو قبل ذلك إذا تغيّرت التوصيات

المصادر:

1. National Institute for Health and Care Excellence. Fever in under 5s: assessment and initial management (NG143), 2019, updated 2021
2. Sullivan JE, Farrar HC; AAP Section on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Fever and antipyretic use in children. Pediatrics 2011;127:580–7
3. Product information: paracetamol oral suspension 120 mg/5 mL and 250 mg/5 mL, paracetamol drops 100 mg/mL, ibuprofen oral suspension 100 mg/5 mL
4. British National Formulary for Children (BNFc): paracetamol and ibuprofen