مسودة — قيد المراجعة السريرية

استخدام البخاخ مع الحجرة (السبيسر) أو جهاز البخار في المنزل

أوصل الدواء إلى الرئتين، واعرف متى تطلب المساعدة

5 أمور تذكّرها

- البخاخ مع **الحجرة (السبيسر)** يعمل مثل جهاز البخار في معظم النوبات، وهو أسرع.
- **رُجّ** البخاخ قبل **كل** بخّة، وضع **بخّة واحدة في كل مرة**.
- استخدم **القناع** حتى عمر 4–5 سنوات تقريبًا، ثم **القطعة الفموية**.
- في جهاز البخار، استخدم فقط الأدوية والكميات التي كتبها الطبيب، و**المحلول الملحي من الصيدلية** فقط.
- إذا احتاج طفلك دواء الإسعاف **أكثر من مرة كل 4 ساعات**، فراجع الطبيب اليوم.

كيف أستخدم الحجرة (السبيسر)؟

1. انزع الغطاء و**رُجّ** البخاخ جيدًا.
2. أدخل البخاخ في الطرف الخلفي للحجرة.
3. ضع القناع على الأنف والفم بإحكام، أو ضع القطعة الفموية بين الشفتين.
4. اضغط البخاخ **مرة واحدة**.
5. دع طفلك يأخذ **5–6 أنفاس هادئة** شهيقًا وزفيرًا (أو نفسًا عميقًا واحدًا ويحبسه 10 ثوانٍ إن كان أكبر سنًا).
6. انتظر 30–60 ثانية، ثم رُجّ البخاخ مرة أخرى، وكرّر لكل بخّة وصفها الطبيب.

كيف أستخدم جهاز البخار؟

1. اغسل يديك، وأجلس طفلك معتدلًا.
2. افتح عبوة الدواء البلاستيكية الصغيرة بالتدوير، واعصر محتواها كله في الكأس.
3. إذا طلب منك الطبيب، فأضف المحلول الملحي حتى الكمية المكتوبة في خطتك.
4. ركّب القناع أو القطعة الفموية، ثم شغّل الجهاز.
5. يتنفس طفلك بشكل طبيعي حتى يتوقف الرذاذ ويبدأ الجهاز بالتقطّع، نحو **5–10 دقائق**.
6. بعد عبوة الكورتيزون (بوديسونايد)، امسح وجه طفلك واشطف فمه بالماء.

كيف أحافظ على نظافتها؟

- **الحجرة:** مرة كل أسبوع، اغسلها بماء دافئ وصابون، ولا تشطفها، واتركها تجفّ في الهواء. مسحها بالمنشفة يجعل الدواء يلتصق بجدرانها.
- **كأس جهاز البخار والقناع:** بعد كل استخدام، اشطفهما بماء دافئ، وانفضهما، واتركهما يجفّان في الهواء. واغسلهما بالصابون مرة يوميًا.
- لكل طفل حجرته وقناعه وكأس جهازه الخاص.

مثيرات شائعة في البيوت السعودية

- **البخور والعود ودخان السجائر والشيشة.** أبعدها عن طفلك، وفي السيارة أيضًا.
- **العواصف الترابية:** أغلق النوافذ وأبقِ طفلك داخل المنزل.
- الغبار والصراصير والحيوانات الأليفة في غرفة النوم، والعطور القوية وبخاخات التنظيف.

اطلب المساعدة فورًا: اتصل بـ 997 أو اذهب إلى الطوارئ إذا كان طفلك:

- يلهث لدرجة أنه لا يستطيع الكلام أو الرضاعة أو اللعب.
- شفتاه زرقاوان أو رماديتان.
- الجلد بين الأضلاع أو تحتها ينسحب إلى الداخل بقوة.
- نعسانًا جدًا أو مشوّش الذهن.
- لم يتحسّن بعد دواء الإسعاف، أو احتاجه مرة أخرى خلال 1–2 ساعة.

أثناء انتظار المساعدة، استمر في إعطاء دواء الإسعاف كما في خطة الربو المكتوبة لطفلك.

خطة طفلي

دواء الإسعاف، وعدد البخّات أو نوع العبوة: _____

الدواء الوقائي، وعدد مراته: _____

قناع أو قطعة فموية · كمية المحلول الملحي (مل): _____

إعداد وإشراف طبي: د. البراء البواب، طب الأسرة
المؤسس والمحرر الطبي، أدلة طب الأسرة

تقدّم هذه النشرة معلومات عامة، ولا تغني عن نصيحة طبيبك الذي يعرف حالتك. أحضرها معك في زيارتك القادمة واسأل عن أي شيء غير واضح. صيغت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وراجعها المحرر الطبي، وما زالت قيد المراجعة مع الزملاء.

آخر تحديث: نوفمبر 2026 · **المراجعة القادمة:** نوفمبر 2027، أو قبل ذلك إذا تغيّرت التوصيات

المصادر:

1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2026 update
2. Al-Moamary MS, et al. The Saudi Initiative for Asthma (SINA) — 2021 update. Ann Thorac Med 2021;16:4–56
3. Cates CJ, et al. Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma. Cochrane Database Syst Rev 2013
4. Product information: salbutamol, ipratropium and budesonide nebules; spacer and nebulizer manufacturer instructions