مسودة: قيد المراجعة السريرية

# نقص الحديد وفقر الدم

كيف تأخذ حبوب الحديد لتستفيد منها، ومتى تطلب المساعدة

### خمس نقاط تذكّرها

- تعمل حبوب الحديد أفضل على **معدة فارغة** مع الماء أو عصير البرتقال.
- اترك **الشاي والقهوة والحليب ومضادات الحموضة** قبل الحديد أو بعده بساعتين على الأقل.
- لون البراز الأسود أو الأخضر الداكن **طبيعي** مع الحديد.
- استمر في الحديد نحو **3 أشهر بعد** أن يعود تحليل الدم طبيعيًا.
- احفظ حبوب الحديد **بعيدًا عن الأطفال**؛ فالجرعة الزائدة خطيرة.

## ما فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؟

يحتاج الجسم إلى الحديد ليصنع الهيموغلوبين، وهو الجزء الذي يحمل الأكسجين في الدم. عندما ينقص الحديد يقلّ الهيموغلوبين، وهذا ما يسمّى فقر الدم (الأنيميا).

قد تشعر بالتعب أو ضيق النفس أو الدوخة أو البرد. وقد يعاني بعض الناس من الصداع، أو تساقط الشعر، أو تكسّر الأظافر، أو الرغبة في مضغ الثلج. وبعضهم لا يشعر بشيء.

## لماذا يحدث؟

- دورة شهرية غزيرة أو طويلة.
- الحمل والرضاعة.
- قلة الحديد في الطعام.
- نزف بطيء من المعدة أو الأمعاء.
- ضعف امتصاص الحديد، مثل مرض حساسية القمح (السيلياك).

سيبحث طبيبك عن السبب، ولن يكتفي بعلاج الرقم المنخفض.

### قبل أن تبدأ الحديد

- **حمل صفة الثلاسيميا** شائع في المملكة، وقد يشبه نقص الحديد في تحليل الدم.
- لا تأخذ الحديد إلا إذا أظهر تحليل الدم (مخزون الحديد «الفيريتين») أنه منخفض.
- إذا أجريت فحص ما قبل الزواج، فأخبر طبيبك بنتيجته.

## كيف آخذ حبوب الحديد؟

- خذها كما وصفها طبيبك: **مرة يوميًا أو يومًا بعد يوم**. أخذها يومًا بعد يوم يناسب كثيرًا من الناس، وغالبًا ما يكون أخفّ على المعدة.
- خذها **قبل الأكل بساعة** مع الماء أو عصير البرتقال، ففيتامين سي يساعد الجسم على امتصاص الحديد.
- إذا سبّبت لك اضطرابًا في المعدة، فخذها مع وجبة خفيفة. أخذها مع الطعام أفضل من التوقف عنها.
- اترك **ساعتين** بين الحديد وبين الشاي، والقهوة (ومنها القهوة العربية)، والحليب، وحبوب الكالسيوم، ومضادات الحموضة.
- إذا أصابك الإمساك، فاشرب ماءً أكثر وتناول أليافًا أكثر. وأخبر طبيبك إذا استمر، فقد يناسبك نوع آخر من الحديد.

## كم مدة العلاج بالحديد؟

- يعيد طبيبك تحليل الدم عادةً بعد نحو **4 أسابيع**.
- يرتفع الهيموغلوبين أولًا، ثم يمتلئ مخزون الحديد ببطء.
- استمر في الحديد نحو **3 أشهر بعد** أن يعود الهيموغلوبين إلى الطبيعي.

## ما الأطعمة الغنية بالحديد؟

| أطعمة يمتص الجسم حديدها جيدًا | أطعمة نباتية فيها حديد |
|---|---|
| اللحم الأحمر والكبدة (تجنّبي الكبدة أثناء الحمل) | العدس والحمص والفول |
| الدجاج والديك الرومي | الخضار الورقية الداكنة |
| السمك والمأكولات البحرية | حبوب الإفطار المدعّمة بالحديد |
| | التمر والزبيب والمشمش المجفف (كمية قليلة) |

تناول الحديد النباتي مع الليمون أو البرتقال أو الطماطم أو الفلفل (فيتامين سي). والطعام وحده لا يكفي غالبًا، فما زلت تحتاج إلى الحبوب.

### اطلب المساعدة فورًا: اتصل بـ 997 أو اذهب إلى الطوارئ إذا كان لديك:

- ألم في الصدر، أو ضيق شديد في النفس، أو إغماء.
- قيء دم.
- براز أسود لزج يشبه القطران مع دوخة. (براز الحديد داكن لكنه متماسك، وتشعر معه بأنك بخير.)
- نزف غزير جدًا يملأ الفوطة كل ساعة.

## راجع طبيبك قريبًا إذا:

- لم تشعر بتحسّن بعد 4 أسابيع.
- منعتك الأعراض الجانبية من أخذ الحبوب، أو ما زالت الدورة الشهرية غزيرة جدًا.
- نقص وزنك دون قصد، أو تغيّرت عادة الإخراج لديك.

## خطتي

نوع حبوب الحديد وجرعتها وعدد مراتها: _____

موعد التحليل القادم: _____

**إعداد وإشراف طبي: د. البراء البواب، طب الأسرة**
المؤسس والمحرر الطبي، أدلة طب الأسرة

تقدّم هذه النشرة معلومات عامة، ولا تغني عن نصيحة طبيبك الذي يعرف حالتك. أحضرها معك في زيارتك القادمة واسأل عن أي شيء غير واضح. صيغت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وراجعها المحرر الطبي، وما زالت قيد المراجعة مع الزملاء.

**آخر تحديث:** أكتوبر 2026 · **المراجعة القادمة:** أكتوبر 2027، أو قبل ذلك إذا تغيّرت التوصيات

**المصادر:**

1. American Society of Hematology 2026 guideline on the diagnosis of iron deficiency. Blood Adv 2026. doi:10.1182/bloodadvances.2025015950
2. Snook J, et al. British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. Gut 2021;70:2030–51
3. DeLoughery TG, et al. AGA Clinical Practice Update on management of iron deficiency anemia. Clin Gastroenterol Hepatol 2024
4. Iolascon A, et al. Recommendations for diagnosis, treatment and prevention of iron deficiency and iron deficiency anemia. HemaSphere 2024 (EHA)