

MS BGD

MDI 720 : Statistiques

François Portier et Joseph Salmon

<http://josephsalmon.eu>

Télécom Paristech, Institut Mines-Télécom

Sommaire

Tests d'hypothèses

- Définition

- Test pour le modèle linéaire

Illustration : forward variable selection
base de données “diabetes”

Courbe ROC

- Présentation

- Exemples

Sommaire

Tests d'hypothèses

Définition

Test pour le modèle linéaire

Illustration : forward variable selection

base de données “diabetes”

Courbe ROC

Présentation

Exemples

Tests d'hypothèses pour le “Pile ou face”

- ▶ On veut tester une hypothèse sur le paramètre θ .
- ▶ On l'appelle **hypothèse nulle** \mathcal{H}_0
Exemple : ‘la pièce est non biaisée’ : $\mathcal{H}_0 = \{p = 0.5\}$.
Exemple : ‘la pièce est peu biaisée’, $\mathcal{H}_0 = \{0.45 \leq p \leq 0.55\}$
- ▶ L'**hypothèse alternative** \mathcal{H}_1 est (souvent) le contraire de \mathcal{H}_0 .
Exemple : $\mathcal{H}_1 = \{p \neq 0.5\}$
Exemple : $\mathcal{H}_1 = \{p \notin [0.45, 0.55]\}$
- ▶ « Faire un test » : déterminer si les données permettent de **rejeter** l'hypothèse \mathcal{H}_0 . On cherche une région R pour laquelle si $(y_1, \dots, y_n) \in R$ on rejette l'hypothèse \mathcal{H}_0 . R est la région de **rejet**.

Rejet ou acceptation ?

Présomption d'innocence en faveur de \mathcal{H}_0

Même si \mathcal{H}_0 n'est pas rejetée par le test, on ne peut en général pas conclure que \mathcal{H}_0 est vraie !

Rejeter \mathcal{H}_1 est souvent impossible car \mathcal{H}_1 est trop générale.
e.g., $\{p \in [0, 0.5[\cup]0.5, 1]\}$ ne peut pas être rejetée !

- ▶ \mathcal{H}_0 s'écrit sous la forme $\{\theta \in \Theta_0\}$, avec $\Theta_0 \subset \Theta$
- ▶ \mathcal{H}_1 s'écrit sous la forme $\{\theta \in \Theta_1\}$, avec $\Theta_1 \subset \Theta$

Rem: $\{\theta \in \Theta_0\}$ et $\{\theta \in \Theta_1\}$ sont disjoints.

Risques de première et de seconde espèce

	\mathcal{H}_0	\mathcal{H}_1
Non rejet de \mathcal{H}_0	Juste	Faux (acceptation à tort)
Rejet de \mathcal{H}_0	Faux (rejet à tort)	Juste

- Risque de 1^{re} espèce : probabilité de rejeter à tort

$$\alpha = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\theta}((y_1, \dots, y_n) \in R)$$

- Risque de 2nde espèce : probabilité d'accepter à tort

$$\sup_{\theta \in \Theta_1} \mathbb{P}_{\theta}((y_1, \dots, y_n) \notin R)$$

Niveau/Puissance

Niveau du test

$1 - \alpha$ = probabilité d'« accepter » à raison (si \mathcal{H}_0 est valide)

Puissance du test

$1 - \beta$ = probabilité de rejeter \mathcal{H}_0 à raison (si \mathcal{H}_1 est valide)

En général, lorsqu'on parle de « test à 95% » on parle d'un test de niveau $1 - \alpha \geq 95\%$.

Statistique de test et région de rejet

Objectif classique : construire un test de niveau $1 - \alpha$

- ▶ On cherche une fonction des données $T_n(y_1, \dots, y_n)$ dont on connaît la loi si \mathcal{H}_0 est vraie : T_n est appelée *statistique de test*.
- ▶ On définit une *région de rejet* ou *région critique* de niveau α , une région R telle que, sous \mathcal{H}_0 ,

$$\mathbb{P}(T_n(y_1, \dots, y_n) \in R) \leq \alpha$$

- ▶ Règle de rejet de \mathcal{H}_0 : on rejette si $T_n(y_1, \dots, y_n) \in R$

Exemple gaussien : nullité de la moyenne

- ▶ Modèle : $\Theta = \mathbb{R}$, $\mathbb{P}_\theta = \mathcal{N}(\theta, 1)$.
- ▶ Hypothèse nulle : $\mathcal{H}_0 : \{\theta = 0\}$
- ▶ Sous \mathcal{H}_0 , $T_n(y_1, \dots, y_n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_i y_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$
- ▶ Région critique pour T_n ? Quantiles gaussiens : sous H_0 ,
$$\mathbb{P}(T_n \in [-1.96, 1.96]) = 0.95$$

On prend $R = [-1.96, 1.96]^C =]-\infty, -1.96[\cup]1.96, +\infty[$.

- ▶ Exemple numérique : si $T_n = 1.5$, on ne rejette **PAS** \mathcal{H}_0 au niveau 95%

Sommaire

Tests d'hypothèses

- Définition

- Test pour le modèle linéaire

Illustration : forward variable selection

- base de données “diabetes”

Courbe ROC

- Présentation

- Exemples

Tester la nullité des coefficients (I)

Rappel : prenons $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$, alors $\hat{\sigma}^2 = \|\mathbf{y} - X\hat{\boldsymbol{\theta}}\|_2^2 / (n - \text{rg}(X))$ est un estimateur sans biais de la variance. Ainsi

Si $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \text{Id}_n)$, alors

$$T_j = \frac{\hat{\theta}_j - \theta_j^*}{\hat{\sigma} \sqrt{(X^\top X)^{-1}_{j,j}}} \sim \mathcal{T}_{n-\text{rg}(X)}$$

où $\mathcal{T}_{n-\text{rg}(X)}$ est une loi dite de Student (de degré $n - \text{rg}(X)$).

Sa densité, ses quantiles, etc... peuvent être calculés numériquement.

Tester la nullité des coefficients (I)

$H_0 : \theta_j^* = 0$ ce qui revient à prendre $\Theta_0 = \{\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^p : \theta_j = 0\}$.

Sous H_0 on connaît donc la distribution de $\hat{\theta}_j$:

$$T_j := \frac{\hat{\theta}_j}{\hat{\sigma} \sqrt{(X^\top X)^{-1}_{j,j}}} \sim \mathcal{T}_{n-\text{rg}(X)}$$

Ainsi en choisissant comme région de rejet $[-t_{1-\alpha/2}, t_{1-\alpha/2}]^c$ (en notant $t_{1-\alpha/2}$ un quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de la loi $\mathcal{T}_{n-\text{rg}(X)}$), on peut former le test (de Student) :

$$\mathbb{1}_{\{|T_j| > t_{1-\alpha/2}\}}$$

c'est-à-dire que l'on rejette H_0 au niveau α , si $|T_j| > t_{1-\alpha/2}$

cf. [Tsybakov \(2006\)](#) pour plus de détails

Lien IC et Test

Rappel (modèle gaussien) :

$$IC_{\alpha} := \left[\hat{\theta}_j - t_{1-\alpha/2} \hat{\sigma} \sqrt{(X^{\top} X)_{j,j}^{-1}}, \hat{\theta}_j + t_{1-\alpha/2} \hat{\sigma} \sqrt{(X^{\top} X)_{j,j}^{-1}} \right]$$

est un IC de niveau α pour θ_j^* . Dire que " $0 \in IC_{\alpha}$ " signifie que

$$|\hat{\theta}_j| \leq t_{1-\alpha/2} \hat{\sigma} \sqrt{(X^{\top} X)_{j,j}^{-1}} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{|\hat{\theta}_j|}{\hat{\sigma} \sqrt{(X^{\top} X)_{j,j}^{-1}}} \leq t_{1-\alpha/2}$$

Cela est donc équivalent à accepter l'hypothèse $\theta_j^* = 0$ au niveau α . Le α le plus petit telle que $0 \in IC_{\alpha}$ est appelé la ***p-value***.

Rem: On sait que si l'on prend α très proche de zéro un IC_{α} va recouvrir l'espace entier, on peut donc trouver (par continuité) un α qui assure l'égalité dans les équations ci-dessus.

Sommaire

Tests d'hypothèses

- Définition

- Test pour le modèle linéaire

Illustration : forward variable selection
base de données “diabetes”

Courbe ROC

- Présentation

- Exemples

Base de données “diabetes”

patient	age	sex	bmi	bp	Serum measurements						Resp
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	y
1	59	2	32.1	101	157	93	38	4	4.9	87	151
2	48	1	21.6	87	183	103	70	3	3.9	69	75
...
...
441	36	1	30.0	95	201	125	42	5	5.1	85	220
442	36	1	19.6	71	250	133	97	3	4.6	92	57

TABLE – Pour 442 patients diabétiques, 10 variables “baseline” (body mass index (bmi), average blood pressure (bp)) ont été mesurées. On cherche à prédire une mesure de la progression de la maladie effectuée un an après les “baseline” [EHJT04]

- les variables explicatives de la base de `sklearn` ont été standardisées.

Base de données “diabetes”

Etape 0

- ▶ pour chacune des variables X_k , $k = 1, \dots, 10$, on considère le modèle

$$Y \simeq \alpha + \beta_k X_k$$

- ▶ on test si son coefficient de régression est nulle, i.e.,

$$H_0 : \beta_k = 0$$

via la statistique $\hat{\beta}_k / \hat{s}_k$ avec \hat{s}_k l'écart type estimé.

- ▶ on compare toutes les p -valeurs, on garde celle ayant la plus petite.

Base de données “diabetes”

Etape ℓ

On a sélectionné ℓ variable(s) : $\tilde{X}^{(\ell)} \in \mathbb{R}^\ell$. Les autres sont noté $\tilde{X}^{(-\ell)} \in \mathbb{R}^{p-\ell}$

- ▶ pour chacune des variables X_k , dans $\tilde{X}^{(-\ell)}$, on considère le modèle

$$Y \simeq \alpha + \beta^{(\ell)} \tilde{X}^{(\ell)} + \beta_k X_k$$


- ▶ on test si son coefficient de régression est nulle, i.e.,

$$H_0 : \beta_k = 0$$

via la statistique $\hat{\beta}_k / \hat{s}_k$ avec \hat{s}_k l'écart type estimé.

- ▶ on compare toutes les p -valeurs, on garde celle ayant la plus petite.

Valeurs de la statistique à chaque étape



- ▶ la statistique d'une variable sélectionnée est mise à 0 aux étapes suivantes
- ▶ variables sélectionnées avec une p-valeur seuil de .1 :

[2, 8 , 3, 4, 1, 5]

Sommaire

Tests d'hypothèses

- Définition

- Test pour le modèle linéaire

Illustration : forward variable selection

- base de données “diabetes”

Courbe ROC

- Présentation

- Exemples

Contexte médical


- ▶ Un groupe de patients $i = 1, \dots, n$ est suivi pour un dépistage.
- ▶ Pour chaque individu, le test se base sur une variable aléatoire $X_i \in \mathbb{R}$ et un seuil $q \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} \text{Si } X_i > q & \text{le test est } \mathbf{positif} \\ \text{Sinon} & \text{le test est } \mathbf{négatif} \end{cases}$$


Ensemble des configurations possibles

	Normal H_0	Atteint H_1
négatif	vrai négatif	faux négatif (FN)
positif	faux positif (FP)	vrai positif


Faux positif vs faux négatif




Faux positif vs faux négatif




Faux positif vs faux négatif




Faux positif vs faux négatif




Faux positif vs faux négatif




Faux positif vs faux négatif




Faux positif vs faux négatif



Faux positif vs faux négatif



Faux positif vs faux négatif



Sensibilité - Spécificité

- ▶ On suppose que les individus normaux ont la même fonction de répartition F
- ▶ On suppose que les individus atteints ont la même fonction de répartition G

Définition

- ▶ Sensibilité : $Se(q) = 1 - G(q)$ (1 – risque de 2nde espèce)
- ▶ Spécificité : $Sp(q) = F(q)$ (1 – risque de 1^{re} espèce)

Courbe ROC


Définition

La courbe ROC est la courbe décrite par $(1 - \text{Sp}(q), \text{Se}(q))$, quand $q \in \mathbb{R}$. C'est donc la fonction $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$



$$\text{ROC}(t) = 1 - G(F^{-1}(1 - t))$$

où $F^{-1}(1 - t) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq 1 - t\}$.



TO DO: Harmonizer avec autres figures, celle la est illisible





ROC curve





ROC curve





ROC curve





ROC curve





ROC curve





ROC curve





ROC curve



ROC curve



ROC curve



Sommaire

Tests d'hypothèses

- Définition

- Test pour le modèle linéaire

Illustration : forward variable selection

- base de données “diabetes”


Courbe ROC

- Présentation

- Exemples

La courbe ROC dans le cas bi-normal

- ▶ F et G sont des gaussiennes de paramètres μ_0, σ_0 et μ_1, σ_1 , respectivement.
- ▶ On spécifie $\mu_0 = 0$, $\sigma_0 = \sigma_1 = 1$, on fait varier μ_1




Estimation–application

Estimation de la courbe ROC

- ▶ Maximum de vraisemblance
- ▶ Non-paramétrique
- ▶ Bayésien avec variable d'état latente
- ▶ Estimation de l'aire sous la courbe ROC

Application

- ▶ Pour comparer différents tests statistiques
- ▶ Pour comparer différents algorithmes d'apprentissage supervisé
- ▶ Pour comparer des méthodes de sélection de support du Lasso

( : ROC=Receiver Operating Characteristic)

Références I

- ▶ B. Efron, T. Hastie, I. M. Johnstone, and R. Tibshirani.
Least angle regression.
Ann. Statist., 32(2) :407–499, 2004.
With discussion, and a rejoinder by the authors.
- ▶ A. B. Tsybakov.
Statistique appliquée, 2006.
[http://josephsalmon.eu/enseignement/ENSAE/
StatAppli_tsybakov.pdf](http://josephsalmon.eu/enseignement/ENSAE/StatAppli_tsybakov.pdf).