UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Thales Machado Fernandes
Prof. Pedro Alves da Silva Autreto

NOVOS MATERIAIS BIDIMENSIONAIS OBTIDOS PELA ENGENHARIA DE DEFEITOS PARA ARMAZENAMENTO PARA ARMAZENAMENTO E REAÇÕES DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Santo André
2026

Thales Machado Fernandes

NOVOS MATERIAIS BIDIMENSIONAIS OBTIDOS PELA ENGENHARIA DE DEFEITOS PARA ARMAZENAMENTO PARA ARMAZENAMENTO E REAÇÕES DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Trabalho apresentado como requisito final para o PRH

Universidade Federal do ABC
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia

Orientador: Prof. Pedro Alves da Silva Autreto

Santo André
2026

Resumo

Resumo do trabalho. Deve conter objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Não deve conter citações.
Palavras-chave: palavra 1. palavra 2. palavra 3.

Abstract

Abstract in English.

Keywords: keyword 1. keyword 2. keyword 3.

Sumário

Sumário **4**

Lista de ilustrações **4**

Lista de tabelas **4**

1 INTRODUÇÃO **5**

2 FUNDAMENTACAO TEÓRICA **6**

2.1 Postulados da Mecânica Quântica **6**

2.1.1 Primeiro Postulado 6

2.1.2 Segundo Postulado 6

REFERÊNCIAS **8**

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

1 Introdução

Texto da introdução.
Exemplo de citação (EINSTEIN, 1905).

2 Fundamentacao Teórica

2.1 Postulados da Mecânica Quântica

A física quântica surgiu em meio a descoberta de que tanto ondas eletromagnéticas quanto partículas, poderiam apresentar comportamentos ondulatóricos e corpusculares a depender do experimento. Além disso, a formulaçao clássica baseada nas leis de newton falhava na descrição de tais sistemas, o que levou a um grande esforço da comunidade científica por um formalismo mais acertivo.

A descrição inicial mais completa da mecânica quântica aborda uma descrição probabilística dos sistemas em pequena escala. Essa descrição é muito motivada por fatos experimetais e abordagens teóricas antecedentes, tais como a dualidade onda-partícula, a ideia de onda de matéria de de Broglie, e a quantização da energia de Planck. O sucesso empírico dessa teoria faz com que seja amplamente utilizada em pesquisas atuais, em especial na física da matéria condensada.

Os aspectos mais fundamentais da mecânica quântica podem ser resumidos em seus postulados.

2.1.1 Primeiro Postulado

Assim como na mecânica clássica os sistemas possuem um conjunto de variáveis que definem o estado de um sistema, como por exemplo a posição e o momento, na mecânica quântica assumimos que nosso sistema também pode assumir um conjunto de estados representados como vetores no espaço de Hilbert denotados por $|k\rangle$. Contudo, diferente da mecânica clássica, um sistema quântico pode estar em uma superposição de estados físicos. Isso é descrito matemáticamente como uma combinação linear no caso de estados discretos,

$$|\psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle, \tag{2.1}$$

como por exemplo o spin do eletron, ou, quando lidamos com estados contínuos, como a posição de uma partícula, a superposição se da por uma integral sobre todos os estados,

$$|\psi\rangle = \int dk \; c(k)|k\rangle. \tag{2.2}$$

2.1.2 Segundo Postulado

De fato, o estado de um sistema quantico ser uma combinação linear de seus possíveis estados não tem um significado físico evidente. Portanto, essa interpretação é postulada de modo que possamos compreender o que o formalismo matemático representa na realidade.

O segundo postulado da mecânica quântica afirma que se os estados são ortonormais, isso é,

$$\langle i|j\rangle = \delta_{ij} \tag{2.3}$$

no caso discreto, e

$$\langle \xi|\xi'\rangle = \delta(\xi - \xi') \tag{2.4}$$

no caso contínuo, a probabilidade de se encontrar um sistema quântico no estado $|k\rangle$ é $|\langle k|\psi\rangle|^2$, os coeficientes da combinação linear, de modo que a probabilidade de achar o sistem em qualquer estado é

$$\langle\psi|\psi\rangle = (\sum_k c_k^* \langle k|)(\sum_k c_k|k\rangle) = \sum_k |c_k|^2 = \sum_k |\langle k|\psi\rangle|^2 = 1 \tag{2.5}$$

ou

$$\langle\psi|\psi\rangle = (\int dk\, c^*(k)\langle k|)(\int dk'\, c(k')|k'\rangle) = \int\int dkdk'\, c^*(k)c(k')\delta(k-k') = \int dk\, |c(k)|^2 = 1, \tag{2.6}$$

como deve ser.

Referências

EINSTEIN, A. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der Physik*, 1905.