

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/293014214>

Redução do erro amostral na estimativa do volume de povoamentos de *Eucalyptus* ssp. por meio de escaneamento laser aerotransportado

Article in *Scientia Forestalis* · December 2015

DOI: 10.18671/scifor.v43n108.9

CITATIONS

8

READS

309

5 authors, including:



Eric Bastos Gorgens

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

167 PUBLICATIONS 1,503 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Carlos Soares

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

138 PUBLICATIONS 1,678 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Luiz Carlos Estraviz Rodriguez

University of São Paulo

115 PUBLICATIONS 1,877 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Redução do erro amostral na estimativa do volume de povoamentos de *Eucalyptus* ssp. por escaneamento laser aerotransportado

Reducing of the sampling error in *Eucalyptus* ssp. stand volume through airborne laser scanning estimation

Danitiele Cristina França Laranja¹

Eric Bastos Gorgens²

Carlos Pedro Boechat Soares³

André Gracioso Peres da Silva⁴

Luiz Carlos Estraviz Rodriguez⁵

¹Mestranda em Recursos Florestais. USP - Universidade de São Paulo - Departamento de Ciências Florestais / ESALQ - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Av. Pádua Dias, 11 - 13418-900 - Piracicaba, SP. E-mail: danitiele.cfl@gmail.com.

²Professor e Pesquisador do Departamento de Engenharia Florestal. UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Campus JK - F 583, 5000 - Alto do Jacuba - 39100-000 - Diamantina, MG. E-mail: gorgens@usp.br.

³Professor Titular do Departamento de Engenharia Florestal. UFV - Universidade Federal de Viçosa - Centro de Ciências Agrárias - Campus Universitário, Viçosa, MG. E-mail: csoares@ufv.br.

⁴Mestre em Recursos Florestais. USP - Universidade de São Paulo - Departamento de Ciências Florestais / ESALQ - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Av. Pádua Dias, 11 - 13418-900 - Piracicaba, SP. E-mail: andregracioso@gmail.com.

⁵Professor Associado do Departamento de Ciências Florestais. USP - Universidade de São Paulo / ESALQ - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Av. Pádua Dias, 11 - 13418-900 - Piracicaba, SP. E-mail: icer@usp.br.

Recebido em 22/10/2014 - Aceito para publicação em 11/12/2014

Resumo

O inventário florestal é uma importante atividade que fornece uma ampla gama de informações sobre os parâmetros populacionais de florestais, com base em delineamentos de amostragem. Assim, este trabalho apresenta e avalia o uso combinado de levantamentos laser (ALS - *Airborne Laser Scanning*) e de dupla amostragem para estimativa de volume em plantios de eucalipto, comparando os resultados com os resultados de delineamentos amostrais tradicionais como a amostragem casual simples e a amostragem casual estratificada. No primeiro cenário de dupla amostragem assumiu-se a primeira fase como sendo a métrica de altura percentil 90 (P90) derivado dos dados ALS. No segundo cenário, adotou-se o percentil 90 e a métrica de proporção percentagem de todos os retornos acima da média relacionada aos primeiros retornos (ARMFR), derivadas do *Light Detection And Ranging* (LiDAR). Através de simulações buscou-se determinar a intensidade amostral necessária para atender um erro máximo de 5%. O estudo foi realizado em uma área de 401,6 hectares localizada nos municípios de São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul, onde foram medidas 37 parcelas em campo. O menor erro de amostragem obtido foi o da dupla amostragem com regressão múltipla ($\pm 1,8\%$), seguida da amostragem com estimador de regressão simples; amostragem casual estratificada; e amostragem casual simples, confirmando o potencial dos dados do sensor laser para melhorar as estimativas de volume do inventário florestal, possibilitando a redução da intensidade amostral apenas 10 unidades de amostra, o erro da dupla amostragem obtido na regressão múltipla foi de $\pm 3,4\%$.

Palavras-chave: LiDAR, Delineamento Amostral, Erro Amostral, Dupla Amostragem, Métricas ALS.

Abstract

Forest inventory is an important activity to provide a wide range of information about the parameters from extensive forested areas based on different sampling designs. This study evaluates the use of ALS (*Airborne Laser Scanning*) metrics as part of a double sampling design for stand volume estimation in *Eucalyptus* plantation, comparing the results to traditional sampling designs such as simple random sampling and stratified random sampling. In the double sampling first phase was the height metric of the 90th percentile (P90) derived from LiDAR (*Light Detection And Ranging*) data. In the second sampling scenario we adopted the 90th percentile (P90) and the density metric percentage of all returns above the mean of first return height also derived from LiDAR data. Through simulations we sought to determine the sampling intensity required to obtain a sampling error at most 5%. The study was conducted in 401,6 hectares of *Eucalyptus* plantation located between the municipalities of São Miguel Arcanjo and Pilar do Sul (São Paulo), where 37 plots were measured in the field. The smallest sampling error was obtained from the double sampling with multiple regression ($\pm 1,8\%$), followed by sampling with simple regression, the stratified random sampling and the simple random sampling; confirming the use of ALS data to improve estimation and enabling the sampling intensity reduction. The error of double sampling with multiple regression was $\pm 3,4\%$ considering only 10 additional units of sample, the error of double sampling with multiple regression was $\pm 3,4\%$ considering only 10 additional units of sample.

Keywords: LiDAR, double sampling, sample design, sampling error, ALS metrics.

INTRODUÇÃO

O Inventário florestal tem por objetivo a quantificação e qualificação dos atributos florestais existentes em uma área, sendo uma peça importante no manejo florestal, seja de florestas naturais, seja de florestas plantadas. Ele é capaz de fornecer detalhes da floresta, por meio de técnicas que estimam os parâmetros da população (PÉLLICO NETTO; BRENA, 1997; MORAIS FILHO et al., 2003).

Em função do tamanho das florestas e da densidade de indivíduos por unidade de área, normalmente os inventários florestais são realizados por amostragem. Diferentes delineamentos amostrais existem para melhor estimar o valor de um determinado parâmetro populacional e a sua

precisão amostral ($E(\%)$) é determinada a partir do erro padrão da média ($S_{\bar{y}}$), que nada mais é que uma medida de variabilidade da média que é calculada a partir das amostras tomadas da população (SHIVER; BORDERS, 1996).

Na amostragem casual simples (ACS), todos os elementos da população possuem a mesma probabilidade de pertencer à amostra. A principal desvantagem da ACS é que o lançamento aleatório das parcelas pode resultar na não representação de todos os estratos da floresta, resultando assim em imprecisas da população. Neste caso, quando a população pode ser dividida em estratos homogêneos, emprega-se a amostragem casual estratificada (ACE). Os estratos devem ser representados na amostra na mesma proporção com que existem na população. Quanto mais estratos homogêneos os estratos, o erro amostral tende a diminuir, uma vez que o erro padrão da média também diminui.

Em casos em que um maior nível de detalhe e precisão são requeridos, a dupla amostragem (ou amostragem em duas fases) se oferece como uma interessante alternativa. Na primeira fase (também conhecida como fase simples), os esforços são direcionados para a obtenção de uma amostra sem se preocupar com a variável de interesse. Assim, a variável auxiliar deve ser de mais fácil mensuração e altamente correlacionada com a variável de interesse. A intensidade amostrada durante a primeira fase é geralmente superior à intensidade da segunda fase (SHIVER; BORDERS, 1996).

Na segunda fase (também conhecida como fase completa), a intensidade amostral é menor e medem-se simultaneamente a variável auxiliar e a variável de interesse nas unidades amostrais. Não é necessário que as fases ocorram de maneira simultânea. No entanto, é fundamental que as duas variáveis sejam coletadas de forma a permitir que um estimador de regressão relacione a variável auxiliar e a variável de interesse (BORDERS, 1996).

A dupla amostragem (DA) permite que as informações dos dados auxiliares sejam usadas para melhorar a precisão e exatidão das estimativas das variáveis do inventário florestal, quando comparadas com os inventários baseados apenas nas observações da variável de interesse. Essa melhoria é alcançada através do uso de estimadores de regressão ou de razão e depende do nível de correlação entre os dados de sensoriamento remoto e o inventário florestal (STEPHENS et al., 2012).

É muito comum o uso de informações obtidas por sensores remotos na primeira fase de uma dupla amostragem em levantamentos florestais. Breidenbach (2007), por exemplo, demonstraram que o emprego de variáveis auxiliares obtidas a partir do sensoriamento remoto pode aumentar a exatidão das estimativas de inventário. As primeiras aplicações da dupla amostragem em inventários florestais utilizaram na primeira fase imagens extraídas de fotos aéreas. Em seguida, imagens de satélite passaram a substituir as fotos aéreas (VAN DEUSEN et al., 1999). O escaneamento laser aerotransportado, baseado em tecnologias LiDAR (*Light Detection And Ranging*) apresenta-se como alternativa tecnológica viável capaz de obter melhores resultados quando métricas resultantes desses levantamentos são usadas como variáveis auxiliares em inventários de dupla amostragem.

O escaneamento laser aerotransportado (ALS – *Airborne Laser Scanning*) tem ganhado destaque (MALTAMO et al., 2004). Os sistemas emissores de pulsos de luz laser, baseiam-se nos mesmos princípios dos sistemas RADAR, emissores de ondas de rádio (GIONGO et al., 2010). A tecnologia LiDAR baseada em sensores acoplados aos processos de varredura a laser aerotransportado gera uma grande quantidade de dados tridimensional sobre a estrutura vertical e horizontal da floresta com alta precisão, baixo custo e alta velocidade de aquisição de dados (GIONGO et al., 2010).


A escolha do melhor método amostral, além de considerar as características da população, deve adequar a expectativa de maior precisão possível. A não consideração de características específicas da população estudada, pode acarretar custos maiores de inventário (CESARI et al., 2010). Dessa forma, justificam-se as análises de diferentes métodos de amostragem, que busquem reduzir o tempo e o custo de execução do inventário sem haja prejuízos à precisão e à exatidão das estimativas.

Næsset et al. (2013) reforçam a recomendação de desenhos amostrais eficientes para inventários, especialmente relacionados à incerteza. Diferentes estratégias de amostragem têm sido analisadas com base em técnicas de simulação.

A hipótese deste trabalho é de que a alta densidade de pontos amostrados em levantamentos laser aerotransportados aliado à alta precisão das métricas LiDAR e parâmetros biofísicos da floresta pode ser utilizada na primeira fase do método de dupla amostragem e, também, para a estimativa da intensidade amostral de campo.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em uma área de 401,6 hectares pertencente à empresa Suzano Papel e Celulose, localizada no interior do Estado nos municípios de São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul (Figura 1). O clima da região é caracterizado pela precipitação média anual de 1400 mm e média de 715 m (classificação de Köppen: Cfb). O relevo é ondulado com inclinação máxima de 32 graus (GAVA, 1997).



A área é dividida em talhões, formados por plantios clonais do gênero *Eucalyptus*, manejados para a produção de celulose. Apresenta 25 anos e foram plantados utilizando-se clones originários de quatro grupos genéticos diferentes, em espaçamento 3 x 2,2m. Foram considerados os dados coletados em 37 parcelas circulares com área de 380,13 m² (Tabela 1).

Tabela 1. Caracterização dos povoamentos do estudo.

Table 1. Characterization of the study stands.

Unidade de Produção	Área (ha)	Nº de parcelas	DAP (cm)		Altura (m)		VT
			Média	Desvio	Média	Desvio	Média
1	101,47	10	14,0	0,61	23,2	0,86	266,5
2	64,18	5	14,8	0,38	24,8	0,62	293,7
3	50,32	5	15,9	0,27	25,9	0,65	358,4
4	83,31	7	16,0	0,50	26,6	0,61	387,7
5	102,34	10	16,2	0,88	26,3	1,07	362,9

Obs.: DAP= Diâmetro a altura do peito, VTCC= Volume total com casca.

Levantamento dos dados LiDAR

Os dados LiDAR foram obtidos em dezembro de 2013, com uma aeronave CESNA modelo 206, equipada com uma unidade inercial Appli modelado POS AV 150 e sensor LiDAR Harrier 68i da Trimble. As especificações do voo encontram-se detalhadas na Tabela 2.

Tabela 2. Especificações do voo.

Table 2. Flight specifications.

Características	Descrição dos parâmetros
Densidade de pontos	10 pontos/m ²
Diâmetro do pulso no alvo (<i>footprint</i>)	0,22 m
Ângulo de abertura para varredura (FOV)	45°
Faixa de varredura	363,11 m
Altura do voo	438,32 m
Taxa de escaneamento	174,05 Hz
Taxa de emissão	400 kHz

Levantamento de campo

As 37 parcelas foram lançadas de forma aleatória dentro das 5 unidades de produção (UP). Em cada parcela foram medidos os diâmetro (DAP) de todas as árvores, a altura total das 10 árvores localizadas na linha central da parcela e 4 alturas totais das árvores de maior hipsométrico de Campos et al. (1984) foi utilizado para estimação das alturas (H) das árvores não medidas e o volume foi estimado Schumacher e Hall (1933), para os quais foram fornecidos pela empresa os coeficientes adequados para a região onde o estudo está ins total com casca (VTCC) de cada parcela é resultado da soma dos volumes individuais, e convertido para volume por hectare com base na área

Delineamentos amostrais

O volume total com casca da área de estudo foi estimado através de três delineamentos amostrais consolidados em cinco cenários. parcelas foram processadas assumindo amostragem casual simples (ACS). Em seguida, duas estratificações foram implementadas. A primeira casual estratificada (ACE I) usou apenas o material genético como variável de estratificação. Na ACE II considerou-se o material genético produção (UP) como critérios de estratificação. A UP foi escolhida por agrupar áreas submetidas a condições semelhantes de manejo abordagens de dupla amostragem (DA) pelo estimador da regressão foram desenvolvidas. A primeira abordagem (DA I) assumiu a LiDAR como variável auxiliar na primeira fase. A segunda abordagem (DA II) considerou duas métricas LiDAR como variáveis auxiliares na primeira fase. As métricas usadas como variáveis auxiliares expressam estatísticas derivadas da distribuição vertical dos retornos LiDAR (SILVA et al., 2015).

Na amostragem casual simples, sendo \bar{y} a média amostral e t a estatística t de *Student*, tabelada para $n - 1$ graus de liberdade com 5% o erro de amostragem percentual pode ser estimado pela equação 1 (SHIVER; BORDERS, 1996).

$$E(\%) = \frac{S_y \cdot t}{\bar{y}} \cdot 100 \quad (1)$$

Ainda com relação à ACS, sendo y_i o volume por hectare da i -ésima parcela, S_y^2 é a variância do volume por hectare das parcelas, N é o número total de unidades amostrais possíveis dentro da população, a média (Equação 2) e a variância da média (Equação 3) calculadas da seguinte forma (SHIVER; BORDERS, 1996):

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} \quad (2)$$

$$S_y^2 = \frac{S_y^2}{n} \cdot \left(\frac{N-n}{N} \right) \quad (3)$$

O erro padrão da média pode ser então calculado através da equação 4:

$$s_y = \pm \sqrt{S_y^2} \quad (4)$$

Na amostragem casual estratificada, sendo \bar{y}_j a média dos volumes das unidades de amostra do j -ésimo estrato, n_j o número de parcelas do estrato, N_j o número de parcelas possível no j -ésimo estrato, N o número de unidades de amostra possíveis na população e S_j^2 a variância do estrato, a média estratificada (Equação 5) e a variância da média estratificada (Equação 6) podem ser estimadas através de (SHIVER; BORDERS, 1996):

$$\bar{y} = \frac{\sum N_j \bar{y}_j}{N} \quad (5)$$

$$S_y^2 = \sum \left(\left(\frac{N_j}{N} \right)^2 \cdot \frac{S_j^2}{n_j} \cdot \left(\frac{N_j - n_j}{N_j} \right) \right) \quad (6)$$

O erro padrão da média foi obtido, extraído-se a raiz quadrada da equação 6.

Na DA I, o estimador da regressão (Equação 7) foi escolhido para relacionar a variável de interesse (2ª fase) volume total com casca (VTCC) com a variável auxiliar (1ª fase) percentil 90 (P90), que expressa a altura abaixo da qual se encontram 90% dos retornos LiDAR:

$$VTCC = \beta_0 + \beta_1 P90 + \varepsilon \quad (7)$$

Em que β_i = coeficientes do modelo e ε = erro aleatório.

Já na DA II, foram utilizadas duas variáveis auxiliares (percentil 90 – P90 e porcentagem de retornos acima da média dos primeiros retornos em uma regressão linear múltipla (Equação 8) para relacionar essas duas métricas LiDAR (1ª fase) com a variável de interesse VTCC (2ª fase).

$$VTCC = \beta_0 + \beta_1 P90 + \beta_2 ARMFR + \varepsilon \quad (8)$$

Em que β_i = coeficientes do modelo e ε = erro aleatório.

Na dupla amostragem, a variância da média amostral (Equação 9) é uma combinação da variância do VTCC mensurado na 2ª fase e da regressão que relaciona a variável auxiliar com a variável de interesse (Equação 10), podendo ser estimado por (SHIVER; BORDERS, 1996):

$$S_{\bar{y}_{dl}}^2 = \frac{S_y^2}{n} \cdot \left(1 - \left(\frac{n' - n}{n'} \right) \cdot \rho^2 \right) \quad (9)$$

Em que n' e n = número de parcelas na 1ª e 2ª fase, respectivamente e ρ pode ser calculado a partir do coeficiente de determinação ajustado (SHIVER; BORDERS, 1996):

$$\rho = \sqrt{R_{adj}^2} \quad (10)$$

A métrica de altura P90 foi escolhida com base no trabalho desenvolvido por Zonete et al. (2010), que encontrou o percentil 90 (P90) e as mais promissoras para modelar volume de plantios florestais. Silva et al. (2015) sugeriu a inclusão de métricas de proporção para ajudar a explicar a variação do volume. Assim na DA II, foi adicionado ao estimador da regressão a métrica de densidade ARMFR.

Intensidade amostral

Para que a determinação da intensidade amostral ideal nas cinco estratégias amostrais se faça de forma comparativa optou-se por utilizar simulação variando gradativamente o número de parcelas até que o erro amostral atingisse nível satisfatório.

O processo de simulação consistiu, portanto, num processo de redução gradativa ao acaso do número de parcelas (n) até que o erro atingisse $\pm 5\%$. A cada redução, n parcelas eram escolhidas ao acaso e as estatísticas da amostragem (erro padrão, intervalo de confiança) recalculadas. O processo de escolha e de cálculo das estatísticas da amostragem foi repetido 50 vezes para cada redução. Caso a redução atingisse o número mínimo de parcelas definido para cada delineamento amostral, sem que o erro atingisse $\pm 5\%$, a simulação era encerrada. O número de parcelas foi definido como 10 parcelas para as amostragens ACS e DA, e em 3 parcelas por estrato na amostragem ACE.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estratificação reduziu o erro amostral em mais de 2 pontos percentuais. Enquanto que o erro via amostragem casual simples apresentou erro amostral de $\pm 4,8\%$, a estratificação por um nível (material genético) apresentou um erro amostral de $\pm 3,4\%$, que pôde ser reduzido para $\pm 2,0\%$ quando a amostragem foi implementada em dois níveis (material genético e UP). Essa melhoria era esperada, uma vez que a estratificação promove a homogeneidade das sub amostras e reduz a variância global (Tabela 3).

Tabela 3. Resumo das estatísticas dos delineamentos amostrais.

Table 3. Summary of the statistics of the sampling designs.

Amostragem	VTCC (m³/ha)	Variância da média (m³/ha)	Erro Padrão (m³/ha)	Intervalo de Confiança(m³/ha)	Erro amostral (%)
ACS	331,6	89,7	$\pm 9,5$	$\pm 16,0$	$\pm 4,8$
ACE I	335,5	45,3	$\pm 6,7$	$\pm 11,4$	$\pm 3,4$
ACE II	333,3	27,0	$\pm 5,2$	$\pm 8,8$	$\pm 2,0$
DA I	319,8	14,5	$\pm 3,8$	$\pm 6,4$	$\pm 2,0$
DA II	328,3	12,8	$\pm 3,6$	$\pm 6,0$	$\pm 2,0$

A dupla amostragem atingiu um erro amostral ainda menor, chegando a $\pm 2,0\%$ utilizando uma regressão simples como estimador (DA I) e utilizando a regressão múltipla como estimador (DA II). A regressão linear simples (Equação 7) apresentou coeficientes significativos (Tabela 3) e coeficiente de determinação ajustado (R^2_{adj}) de 83,7 % e erro padrão dos resíduos de 23,3 (m³/ha). A análise de resíduos pode ser visualizada na Figura 4.

Tabela 4. Resumo estatístico da regressão linear simples.

Table 4. Statistical summary of the simple linear regression.

	Estimado	Erro Padrão	Valor de t	P-Valor
Intercepto	-335,37	49,04	-6,84	6,18E-08
P90	24,25	1,78	13,64	1,42E-15

Obs.: *** significativo a 0,001%.


A regressão linear múltipla usada na DA II (Equação 8) composta por uma métrica de altura (P90) e uma de densidade (ARMFR) apresentou valores significativos (Tabela 5), coeficiente de determinação ajustado (R^2_{adj}) de 85,3 % e erro padrão dos resíduos de 22,15 (m^3/ha). A análise deve ser visualizada na Figura 2.

Tabela 5. Resumo estatístico da regressão linear múltipla.

Table 5. Statistical summary of the multiple linear regression.

	Estimado	Erro Padrão	Valor de t	P-Valor
Intercepto	-435,34	65,56	-6,64	1,28E-07
P90	24,37	1,69	14,41	4,88E-16
ARMFR	1,59	0,73	2,17	0,0371

Obs.: *** significativo a 0,001% e * significativo a 0,05%



A utilização da alta correlação entre as métricas LiDAR (P90 e ARMFR) e os parâmetros populacionais do povoamento possibilitou um meio de dupla amostragem mais precisa da variável de interesse (volume). A redução do erro amostral por meio de DA pode reduzir custos. Menores intensidades amostrais podem manter o erro amostral dentro de intervalos satisfatórios. Stephens et al. (2011) também obteve resultados satisfatórios ao aplicar a dupla amostragem utilizando métricas LiDAR como primeira fase para estimar o estoque de carbono nas florestas da N. A regressão linear simples utilizada vinculando a primeira e a segunda fase da dupla amostragem obteve um coeficiente de correlação melhorando em 6% a estimativa anterior do estoque de carbono. Utilizando dados de biomassa de uma floresta simulada, Næsset et al. (2008) obtiveram uma redução do erro padrão de $\pm 2,8 \text{ Mg ha}^{-1}$, considerando a amostragem casual simples, para $\pm 1,0 \text{ Mg ha}^{-1}$ na dupla amostragem utilizando

Na simulação desenvolvida para verificar a intensidade amostral para um erro aceitável de $\pm 5\%$, a dupla amostragem permitiu uma redução no número de parcelas em relação à amostragem casual simples. Para um erro aceitável de $\pm 5\%$, são necessárias 35 parcelas seguindo a ACE I. Na ACE II e na DA, a intensidade amostral atingiu o limite mínimo de parcelas proposto anteriormente sem que o erro atingisse o limite amostral da ACE II ficou em $\pm 3,5\%$ (18 parcelas – 3 por extrato) e o erro amostral da DA I e da DA II ficaram em $\pm 3,8\%$ (10 parcelas) e $\pm 3,4\%$ respectivamente.

Tabela 6. Tamanho amostral dos delineamentos amostrais para o erro máximo de $\pm 5\%$.

Table 6. Sample size of sampling designs for a maximum error of $\pm 5\%$.

Amostragem	Número de Parcelas	Erro Amostral (%)
ACS	35	$\pm 5,0$
ACE I	17	$\pm 4,8$
ACE II	18	$\pm 3,5$
DA I	10	$\pm 3,8$
DA II	10	$\pm 3,4$

CONCLUSÕES

A alta correlação existente entre o volume e as métricas LiDAR permitiu uma considerável melhora das estimativas de volume no inventário através da aplicação da dupla amostragem. Seu uso permite inclusive uma redução do número de parcelas medidas em campo para um nível amostral tolerável.

Com a popularização e redução dos custos associados aos levantamentos laser aerotransportados, o uso desta tecnologia pode trazer consideráveis benefícios de exatidão e de redução de custos. Especialmente para inventários de grandes áreas, inclusive considerando florestas localizadas em locais cujo trabalho de campo ocorre em condições extenuantes. Dessa forma, os inventários nacionais também podem se beneficiar da abordagem de dupla amostragem com primeira fase baseada em métricas LiDAR.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é parte do programa de pesquisa desenvolvido pelo GET-LiDAR (Grupo de Estudos em Tecnologia LiDAR) do Departamento de Florestais, ESALQ/USP. Agradecemos o apoio da Suzano Papel e Celulose por viabilizar o levantamento laser aerotransportado e pela coleta de dados em campo. Agradecemos também à CAPES pelas bolsas de mestrado e doutorado concedidas aos pesquisadores envolvidos neste projeto. Aos revisores anônimos pelas valiosas contribuições.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDERSEN, H. E.; BREIDENBACH, J. Statistical properties of mean stand biomass estimators in a Lidar-based double sampling forest survey. *ISPRS WORKSHOP ON LASER SCANNING 2007 AND SILVILASER 2007*, 36, 2007, Espoo. **Anais...** Espoo: ISPRS, 2007. p. 8-13.
- CAMPOS, J. C. C.; RIBEIRO, J. O.; PAULA NETO, F. **Inventário florestal nacional: reflorestamento Minas Gerais**. Brasília: IBDF, 1984. 126 p.
- CESARO, A.; ENGEL, O. A.; FINGER, C. A. G.; SCHNEIDER, P. R. Comparação dos métodos de amostragem de área fixa, relascopia, e quanto a eficiência, no inventário florestal de um povoamento de *Pinus sp.* **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 4, n. 1, p. 97-108, jun. 1994.
- GAVA, J. L. Efeito da adubação potássica em plantios de *E. grandis* conduzidos em segunda rotação em solos com diferentes teores de potássio. **Série Técnica IPEF**, Piracicaba, n. 30, p. 89-94, 1997.
- GIONGO, M.; KOEHLER, H. S.; MACHADO, S. A.; KIRCHNER, F. F.; MARCHETTI, M. LiDAR: princípios e aplicações florestais. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, v. 30, n. 63, p. 231-244, ago./out. 2010.
- MALTAMO, M.; MUSTONEN, K.; HYYPPÄ, J.; PITKÄNEN, J.; YU, X. The accuracy of estimating individual tree variables with airborne laser scanning in a boreal nature reserve. **Canadian Journal of Forest Research**, Ottawa, v. 34, n. 9, p. 1791-1801, 2004.
- NÆSSET, E.; GOBAKKEN, T.; BOLLANDSÅS, O. M.; GREGOIRE, T. G.; NELSON, R. STÅHL, G. Comparison of precision of biomass estimation from field sample surveys and airborne LiDAR-assisted surveys in Hedmark County, Norway. **Remote Sensing of Environment**, New York, v. 117, p. 117-128, mar. 2013.
- PÉLLICO NETTO, S.; BRENA, D. A. **Inventário Florestal**. Curitiba: Editado pelos autores, 1997. 316 p.
- SCHUMACHER, F. X.; HALL, F. S. Logarithmic expression of timber-tree volume. **Journal of Agricultural Research**, Washington, v. 47, p. 1-19, 1933.
- SHIVER, B. D.; BORDERS, B. E. **Sampling techniques for forest resource inventory**. New York: John Wiley & Sons, 1996, 356 p.
- SILVA, A. G. P.; GÖRGENS, E. B.; CAMPOE, O. C.; ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; RODRIGUEZ, L. C. E. Assessing biomass based on LiDAR profiles using airborne laser scanning data in eucalypt plantations. **Scientia Agricola**, v. 72, n. 6, p. 504-512, 2015.
- STEPHENS, P. R.; KIMBERLEY, M. O.; BEETS, P. N.; PAUL, T. S. H.; SEARLES, N.; BELL, A.; BRACK, C.; BROADLEY, J. Airborne laser scanning double sampling forest carbon inventory. **Remote Sensing of Environment**, New York, v. 117, p. 348-357, 2012.
- VAN DEUSEN, P. C.; PRISLEY, S. P.; LUCIER, A. A. Adopting an annual inventory system: user perspectives. **Journal of Forestry**, Bethesda, v. 97, p. 11-14, 1999.
- ZONETE, M. F. Estimação de parâmetros biométricos de plantios clonais de eucalipto no sul da Bahia: uma aplicação da tecnologia laser a inventário florestal. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 38, n. 86, p. 225-235, 2010. Disponível em: < <http://ipef.br/publicacoes/scientia/nr86/cap10.pdf> >. Acesso em: 10/05/2014.