
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Hình bên mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (đơn vị trên mỗi trục là mét), giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới, hãy xác định tọa độ của B.



A. $(6,1;6,7;1,55)$ **B.** $(6,7;6,1;1,55)$


C. $(6,1;0\,1,55)$ **D.** $(0;6,7;1,55)$

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với điểm A), tọa độ điểm B' là



A. $B(0;2;0)$ **B.** $B(2;2;2)$ **C.** $B(2;2;0)$ **D.** $B(2;0;2)$


Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với điểm A), tọa độ điểm C' là



A. $C'(2;2;0)$ **B.** $C'(2;2;2)$ **C.** $C'(2;0;0)$ **D.** $C'(2;0;2)$

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a\sqrt{2}$, cạnh bên bằng $a\sqrt{5}$. Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với tâm hình vuông $ABCD$), tọa độ $\overrightarrow{SC}$ là:


GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn



A. $\overrightarrow{SC}=(2a;0;-2a)$ **B.** $\overrightarrow{SC}=(2a;-a;-2a)$


C. $\overrightarrow{SC}=(a;0;-2a)$ **D.** $\overrightarrow{SC}=(a;0;2a)$

Câu 5: Cho tứ diện $SABC$ có ABC là tam giác vuông tại B, $BC=3$, $BA=2$, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có độ dài bằng 2. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ O trùng với điểm B). Tìm khẳng định **sai**



A. $A(0;2;0)$ **B.** $B(0;0;0)$ **C.** $C(0;0;3)$ **D.** $S(-2;2;2)$

Câu 6: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình bên. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy). Cho biết $OM=50$, $(\vec{i};\overrightarrow{OH})=64°$, $(\overrightarrow{OH},\overrightarrow{OM})=48°$. Tìm toạ độ của điểm M.



A. $M(37,2;14,7;30,1)$ **B.** $M(14,7;37,2;30,1)$

C. $M(30,1;14,7;37,2)$ **D.** $M(14,7;30,1;37,2)$

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn