Table 6. Comparison of the cluster solution with an effort median split

Variable	Extended (n=41)	Brief (n=32)	High effort (n=36)	Low effort (n=37)	Cluster d [95% CI]	Median split d [95% CI]	Adjusted cluster effect controlling effort	95% CI for adjusted b
Composite effort	487.46 ± 86.22	156.75 ± 84.77	508.00 ± 69.66	181.46 ± 101.43	3.86 [3.07, 4.64]	3.74 [2.97, 4.51]	N/A	N/A
Meaningful comment density	0.05 ± 0.04	0.09 ± 0.07	0.05 ± 0.03	0.08 ± 0.07	-0.58 [-1.05, -0.10]	-0.59 [-1.06, -0.12]	b = 0.033, p = 0.247	[-0.023, 0.089]
Round 1 start	1271.34 ± 685.46	596.57 ± 552.52	1304.44 ± 696.00	655.56 ± 572.60	1.07 [0.57, 1.56]	1.02 [0.53, 1.50]	b = 351.035, p = 0.283	[-296.628, 998.699]
Round 2 retention	0.92 ± 0.22	0.67 ± 0.68	0.94 ± 0.19	0.69 ± 0.64	0.52 [0.05, 0.99]	0.52 [0.05, 0.99]	b = 0.146, p = 0.556	[-0.347, 0.638]
Mean assignment score (six columns)	88.74 ± 9.18	69.85 ± 19.79	89.02 ± 9.25	72.14 ± 19.53	1.28 [0.77, 1.78]	1.10 [0.60, 1.59]	b = 15.000, p = 0.054	[-0.275, 30.274]

Mean ± sample SD. Adjusted effects: OLS with raw continuous effort and cluster indicator; two-sided p.
Score averages HW1 and HW3–HW7. See accompanying methods and seven-column sensitivity.