

# 1 行列式

## 1.1 行列式定义

$$\text{二阶行列式} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\text{三阶行列式} \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - fha - ibd$$

### 逆序数

在一个排列中，如果一对数的前后位置与大小顺序相反，即前面的数大于后面的数，那么它们就称为一个逆序。一个排列中逆序的总数就称为这个排列的逆序数。记为  $\tau(i_1, i_2, \dots, i_n)$

例：求  $\tau(32514)$

3 后面比它小的数有 2 个

2 后面比它小的数有 1 个

5 后面比它小的数有 2 个

1 后面比它小的数有 0 个

4 后面比它小的数有 0 个

即  $\tau(32514) = 2 + 1 + 2 + 0 + 0 = 5$

## 1.2 行列式的性质

1、行列互换，行列式的值不变

2、两行（列）互换，行列式的值变号

推论：两行（列）相同，行列式的值为 0

3、可以把某行（列）的公因子  $k$  提到行列式的外面

推论：某行（列）为 0，行列式的值为 0

推论：某两行（列）的元素对应成比例，行列式的值为 0

$$4、\begin{vmatrix} a_{11}+b & a_{12}+c & a_{13}+d \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & c & d \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

5、某行（列）的  $k$  倍加到另外一行（列）上，行列式的值不变

## 1.3 行列式按行（列）展开

### 余子式

余子式  $M_{ij}$  为去掉第  $i$  行和第  $j$  列后，剩下的元素组成的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ 的一个余子式 } M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

代数余子式  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$