

INSTITUIÇÃO PROZ EDUCAÇÃO

PROF: DAENY

ALUNO: PABLO HENRIQUE ALVES DOS PASSOS PEREIRA

ATIVIDADE 1

07: 00 h: Assumo plantão com paciente em decúbito dorsal, consciente , responsivo ao chamado verbal , corado, acianótico, anictérico, eupneico, em ar ambiente, dependente para as atividades de vida diária (AVD).Paciente identificado por pulseira de identificação íntegra e legível. Pupilas isocóricas e fotorreagentes (quando avaliadas), mucosas hidratadas . Pele íntegra, exceto por lesão por pressão (LPP) em região sacral previamente classificada como estágio III, com curativo íntegro. Edema bilateral em membros inferiores (++) , sem alterações em relação ao plantão anterior. Mantendo dieta enteral por sonda nasoenteral (SNE) a 40 mL/h, cabeceira elevada entre 30 e 45 , SNE pervia, fixação íntegra e marcação externa preservada , sem sinais aparentes de deslocamento. Abdome plano, flácido, sem distensão aparente. Em uso de fralda, eliminações vesicais e intestinais presentes. Sem queixas álgicas ou outras intercorrências no momento. Segue sob cuidados de enfermagem.

ATIVIDADE 2

08:00h: Paciente foi orientado por prescrição médicas o uso devido dos medicamentos, logo em seguida, orientado banho de leito na cama.

10:00h: Administrado a medicação de losartana com prescrição médica de 25 mg por via oral, essa dosagem de 1 vez ao dia, com ajustes a cada 1 ou 2 semanas até obter o controle da pressão. Essa dosagem em pacientes diuréticos, em decúbito dorsal, consciente, responsivo ao chamado verbal e eupneico. Então, paciente com edema no membro inferior, e uso de nasoenteral, cabeceira elevada - sob cuidados da enfermagem.