

# Звуковые колебания

*Верецагин Антон Сергеевич*

канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель

Кафедра аэрофизики и газовой динамики ФФ НГУ

11 марта 2019 г.

# Аннотация

# Основные уравнения динамики идеального газа

## Уравнения сохранения для идеального газа

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \rho + \rho \operatorname{div} \vec{v} = 0,$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p,$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) S = 0.$$

## Замыкающие соотношения

$$p = p(\rho, S).$$

# Звуковые волны

## Определение

Колебательное движение с малыми амплитудами в сжимаемом газе называют **звуковыми волнами**.

# Звуковые волны

## Определение

Колебательное движение с малыми амплитудами в сжимаемом газе называют **звуковыми волнами**.

## Замечание

При рассмотрении звуковых колебаний будет считать течение **изоэнтропическим** ( $S = \text{const}$ ), тогда из общей системы уравнений остаются только уравнение неразрывности и уравнение Эйлера, а в замыкающем соотношении пропадает зависимость от  $S$ , как функции от координаты и времени.

# Звуковые волны

## Определение

Колебательное движение с малыми амплитудами в сжимаемом газе называют **звуковыми волнами**.

## Замечание

При рассмотрении звуковых колебаний будет считать течение **изоэнтропическим** ( $S = \text{const}$ ), тогда из общей системы уравнений остаются только уравнение неразрывности и уравнение Эйлера, а в замыкающем соотношении пропадает зависимость от  $S$ , как функции от координаты и времени.



# Скорость звука

Уравнения сохранения для идеального газа

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0, \quad \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \left( \frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s \nabla \rho,$$

$$p = p(\rho).$$

# Скорость звука

## Уравнения сохранения для идеального газа

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0, \quad \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \left( \frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_S \nabla \rho,$$

$$p = p(\rho).$$

## Определение

Величина  $c > 0$ , определяемая соотношением

$$c^2 = \left( \frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_S,$$

называется **скоростью звука**.

Как видно из определения  $c = c(\rho, S)$ . Для изоэнтропических течений зависимостью от  $S$  как от функции переменных пространства и времени можно пренебречь.



# Линеаризация уравнений движения

## Замена переменных

Рассмотрим малые колебания газа в окрестности постоянного решения  $\vec{v} = 0, p = p_0, \rho = \rho_0$ :

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \vec{v}', \\ c &= c_0 + c', \\ \rho &= \rho_0 + \rho'.$$

# Линеаризация уравнений движения

## Замена переменных

Рассмотрим малые колебания газа в окрестности постоянного решения  $\vec{v} = 0, p = p_0, \rho = \rho_0$ :

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \vec{v}', \\ c &= c_0 + c', \\ \rho &= \rho_0 + \rho'.$$

## Уравнения движения

$$\begin{aligned}\frac{\partial(\rho_0 + \rho')}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho_0 + \rho')\vec{v}' &= 0, \\ \frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} + (\vec{v}' \cdot \nabla)\vec{v}' &= -\frac{1}{\rho_0 + \rho'}(c_0 + c')^2 \nabla(\rho_0 + \rho').\end{aligned}$$

# Уравнения звуковых колебаний

## Основные уравнения

Считая колебания малыми, отбрасываем все слагаемые, имеющие порядок малости два и выше, получим

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div} \vec{v}' = 0, \quad \frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} + \frac{c_0^2}{\rho_0} \nabla \rho' = 0.$$

# Уравнения звуковых колебаний

## Основные уравнения

Считая колебания малыми, отбрасываем все слагаемые, имеющие порядок малости два и выше, получим

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div} \vec{v}' = 0, \quad \frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} + \frac{c_0^2}{\rho_0} \nabla \rho' = 0.$$

## Потенциальное течение и волновое уравнение

Если  $\vec{v}' = \nabla \varphi$ , тогда

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \Delta \varphi = 0, \quad \frac{\partial}{\partial t} \nabla \varphi + \frac{c_0^2}{\rho_0} \nabla \rho' = 0.$$

$\Downarrow$

$$\frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = \Delta \varphi.$$

# Решение волнового уравнения с плоскими волнами

## Одномерное плоское течение


Если  $\varphi = \varphi(t, x)$ , тогда решением полученного волнового уравнения будет

$$\varphi(t, x) = f_1(x - c_0 t) + f_2(x + c_0 t) = f_1(\xi) + f_2(\eta),$$

где  $f_1(\xi), f_2(\eta)$  – произвольные дважды дифференцируемые функции своих аргументов

$$\xi = x - c_0 t, \quad \eta = x + c_0 t.$$

# Прогрессивные волны



Решение  $\varphi(t, x)$  представляет собой сумму перемещающихся поступательно вправо и влево волн неизменного вида с скоростью  $c_0$ .



# Литература

•