

Бином Ньютона. Последовательность.

1. Вычислить значение суммы

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

2. Найти слагаемое, получающееся при разложении

$$\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{16}$$

и содержащее x^3 .

3. Доказать равенство

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$$

алгебраически и комбинаторно. Используя этот результат вычислить значение суммы

$$\sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{k+1}.$$

4. Найти коэффициент слагаемого многочлена
- $(1+x^2-x^3)^9$
- при
- x^8
- .

5. Привести пример последовательности
- $\{x_n\}$
- , удовлетворяющей условию:

- а) $\exists N \forall n > N : x_n < x_N$;
 б) $\exists N \forall n > N \forall m > n : x_n < x_m$.

6. Показать, что последовательность
- a_n
- ограничена (мы определяли ограниченность как:
- $\exists C > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| < C$
-) тогда и только тогда, когда она ограничена сверху и снизу.

7. Доказать ограниченность последовательности
- $a_n = \frac{2n^2-1}{2+n^2}$
- .

8. Доказать неограниченность последовательности
- $b_n = n^2 - n$
- .

9. * Доказать ограниченность последовательности
- $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
- .

1. Вычислить значение суммы

$$a) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}, \quad b) \sum_{k=1}^n \sin kx, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Указание: в пункт б) нужно домножить сумму на $2 \sin \frac{x}{2}$, если он не ноль.

2. Найти коэффициент многочлена
- $(1+2x-3x^2)^4$
- при
- x^3
- и
- x^4
- .

3. Привести пример последовательности
- $\{x_n\}$
- , удовлетворяющей условию:

- а) $\forall m \exists n : x_m \neq x_n$;
 б) $\exists N_1 \forall n > N_1 : x_{N_1} > x_n$ и $\exists N_2 \forall n > N_2 : x_{N_2} < x_n$;
 в) $\forall n \exists m > n \exists k > n : x_m < x_n < x_k$.

4. Доказать, что если
- $\{x_n\}$
- и
- $\{y_n\}$
- ограниченные последовательности и
- $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- некоторые числа, то
- $\{\alpha x_n + \beta y_n\}$
- ограниченная последовательность.

5. Доказать ограниченность последовательности

$$a) \quad a_n = \frac{n^2 + 4n + 8}{(n+1)^2}, \quad b) \quad a_n = \sqrt{n-1} - \sqrt{n+1}.$$

6. Доказать неограниченность последовательности

$$a) \quad a_n = \frac{n^3}{n^2+1}, \quad b) \quad a_n = \sqrt{n^2 + (-1)^n \cdot \sqrt{n^3}} - n.$$

Задачи для самостоятельного решения

1. Найти коэффициент многочлена

а) $(1 - x + x^2)^3$ при x^3 ;

б) $(1 + x^2 + x^3)^7$ при x^{11} .

2. Найти члены разложения, являющиеся целыми числами

а) $(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3})^5$, б) $(\sqrt{5} - \sqrt{2})^8$.

3. Доказать ограниченность последовательности

а) $a_n = \frac{1 - n}{\sqrt{n^2 + 1}}$, б) $a_n = \frac{5n^6 + 6}{(n^4 + 1)(n^2 - 1)}$,

с) $a_n = n(\sqrt{n^4 + n} - \sqrt{n^4 - n})$.

4. Доказать неограниченность последовательности

а) $a_n = \frac{1 - n}{\sqrt{n}}$, б) $a_n = \frac{n - n^4}{(n + 2)^3}$,

с) $a_n = \sqrt{n^4 + n^3 + 1} - \sqrt{n^4 - n^3 + 1}$.