



מבזק חם - העלאת מודעות למכת חום "קלאסית"

לצד העלייה בתדירות ובעוצמת גלי החום, לאחרונה חלה מגמת עלייה במקרי פגיעת חום "קלאסית" בצה"ל. בחודש האחרון 3 חיילים עם מחלה ויראלית כגורם סיכון לקו בפגיעת חום, אף שאלו לא ביצעו מאמץ גופני משמעותי.

מכת חום מוגדרת כמצב שבו טמפרטורת ליבת הגוף עולה לרמה מסוכנת אשר מובילה לפגיעה רב-מערכתית ואף עלולה להסתיים במוות. את מכת החום מסווגים לשתי קבוצות: מכת חום "קלאסית" ומכת חום ממאמץ.

מכת חום "קלאסית"

נגרמת מחשיפה לטמפרטורת סביבה גבוהה, שכיחה בעתות של עומס חום הנמשכות כמה ימים. מכת חום או פגיעת חום קלאסית נפוצות בעיקר בקרב ילדים או קשישים, אך עשויות להופיע גם בחיילים עם מחלת רקע כגורם סיכון המבצעים פעילות, גם אם קלה, או שהייה ממושכת בתנאי עומס חום.

מכת חום ממאמץ

נגרמת ממאמץ גופני, בדרך כלל בתנאי עומס חום אך לא בהכרח. הגורם להתפתחות מכת חום במצב זה הוא קצב צבירת חום הגוף, כתוצאה מהמאמץ, מעבר ליכולתו של הגוף להפיג אותו לסביבה (ייצור החום עולה על קצב פיזורו). מכת/פגיעת חום ממאמץ הן הנפוצות בקרב חיילים וספורטאים.



א.ב בן 20

במהלך הליכה בבסיס, בעומס חום 3, הציג תסמיני פגיעת חום נמדד חום 39.6 מ"צ PR



א.ג בן 20

במהלך הליכה מנהלתית (ללא ציוד) בעומס חום 2, הציג תסמינים של אבדן שיווי משקל ובלבול



א.ב בן 18

התמוטט בשמירה בעומס חום 4 נמדד חום 38.5 מ"צ PR

אז מה עושים?

שהייה במקומות ממוזגים או מוצלים ככל הניתן ושתייה נכונה ומותאמת לפעילות ולעומס החום

הימנעות משהיית חיילים חולים בשמש או בעומס חום גבוה

מניעת חיילים החשודים כחולים מלבצע מאמץ גופני או משימות אחרות גם אם "קלות"

בימים בהם שורר גל חום, במקרה של חייל המראה סימני "חייל כושל", יש לחשוד במכת חום, גם ללא עדות לביצוע מאמץ גופני משמעותי. יש למדוד חום PR, לקרר ולהפנות לגורם רפואי בהקדם האפשרי.