



יולי 2024

בלמ"ס

מפקדת קצין הרפואה הראשי
ענף פיזיולוגיה צבאית וחדשנות

מבזק למידה קיץ 2024 - מכת חום

בחודש האחרון התרחשו מספר גבוה של פגיעות חום, מתוכן מספר מקרי מכת חום קשה. עם ההכבדה בעומסי החום ועלייה בתדירות הופעת גלי חום, הסיכון למכת חום עולה. נזכיר כי **מכת חום מסכנת את בריאותו של החייל ועלולה לגרום לנכות ואף למוות**. לפניכם עיקרי לקחים מתוך צבר המקרים האחרון.

1 אי זיהוי חייל כושל - חריגה חוזרת

נחשוד במכת חום בחייל המראה סימני תשישות ניכרים ביחס למצופה או ביחס לשאר המשתתפים בפעילות: חש ברע, נסחב מאחור, התנהגות אגרסיבית, מבולבל, חוסר שיווי משקל. הסימנים למכת חום שונים ולעיתים **קשים לזיהוי בעיקר בחייל בעל מוטיבציה גבוהה**. מסיבה זו יש לשמור על סף חשד נמוך, לחדול את החייל מלהמשיך לבצע את הפעילות, לקרר, למדוד חום גוף (PR), ולטפל בהתאם.




2

עצירת הפעילות - בכל מקרה של פגיעת חום יש לעצור את הפעילות ולבצע "הערכת מצב" למסגרת. **המטרה היא למנוע אירועים נוספים**, ועל כן יש לוודא **מידת עומס חום ופעילות מותרת לפיו, לאתר חיילים כושלים באופן אקטיבי** ולאפשר הפסקה ושתייה של הכח. חידוש פעילות מותנה באישור משותף של **גורם רפואי ופיקודי** ע"פ הפקודות. אין לחדש פעילות לפני קבלת אישור שני הגורמים.



3

מחלה חריפה - בתקופה האחרונה אנו עדים לעלייה במקרי פגיעות חום בחיילים על רקע של מחלה. **שימו לב - פגיעות החום התרחשו לא רק באימון אלא גם בעבודות מנהלה, הליכה ללא ציוד, שמירה ומאמצים שלעיתים נתפסים כ"קלים"**. חיילים שאינם חשים בטוב ו/או המציגים תסמינים של מחלת חום, שלשולים והקאות נמצאים בסיכון מוגבר ואין לאפשר להם להשתתף בפעילות.



4

קצב קירור - קצב הקירור של נפגע חום באמצעות שפיכת מים הוא כמעלה אחת בעשר דקות. לפיכך, במכת חום בה נמדדת טמפ' גוף של 40 מ"צ ומעלה, קירור עד לטמפ' המאפשרת פינוי (38.5 מ"צ) **עשוי להימשך 20-30 דקות ואף מעלה מכך**. הקירור היעיל ביותר הוא באמצעות מי-קרח ולכן **היכן שניתן יש להעריך עם אמצעים לטבילת הנפגע במים וקרח או שפיכת מי-קרח**.



מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה!

רס"ן איתי קטקו
רע"ן פיזיולוגיה וחדשנות

סרן ד"ר זיו תלמי יעקב
רופא ענף פיזיולוגיה