

消化管の解剖

腹部食道と接合部

- 裂孔を通りT11付近で胃へ入る
- 回旋後に左迷走神経は前、右は後
- 明瞭な輪のない接合部の支持
 - 平滑筋緊張、横隔膜脚、His角
 - 横膈食道膜、腹圧
- 滑脱型は接合部が上昇
- 傍食道型は固定接合部の横を胃が脱出
- 静脈は左胃静脈と奇静脈へ
 - 門脈体循環交通
- リンパは縦隔と左胃節へ
 - 腫瘍の縦方向進展

胃

- 噴門、胃底、胃体、幽門部
- 形は充満、姿勢、体格で変わる
- 網嚢後方の胃床
 - 脾、脾、左腎、副腎
 - 後壁潰瘍は脾・脾血管へ及び得る
- 両弯に沿う豊富な動脈吻合
 - 短胃枝が胃底を供給
- リンパは動脈に沿い腹腔節へ
- 迷走神経は運動・分泌を促す
- 交感線維は大内臓神経と腹腔神経叢
- 内臓痛は心窩部へ関連

十二指腸

- 脾頭を囲む四部
- 近位は腹腔内、残りは二次性後腹膜
- 上部潰瘍は胃十二指腸動脈を侵食
- 下行部の大十二指腸乳頭
 - 総胆管と主膵管が開口
 - 小乳頭には副膵管
- 第三部は上腸間膜動脈と大動脈の間
 - 圧迫で閉塞し得る
- 脾十二指腸動脈弓が前腸・中腸境界

直腸と肛門管

- 直腸はS3付近で始まる
- 腹膜被覆は三分の一ごとに減る
- 上直腸静脈は門脈系へ
- 中・下直腸静脈は体循環へ
 - 門脈・体循環交通
- 歯状線は発生学的境界
 - 上方は円柱上皮、内臓性、内腸骨リンパ
 - 下方は扁平上皮、体性、浅鼠径節

空腸と回腸

- 空腸は上左側、回腸は右下方・骨盤
- 空腸は壁が厚く直動脈が長い
- 回腸は動脈弓と腸間膜脂肪が多い
- 腸間膜縁に血管が入る
- 虚血の分布は原因で異なる
 - 塞栓、血栓、低流量、静脈、絞扼
- 乳び管がキロミクロンをリンパへ
 - 長鎖脂質は門脈輸送を迂回
- 終末回腸はリンパ小節が豊富
- 回盲弁は逆流を不完全に制限
- 可動性が捻転・内ヘルニアを許す

盲腸、虫垂、結腸

- 虫垂は三本の結腸ヒモ合流部
 - 位置が変わり症状と診察を変える
- 虫垂動脈は終動脈
- 上行・下行結腸は後腹膜
- 横行・S状結腸は腸間膜上で可動
- 結腸ヒモ、膨起、腹膜垂で同定
- 上腸間膜動脈は盲腸から横行近位
- 下腸間膜動脈は横行遠位から上部直腸
- 辺縁動脈とRiolan弓が系を接続
 - 脾彎曲と直腸S状移行部の分水嶺

括約筋と痔核

- 内肛門括約筋は平滑筋で不随意緊張
- 外括約筋は骨格筋で三部
- 恥骨直腸筋の吊り輪が直腸肛門角を保つ
 - 弛緩と骨盤底下降が排便を許す
- 痔核クッションは禁制に寄与
- 内痔核は疼痛感受性が低い
- 線下の外痔核血栓は痛む

腸管内・外来神経支配

- 筋層間神経叢は運動を調整
- 粘膜下神経叢は分泌と局所血流
- 迷走神経は前腸・中腸へ
- S2からS4の骨盤内臓神経は後腸へ
- 交感神経は運動を減らし血管収縮
- 疼痛求心線維は交感神経と走る
- 歯状線下は陰部神経体性路