

Liver Human+Monkey
Liver Human+Mouse
Liver Human+Zebrafish
Liver 4 species
Testis Human+Macaque
Testis Human+Mouse
Testis 3 species
Bone marrow 3 species
Kidney Human+Mouse
Islet Human+Mouse
Eye Human+Mouse
Eye Human+M. mulatta
Eye Human+M. fascicularis
Eye Human+Pig
Eye primates
Eye 5 species
Cortex M1 Human+Mouse
Cortex M1 3 species
Cortex DLPFC 4 primates
Cortex DLPFC Human+Chimpanzee
Cortex DLPFC Human+Macaque
Cortex DLPFC Human+Marmoset
Cortex DLPFC Human+Macaque, own ortholog table
Lung 3 species
Skeletal muscle Human+Mouse
Lung-tumor myeloid Human+Mouse
0.0
0.2
0.4
0.6
ρ with the mean of the 15 nearest ESM-2 neighbors
(given expression, detection, π, τ, detection gap)
Δα, protein-feature gate
Δα, per-gene gate
Δα, protein-feature gate, against the neighbors'
Δα, per-gene gate, given the gene's own
random neighbors, 97.5th percentile
(Δα, per-gene gate)
(c)
+0.31
−0.29
−0.29
+0.25
+0.28
+0.26
−0.33
−0.38
−0.44
−0.56
−0.46
−0.34
−0.44
+0.35
−0.48
−0.37
−0.38
−0.26
−0.40
−0.44
−0.43
−0.41
−0.45
−0.48
−0.30
−0.35
0.12
0.49
0.49
0.46
0.42
0.49
0.44
0.21
0.44
0.41
0.16
0.25
0.25
0.19
0.35
0.33
0.23
0.21
0.30
0.35
0.31
0.29
0.35
0.35
0.24
0.41
expression level
detection
|S_θ|, protein-feature gate
|S_θ|, per-gene gate
protein identity π
cell-type specificity τ
detection gap
joint R²
0.6
0.3
0.0
−0.3
−0.6
partial ρ (difference, covariate)
(d)