
§L.3 pooled |GIN attention| across 70 genes, 36832 residues · brackets = Mann-Whitney U · * p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001
A. Secondary structure (Ramachandran, 3-state)
Kruskal-Wallis p = 0.003
ns (p=0.852)
** (p=0.002)
** (p=0.002)
|REAL GIN attention|
Helix (n=16167)
Sheet (n=14470)
Coil (n=6195)
B. Solvent accessibility (relative SASA)
Kruskal-Wallis p = 1.2e-47
ns (p=0.474)
*** (p=2.7e-36)
*** (p=2.4e-38)
Buried (<20%) (n=14627)
Intermediate (20–50%) (n=10390)
Exposed (>50%) (n=11815)
C. AlphaFold pLDDT (residue confidence)
Kruskal-Wallis p = 6.1e-67
*** (p=8.2e-09)
ns (p=0.072)
*** (p=8.7e-62)
very low <50 (n=6446)
low 50–70 (n=2484)
high 70–90 (n=6029)
very high >90 (n=21873)
D. Amino-acid chemistry class
Kruskal-Wallis p = 1.6e-29
** (p=0.008)
*** (p=1.2e-12)
*** (p=2.7e-26)
*** (p=6.0e-09)
Hydrophobic (n=15534)
Polar uncharged (n=12215)
Positive (K,R,H) (n=4896)
Negative (D,E) (n=4187)