Mathematik für Anwender II — Blatt 3

Rasmus Diederichsen

Laura Goerke Katharina Filodda Tim Brockmeyer


17. April 2016

Aufgabe 3.1

- **(1)**
- **(2)**
- **(3)**

Aufgabe 3.2

- **(1)**
- **(2)**
- (3)



(4)

Aufgabe 3.3

(1)

Die Bilder der Basisvektoren $\{v_1, v_2, v_3\}$ sind

$$D(p(x) = 1) = (p'(x) = 0) = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + 0\mathbf{v}_3$$

$$D(p(x) = 2) = (p'(x) = 1) = 1\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + 0\mathbf{v}_3$$

$$D(p(x) = 3) = (p'(x) = 2x) = 0\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + 0\mathbf{v}_3$$

Die darstellende Matrix ist also

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2)

Der Kern von D sind alle Polynome, deren Ableitung die Nullfunktion ist, also alle Konstanten Polynome. Der Kern hat Dimension 1, denn $\{p(x) = 1\}$ ist eine Basis.

Aufgabe 3.4

Seien
$$(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = (1, x, x^2) = \mathcal{C}$$

$$\begin{aligned}
\varphi_{\mathscr{C}}(a + bx + cx^2) &= \varphi_{\mathscr{C}}(a(\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3)) + b(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3) + c(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3)) \\
&= \varphi_{\mathscr{C}}(a(-\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_3) + b(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3) + c(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3)) \\
&= \varphi_{\mathscr{C}}(-a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_1 + c\mathbf{v}_1 - a\mathbf{v}_1 + c\mathbf{v}_2 + 2a\mathbf{v}_3 - b\mathbf{v}_3 - c\mathbf{v}_3) \\
&= (-a + b + c, -a + c, 2a - b - c)
\end{aligned}$$

(1)

Indem man die drei Polynome aus \mathscr{B} ableitet und mithilfe der zweiten Zeile in der obigen Definition von $\varphi_{\mathscr{C}}$ nach \mathscr{C} übersetzt, ergibt sich:

$$D(\mathbf{v}_1) = D(p=1) = 0 \quad \Rightarrow a = b = c = 0$$

$$D(\mathbf{v}_2) = D(p=x) = 1 \quad \Rightarrow a = 1, b = c = 0$$

$$D(\mathbf{v}_3) = D(p=x^2) = 2x \Rightarrow a = c = 0, b = 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$