


Le resucrage en cas d'hypoglycémie

Poids de l'enfant aux alentours de 10kg, soit :



½ sucre, soit 2.5g de glucides simples

Equivalences par rapport au ½ sucre :

Aliments	Quantités
 Jus de fruit	25 ml 2 cuillères à soupe rases
 Sirop	3 ml = 1 cuillère à café rase
 Confiture/miel	5g = 1 cuillère à café rase
 Pastille de glucose (pharmacie/internet/Glours®)	½ pastille
 Pâte de fruit	3g

Aliments non judicieux pour un re-sucrage en cas d'hypoglycémie :

 **Le chocolat et dérivés (dont biscuits/gâteaux)** 

Ils ont un index glycémique (I.G.) faible dû à la présence de graisses qui ralentissent l'absorption du sucre. En raison de cette teneur en graisses, évitez d'utiliser le chocolat pour se re-sucrer en cas de malaise hypoglycémique.

 **Les fruits frais (dont compote) et fruits secs** 

Ils ont eux aussi un index glycémique faible du fait de leur teneur en fibres. Ils sont donc, eux aussi, à éviter pour se re-sucrer en cas d'hypoglycémie.


Le resucrage en cas d'hypoglycémie

Poids de l'enfant aux alentours de 20kg, soit :




1 sucre, soit 5g de glucides simples

Equivalences par rapport au 1 sucre :

Aliments	Quantités
 Jus de fruit	50 ml <i>1 tiers d'une brique de 150ml</i>
 Sirop	6 ml
 Confiture/miel	7g
 Pastille de glucose <i>(pharmacie/internet/Glours®)</i>	1 pastille
 Pâte de fruit	6g
 Bonbon Crema®	1 unité

Aliments non judicieux pour un re-sucrage en cas d'hypoglycémie :

 **Le chocolat et dérivés (dont biscuits/gâteaux)** 


Ils ont un index glycémique (I.G.) faible dû à la présence de graisses qui ralentissent l'absorption du sucre. En raison de cette teneur en graisses, évitez d'utiliser le chocolat pour se re-sucrer en cas de malaise hypoglycémique.

 **Les fruits frais (dont compote) et fruits secs** 

Ils ont eux aussi un index glycémique faible du fait de leur teneur en fibres. Ils sont donc, eux aussi, à éviter pour se re-sucrer en cas d'hypoglycémie.



Le resucrage en cas d'hypoglycémie

Poids de l'enfant aux alentours de 30kg, soit :



1.5 sucre, soit 7,5g de glucides simples

Equivalences par rapport au 1.5 sucre :

Aliments	Quantités
 Jus de fruit	75 ml <i>La moitié d'une brique de 150ml</i>
 Sirop	10 ml
 Confiture/miel	10g <i>2 cuillères à café rases</i>
 Pastille de glucose <i>(pharmacie/internet/Glours®)</i>	2 pastilles
 Pâte de fruit	10g
 Bonbon Dragibus Soft® <i>= grand</i>	2 unités
 Fraise Tagada® OU Banan's®	2 unités

Aliments non judicieux pour un re-sucrage en cas d'hypoglycémie :

 **Le chocolat et dérivés (dont biscuits/gâteaux)** 

Ils ont un index glycémique (I.G.) faible dû à la présence de graisses qui ralentissent l'absorption du sucre. En raison de cette teneur en graisses, évitez d'utiliser le chocolat pour se re-sucrer en cas de malaise hypoglycémique.

 **Les fruits frais (dont compote) et fruits secs** 

Ils ont eux aussi un index glycémique faible du fait de leur teneur en fibres. Ils sont donc, eux aussi, à éviter pour se re-sucrer en cas d'hypoglycémie.


Le resucrage en cas d'hypoglycémie

Poids de l'enfant aux alentours de 40kg, soit :




2 sucres, soit 10g de glucides simples

Equivalences par rapport au 2 sucres :

Aliments	Quantités
 Jus de fruit	100 ml <i>2 tiers d'une brique de 150ml</i>
 Fruit shoot®	1 unité de 20cl
 Sirop	12.5 ml
 Confiture/miel	15g <i>Environ 1 cuillère à soupe rase</i>
 Pastille de glucose <i>(pharmacie/internet/Glours®)</i>	2.5 pastilles
 Pâte de fruit	12g
 Bonbon Crema®	2 unités

Aliments non judicieux pour un re-sucrage en cas d'hypoglycémie :

 **Le chocolat et dérivés (dont biscuits/gâteaux)** 


Ils ont un index glycémique (I.G.) faible dû à la présence de graisses qui ralentissent l'absorption du sucre. En raison de cette teneur en graisses, évitez d'utiliser le chocolat pour se re-sucrer en cas de malaise hypoglycémique.

 **Les fruits frais (dont compote) et fruits secs** 

Ils ont eux aussi un index glycémique faible du fait de leur teneur en fibres. Ils sont donc, eux aussi, à éviter pour se re-sucrer en cas d'hypoglycémie.


Le resucrage en cas d'hypoglycémie

Poids de l'enfant aux alentours de 50kg, soit :




2.5 sucres, soit 12,5g de glucides simples

Equivalences par rapport au 2.5 sucres :

Aliments	Quantités
 Jus de fruit	125 ml <i>5/6 d'une brique de 150ml (80%)</i>
 Sirop	18 ml
 Confiture/miel	18g
 Pastille de glucose <i>(pharmacie/internet/Glours®)</i>	3 pastilles
 Pâte de fruit	15g
 Bonbon Schtroumpf®	2 unités

Aliments non judicieux pour un re-sucrage en cas d'hypoglycémie :

 **Le chocolat et dérivés (dont biscuits/gâteaux)** 


Ils ont un index glycémique (I.G.) faible dû à la présence de graisses qui ralentissent l'absorption du sucre. En raison de cette teneur en graisses, évitez d'utiliser le chocolat pour se re-sucrer en cas de malaise hypoglycémique.

 **Les fruits frais (dont compote) et fruits secs** 

Ils ont eux aussi un index glycémique faible du fait de leur teneur en fibres. Ils sont donc, eux aussi, à éviter pour se re-sucrer en cas d'hypoglycémie.



Le resucrage en cas d'hypoglycémie

Poids de l'enfant aux alentours de 60kg, soit :



3 sucres, soit 15g de glucides simples

Equivalences par rapport au 3 sucres :

Aliments	Quantités
 Jus de fruit	150 ml = 15cl
 Coca cola®	1 canette de 15cl
 Sirop	20 ml
 Confiture/miel	20g Environ 1 <i>cuillère à soupe rase</i>
 Pastille de glucose (<i>pharmacie/internet/Glours®</i>)	3 pastilles
 Pâte de fruit	15g
 Bonbon Schtroumpf®	2 unités

Aliments non judicieux pour un re-sucrage en cas d'hypoglycémie :

 **Le chocolat et dérivés (dont biscuits/gâteaux)** 

Ils ont un index glycémique (I.G.) faible dû à la présence de graisses qui ralentissent l'absorption du sucre. En raison de cette teneur en graisses, évitez d'utiliser le chocolat pour se re-sucrer en cas de malaise hypoglycémique.

 **Les fruits frais (dont compote) et fruits secs** 

Ils ont eux aussi un index glycémique faible du fait de leur teneur en fibres. Ils sont donc, eux aussi, à éviter pour se re-sucrer en cas d'hypoglycémie.