

Premiers pas et structures de contrôle

Calcul formel – TP 1 & 2

Toutes les questions peuvent être traitées avec l'aide de Sage,
sauf lorsque l'on vous demande de faire une preuve « à la main » !

1. Nombre de chiffres d'un entier

Le nombre de chiffres d'un entier N strictement positif est l'entier k tel que

$$10^{k-1} \leq N < 10^k.$$

Par exemple, pour $N = 1\,234$, on a $10^3 \leq 1\,234 < 10^4$ et N a bien 4 chiffres.

1. À l'aide du logarithme décimal et de la partie entière, calculer le nombre de chiffres k d'un entier N .

Fonctions utiles : le logarithme décimal $\log(x, 10)$; la fonction partie entière $\text{floor}()$.

2. On considère le développement de l'expression $(x + y + z)^n$.

Par exemple, $n = 4$ est le plus petit entier tel que l'un des coefficients ait au moins 2 chiffres :

$$\begin{aligned}(x + y + z)^4 = & x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4 + 4x^3z + 12x^2yz + 12xy^2z \\ & + 4y^3z + 6x^2z^2 + 12xyz^2 + 6y^2z^2 + 4xz^3 + 4yz^3 + z^4.\end{aligned}$$

Énigme. Trouver le plus petit entier n tel que l'un des coefficients du développement de $(x + y + z)^n$ ait au moins 10 chiffres.

Fonctions utiles : `expand()`, `coefficient()` : par exemple si $P = 3x^2y + 7xy^2 + y^3$ alors `P.coefficient(x*y^2)` renvoie 7.

2. Constante de Champernowne

La constante de Champernowne est un réel dont les décimales sont formées de tous les entiers $1, 2, 3, \dots$ écrits dans cet ordre :

$$C = 0,123456789101112\dots$$

1. On note $C_1 = 0,1$; $C_2 = 0,12$; $C_3 = 0,123$; etc. Définir le nombre C_{99} qui retourne la valeur approchée de C , sous la forme d'un nombre à virgule, prenant en compte les entiers de 1 à 99.

Indications. Construire ce nombre sous la forme d'une somme.

Fonctions utiles : l'affichage numérique d'un décimal `n()` (par exemple `pi.n(digits=50)` affiche 50 décimales de π).

2. On souhaite extraire les décimales de C comprises entre les rangs a et b . Par exemple, les décimales extraites entre les rangs $a = 8$ et $b = 11$ forment l'entier 8910.

Énigme. Quel est le rang a pour lequel le nombre 888 apparaît pour la première fois entre les rangs a et $a + 2$?

Fonctions utiles :

- la partie entière d'un réel `floor()`,
- l'opérateur modulo `%` (par exemple `13%5` renvoie 3).

3. Nombres pseudo-premiers d'Euler

On dit qu'un entier impair p supérieur ou égal à 3 vérifie, pour un entier n fixé, le n -test d'Euler si

$$n^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}.$$

Le petit théorème de Fermat affirme : « si p est un nombre premier supérieur ou égal à 3, alors p vérifie le n -test d'Euler, quelque soit n non divisible par p . »


Dans la suite p est un entier impair supérieur ou égal à 3 quelconque.

1. Écrire une fonction `test_euler(n,p)` qui renvoie Vrai (True) si p vérifie le n -test d'Euler et Faux (False) sinon.
2. Vérifier que 217 vérifie le 5-test d'Euler mais n'est pourtant pas un nombre premier.
3. **Énigme.** Trouver le plus petit entier impair p supérieur ou égal à 3 qui vérifie toutes les conditions suivantes :
 - p vérifie le 2-test d'Euler,
 - p vérifie le 3-test d'Euler,
 - p vérifie le 5-test d'Euler,
 - et pourtant p n'est pas un nombre premier.

Fonction utile : `is_prime()`

4. Le nombre d'or

Le nombre d'or est la proportion qui permet de diviser *esthétiquement* un segment en deux parties non égales :



La proportion vérifie :

$$\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a}$$

Autrement dit « la grande longueur divisée par la petite longueur est égale à la longueur totale divisée par la grande longueur ».

On note cette proportion le **nombre d'or** :

$$\varphi = \frac{a}{b} = \frac{a+b}{a}.$$

1. Montrer à la main que φ vérifie l'équation :

$$\varphi^2 - \varphi - 1 = 0.$$

En utilisant Sage, en déduire que

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

et en donner une approximation numérique.

Fonctions utiles : `solve()`, `n()`

2. Dessiner la « spirale d'or » d'équation polaire

$$r(\theta) = \varphi^{2\theta/\pi}.$$

Fonctions utiles : `polar_plot()`

3. On définit la suite $u_0 = 1$, $u_1 = 1 + \frac{1}{1}$, $u_2 = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}$, $u_3 = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}$... et plus généralement :

$$u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} \quad \text{pour} \quad n \geq 0.$$

- (a) Calculer les premiers termes de la suite et leurs valeurs numériques approchées. Quelle semble être la limite ?

- (b) Prouver à la main votre conjecture !

4. On souhaite montrer que « pour tout entier n positif, il existe deux suites a_n et b_n d'entiers telles que $\varphi^n = a_n \varphi + b_n$. »

Par exemple $\varphi^5 = \frac{5\sqrt{5}}{2} + \frac{11}{2} = 5\varphi + 3$, donc $a_5 = 5$ et $b_5 = 3$.

- (a) Vérifier expérimentalement ce résultat pour les premières valeurs de n .

- (b) **Énigme.** Pour $n = 18$, $\varphi^{18} = a_{18}\varphi + b_{18}$. Que vaut $a_{18} + b_{18}$?

- (c) Prouver l'assertion à la main et par récurrence (utiliser la relation $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$).

Fonction utile : `expand()`