

Capítulo 1

Marca de la página 1: MARCA1X.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

Capítulo 2

Marca de la página 2: MARCA2X.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

Capítulo 3

Marca de la página 3: MARCA3X.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

Capítulo 4

Marca de la página 4: MARCA4X.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

Capítulo 5

Marca de la página 5: MARCA5X.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

Capítulo 6

Marca de la página 6: MARCA6X.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.

El skarn de cobre aflora en el contacto del pórfido diorítico con la caliza del Grupo Yojoa. Las muestras de sedimento superan el umbral de sesenta y nueve partes por millón de cobre en varias quebradas del área, y el zinc supera ciento setenta y ocho en Zanja de León y Mangulile. La perforación nunca llegó a esta zona y el potencial queda sin probar, no descartado.