

# Temi d'esame di elettrodinamica

Eugenio Thieme

10 settembre 2016



# Indice

<b>Disclaimer</b>	<b>5</b>
<b>09/07/2012</b>	<b>7</b>
Esercizio 3 . . . . .	7



# Disclaimer

Questa è una raccolta di esercizi svolti tratti da temi d'esame del corso di elettrodinamica classica tenuto presso il cdl di fisica dell'Università degli Studi di Milano. Essendo stati svolti da me senza correzione da parte di terzi, ed essendo stati trascritti in  $\text{\LaTeX}$  esclusivamente per facilitare la revisione personale (ovvero, da parte mia) di concetti e modi operandi, non hanno la pretesa di correttezza nè tantomeno di completezza. La risoluzione dei temi d'esame fino al 2013 è stata pesantemente aiutata dalla versione di Giuliano Giudici già esistente.

*TRY THIS AT HOME!* Qualsiasi segnalazione di errori è benvenuta e può essere fatta tramite *pull request* su [github.com/theugen/elettrodinamica](https://github.com/theugen/elettrodinamica).



09/07/2012

### Esercizio 3

Si mostri che l'accelerazione di una particella di massa  $m$  e carica  $q$  che si muove con velocità  $\mathbf{v}$  sotto l'azione dei campi elettromagnetici  $\mathbf{E}$  e  $\mathbf{B}$  può essere scritta come

$$\bar{a} = \frac{q}{m} \sqrt{1 - \beta^2} [\bar{E} + \bar{\beta} \wedge \bar{B} - \bar{\beta}(\bar{\beta} \cdot \bar{E})] \quad (1)$$

Non ho informazioni sulla mutua disposizione dei campi elettromagnetici, provo a ragionare in termini più generali.

$$\frac{dp^\mu}{dt} = m \begin{pmatrix} \dot{\gamma}c \\ \dot{\gamma}\bar{v} + \gamma\bar{\dot{v}} \end{pmatrix} = F^\mu = \begin{pmatrix} q\bar{\beta} \cdot \bar{E} \\ q(\bar{E} + \bar{\beta} \wedge \bar{B}) \end{pmatrix} \quad (2)$$

Conoscendo la definizione di  $\gamma$  posso ricavare  $\beta$  invertendo la relazione

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow \beta = \pm \frac{\sqrt{1 - \gamma^2}}{\gamma} \quad (3)$$

Calcolo  $\dot{\gamma}$  dalla componente temporale del quadriettore:

$$\dot{\gamma} = \frac{q\bar{\beta} \cdot \bar{E}}{mc} \quad (4)$$

Ora, uguagliando le componenti spaziali dei quadriettori, posso ricavare l'accelerazione:

$$\bar{\dot{v}} = \bar{a} = \frac{q(\bar{E} + \bar{\beta} \wedge \bar{B})}{m\gamma} - \dot{\gamma}\bar{v} = \frac{q(\bar{E} + \bar{\beta} \wedge \bar{B})}{m\gamma} - \frac{q\bar{\beta} \cdot \bar{E}}{mc} \cdot \frac{c\sqrt{1 - \gamma^2}}{\gamma} = \frac{q(\bar{E} + \bar{\beta} \wedge \bar{B})}{m\gamma} - \frac{q\bar{\beta} \cdot \bar{E}\sqrt{1 - \gamma^2}}{m\gamma^2} = 0 \quad (5)$$