


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Листок-вкладыш (информация для пациента)

ТРАВОПАССИТ-ЭКЗОН

Торговое название. ТРАВОПАССИТ-ЭКЗОН.

Лекарственная форма. Капсулы.

Международное непатентованное название. ---

Описание. Капсулы твердые желатиновые № 0 цилиндрической формы с полусферическими концами; корпус белого цвета, крышечка оранжевого цвета.

Состав. Каждая капсула содержит сухие экстракты: древогубца метельчатого семян (13:1) – 9,0 мг, центеллы азиатской надземной части (20:1) – 48,0 мг, витании снотворной корней (8:1) – 90,0 мг, эмблики лекарственной плодов (4:1) – 180,0 мг;

вспомогательные вещества: тальк очищенный, кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая;

состав оболочки капсулы: желатин, глицерин, титана диоксид, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный безводный, солнечный закат желтый Е-110, понсо 4R Е-124, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие седативные и снотворные средства. Средство растительного происхождения. Код АТХ: N05CM.

Показания к применению:

- общее нервное возбуждение;
- неврастения и невротические реакции, невроз;
- стрессы, состояние тревоги и раздражительности;
- нарушения сна;
- головные боли, обусловленные нервным напряжением;
- в качестве симптоматического средства при нейроциркуляторной дистонии и климактерическом синдроме.

Способ применения и дозировка.

Внутрь, независимо от приема пищи.

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день. При необходимости суточную дозу можно увеличить до 2 капсул 3 раза в день.

Длительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочные действия.

Возможны аллергические реакции на компоненты лекарственного средства. Возможно появление сонливости, утомляемости, артериальной гипотензии, атаксии, головной боли и тошноты.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания.

- повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства;
- детский возраст до 18 лет.

Передозировка.

О случаях передозировки не сообщалось, однако в случае передозировки необходимо симптоматическое лечение.

Меры предосторожности.

Перед началом применения проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью.

Безопасность лекарственного средства во время беременности и кормления грудью не изучалась, в связи с чем не рекомендуется применять Травопассит – Экзон во время беременности и кормления грудью.

Влияние на возможность управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Лекарственное средство не назначают водителям и пациентам, работающим с механизмами и устройствами, требующими повышенного внимания и быстрых двигательных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Травопассит - Экзон усиливает действие лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.

Сообщите врачу обо всех принимаемых лекарственных средствах, включая аюрведические.

Условия хранения и срок годности.

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска.

Без рецепта врача.

Упаковка. По 30 капсул в банке полимерной с контролем первого вскрытия для лекарственных средств или по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке; банка или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке картонной.

Информация о производителе.

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
по приказу Министерства здравоохранения
Республики Беларусь