



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА)

**РЭНИКЗОН**

**Общая характеристика.**

**Международное непатентованное название.**

**Описание.** Таблетки плоскоцилиндрические, с фаской, белого или почти белого цвета с небольшими сероватыми вкраплениями.

**Состав.** Каждая таблетка содержит кальция карбоната - 680 мг, магния карбоната основного - 80 мг; вспомогательные вещества: сахар-песок, кальция стеарат, картофельный крахмал, тальк, левоментол.

**Лекарственная форма.** Таблетки жевательные.

**Фармакотерапевтическая группа.** Антациды. Код АТХ: A02AX.

**Показания для применения.** Симптомы, связанные с повышенной кислотностью желудочного сока: изжога, отрыжка, периодические боли в области желудка, нарушение пищеварения, диспепсия (чувство переполнения или тяжести в эпигастральной области, тошнота).

**Способ применения и дозы.** Взрослые и дети старше 12 лет:

Разовая доза - 1-2 таблетки, которые можно разжевать или держать во рту до полного рассасывания. Принимать при появлении симптомов или через час после приема пищи и перед сном. Не следует превышать дневную дозу в 8 г кальция карбоната, что соответствует 11 таблеткам.

Так же, как и для других антацидов, если симптомы сохраняются после 14 дней приема, рекомендуются диагностические меры для исключения более серьезного заболевания.

**Побочные действия.**

*Со стороны иммунной системы:* очень редко аллергические реакции - высыпания, крапивница, отек Квинке и анафилаксия.

*Со стороны ЖКТ:* тошнота, рвота, расстройство желудка и понос.

*Со стороны обмена веществ и питания:* у пациентов с нарушением функции почек применение препарата может привести к проявлению реакций, связанных с передозировкой - гипермагниемии, гиперкальциемии и алкалозу, что может спровоцировать возникновение симптомов со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, запор) и мышечную слабость.

*Со стороны скелетно-мышечной системы:* мышечная слабость.

*Со стороны нервной системы:* потеря вкуса, головная боль.

*Со стороны почек и мочевыводящих путей:* азотемия.

*Побочные реакции, связанные с молочно-щелочным синдромом:* астения и кальциноз.

**Противопоказания.** Нефрокальциноз, тяжелая почечная недостаточность, гиперкальциемия, гиперкальциурия, гипофосфатемия; наследственные заболевания, связанные с непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или непереносимостью сахаразы-изомальтазы; повышенная чувствительность к ингредиентам препарата, миастения, кишечная непроходимость.

**Передозировка.** Преимущественно у пациентов с нарушением функции почек, продолжительный прием больших доз препарата может привести к почечной недостаточности, гипермагниемии, гиперкальциемии и алкалозу, что может спровоцировать возникновение симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, запор, рвота) и мышечную слабость. В таком случае следует прекратить прием препарата и принять достаточное количество жидкости. В тяжелых случаях передозировки (например, молочно-щелочной синдром) следует проконсультироваться с врачом, поскольку могут потребоваться дополнительные меры по восстановлению водного баланса.

**Особые указания и меры предосторожности.** Не превышать указанную дозировку. Следует избегать продолжительного приема лекарственного средства (может увеличить риск образования камней в почках). С осторожностью принимать пациентам с нарушением функции почек (следует регулярно проверять уровень кальция, фосфатов и магния в сыворотке крови).

Указание больным сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 475 мг сахара.

**Беременность и лактация.** Лекарственное средство можно принимать во время беременности и лактации при условии соблюдения рекомендаций по применению. Следует учитывать, что лекарственное средство является дополнительным источником кальция к рациону питания, а избыточное накопление кальция может привести к проявлению симптомов передозировки.

**Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.** Не наблюдалось никакого влияния на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Рекомендуется принимать лекарственное средство за 1-2 часа до или после приема других лекарственных средств. Применение Рэникзона может повлиять на скорость и степень всасывания некоторых лекарственных средств, принимаемых в то же время, например, уменьшает абсорбцию индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов  $H_2$ -гистаминовых рецепторов бета-адреноблокаторов, дифлунизала, изониазида, дигоксина, тетрациклинов, непрямых антикоагулянтов, барбитуратов, препаратов железа. Антихолинергические лекарственные средства усиливают и удлиняют действие, замедляя опорожнение желудка. Усиливает эффект сульфадиазина, леводопы, ацетилсалициловой кислоты и налидиксовой кислоты. Соблюдать осторожность при совместном приеме с тиазидовыми диуретиками.

**Условия хранения и срок годности.** Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Без рецепта.

**Упаковка.** Помещают по 24 таблетки жевательные в банку полимерную с крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия для лекарственных средств или 12 таблеток жевательных в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ и фольги алюминиевой.

Каждую банку или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают во вторичную упаковку (пачку из картона коробочного).

**Информация о производителе.**

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,  
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

