

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОГЛАСОВАНО	
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь	
от « <u>25</u> » <u>05</u> 20 <u>17</u> г. № <u>581</u>	
КЛС № <u>6</u>	от « <u>03</u> » <u>05</u> 20 <u>17</u> г.

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для пациента)

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ – УБФ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции (листка-вкладыше).

Сохраните листок-вкладыш, он может потребоваться вновь.

Если у Вас возникли вопросы по лекарственному средству, обратитесь к врачу.

При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех возможных побочных эффектов, включая и таковые, не описанные в данном листке-вкладыше.

Лекарственная форма. Таблетки.

Описание. Таблетки черного цвета, слегка шероховатые, плоскоцилиндрической формы с риской и фаской.

Состав. Каждая таблетка содержит угля активированного 250 мг; вспомогательные вещества: крахмал картофельный.

Фармакотерапевтическая группа. Кишечные адсорбенты. Активированный уголь.

Показания к применению:

- в комплексном лечении пищевых токсикоинфекций;
- острые отравления бытовыми, промышленными и пищевыми ядами, алкалоидами, лекарственными препаратами, солями тяжелых металлов;
- диспепсия, метеоризм;
- для уменьшения газообразования перед ультразвуковым и рентгеновским исследованием.

Способ применения и дозировка. Внутрь в таблетках или после предварительного измельчения в виде водной взвеси (необходимое количество лекарственного средства размешивают в ½ стакана воды), за 1-2 ч до или после еды и приема других лекарственных средств.

Взрослые: обычная доза составляет 3-6 таблеток 3-4 раза в сутки; максимальная разовая доза – 8 г.

Дети: обычная доза составляет 2-4 таблетки 3-4 раза в сутки; в случае диареи дозу увеличивают до 4-5 таблеток 3-4 раза в сутки. При различных отравлениях детям от 3 до 7 лет назначают внутрь в дозе 5 г 3 раза в сутки, детям от 7 до 14 лет назначают внутрь в дозе 7 г 3 раза в сутки. Детям УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ - УБФ всегда назначают в виде суспензии измельченных таблеток в небольшом количестве воды, после приема которой необходимо выпить стакан воды.

Курс лечения при острых заболеваниях составляет 3-5 дней, при хронических заболеваниях, обусловленных эндогенными интоксикациями, – 10-15 дней. При необходимости, по рекомендации врача, возможен повторный курс через 2 недели.

При диспепсии, метеоризме – по 1-2 г 3-4 раза в сутки. Курс лечения 3-7 дней.

При острых отравлениях лечение начинают с промывания желудка с использованием взвеси активированного угля, затем назначают внутрь в дозе 20-30 г на прием в виде водной взвеси в 0,5-2 стаканах воды.

Побочное действие. Запор, диарея, диспепсия; при длительном применении (более 14 дней) – гиповитаминоз, нарушение всасывания из желудочно-кишечного тракта питательных веществ, кальция, витаминов. Окрашивание стула в черный цвет.

Противопоказания. Язвенные поражения пищеварительного тракта, желудочные кровотечения, атония кишечника, индивидуальная непереносимость лекарственного средства, детский возраст до 3 лет.

Передозировка. Данные о возможной передозировке угля активированного не отмечались. Возможны проявления диспепсии, что требует отмены лекарственного средства.

Меры предосторожности. При сопутствующей фармакотерапии уголь активированный принимают за 1 – 1,5 ч до или через такое же время после приема лекарственных средств в связи с адсорбирующими свойствами лекарственного средства. Наличие пищевых масс в пищеварительном тракте требует введения угля активированного в больших дозах, потому что содержимое пищеварительного тракта может адсорбироваться углем активированным, вследствие чего активность лекарственного средства снижается.

При лечении интоксикаций необходимо создать избыток угля в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации угля в среде способствует десорбции связанного вещества и его всасыванию (для предупреждения резорбции освободившегося вещества рекомендуется повторное промывание желудка и назначение угля).

Если отравление вызвано веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и др. опиаты), необходимо применять уголь в течение нескольких дней.

Пожилым и детям активированный уголь рекомендуется назначать вместе с раствором электролитов с глюкозой.

При отравлении кислотами и щелочами активированный уголь не назначают.

Окрашивает каловые массы в черный цвет.

Рекомендуется хранить в сухом месте, отдельно от веществ, выделяющих в атмосферу газы или пары. Хранение на воздухе (особенно влажном) снижает сорбционную способность.

Беременность и лактация. Данных об отрицательном влиянии угля активированного на беременных и кормящих матерей нет.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Не влияет.


Взаимодействие с другими лекарственными средствами. В связи с адсорбционными свойствами уголь активированный может уменьшать эффективность одновременно принимаемых лекарственных средств, особенно активность лекарственных средств, действующих в области желудка.

Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного



Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке из бумаги с полимерным покрытием или в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 5 контурных безъячейковых упаковок или по 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем во вторичной упаковке (пачке из картона коробочного).

Информация о производителе.

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

