

2020 ~2021 学年第 二 学期

《微积分 (一)》课程考试试卷(A 卷) 解答

一. 单项选择题(每小题 3 分, 6 个小题共 18 分, 将结果涂在答题卡上.)

1. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2x - 2e^x$ 的特解 y^* 的形式是 【 D 】.

A. $y^* = (Ax + B)e^x$

B. $y^* = x(Ax + B)e^x$

C. $y^* = Ax + B + Ce^x$

D. $y^* = Ax + B + Cxe^x$

2. 设曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 点 $M(1, -1, 0)$, 则在点 M 处下列说法 **不正确** 的是 【 B 】.

A. 切矢量为 $\{-2, -2, 4\}$

B. 切矢量为 $\{-2, 2, 4\}$

C. 切线方程为 $x - 1 = y + 1 = -\frac{z}{2}$

D. 法平面方程为 $x + y - 2z = 0$

3. 函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处 【 C 】.

A. 可微

B. 偏导数存在

C. 连续

D. 不连续

4. 已知函数 f 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr =$ 【 C 】.

A. $\int_0^2 dx \int_0^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

B. $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$

C. $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx$

D. $\int_0^2 dx \int_0^2 f(x, y) dy$

5. 设 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, $I = \oint_{\Gamma} x ds$, $J = \oint_{\Gamma} y ds$, $K = \oint_{\Gamma} z^2 ds$. 以下说法中正确的是 【 B 】.

A. $K = 0$

B. I, J, K 中有两个等于 0

C. I, J, K 都等于 0

D. I, J, K 全都不等于 0

6. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数且 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ \pi - x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$, $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数是 $S(x)$. 以下说法中正确的是 【 C 】.

A. $S(x)$ 处处连续

B. $S(x) \equiv f(x)$

C. $S(-1) = 0$

D. $S(0) = \pi$

二. 填空题 (每小题 4 分, 4 个小题共 16 分, 将计算结果写在答题卡上.)

7. 直线 $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$ 与平面 $x - y + 2z + 4 = 0$ 的夹角是_____.

解 直线的方向向量 $s = \{2, 1, 1\}$, 平面的法向量 $n = \{1, -1, 2\}$. 记夹角为 φ , 则

$$\sin \varphi = \frac{|s \cdot n|}{\|s\| \|n\|} = \frac{\{2, 1, 1\} \cdot \{1, -1, 2\}}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad \text{所以 } \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

8. 设 $P_0(1, 1, -1), P_1(2, -1, 0)$, 则 $u = x + y^2 + z^3$ 在 P_0 处沿 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的方向导数为_____.

解 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的单位矢量为 $n = \frac{1}{\sqrt{6}} \{1, -2, 1\}$, $\nabla u(P_0) = \{1, 2y, 3z^2\}_{P_0} = \{1, 2, 3\}$,

$$\text{所以 } \frac{\partial u}{\partial n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1 - 4 + 3) = 0.$$

9. 若 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$, 则 $z_x(0, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 当 $x = 0, y = 0$ 时, $z = 0$. 设 $F(x, y, z) = e^{x+2y+3z} + xyz - 1$, 则

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{e^{x+2y+3z} + yz}{3e^{x+2y+3z} + xy}, \quad \text{所以 } z_x(0, 0) = -\frac{1}{3}.$$

10. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ ($-\infty < x < +\infty$) 的和函数是 _____.

解 $\cos x$ (注: 有个别学生写 $\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$, 给分)

基本计算题 (每小题 7 分, 6 个小题共 42 分, 必须写出主要计算过程.)

11. 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = y \ln \frac{y}{x}$ 的通解.

解 令 $u = \frac{y}{x}$, 则原方程化为 $\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}$, (3 分)

两边积分得 $\ln u - 1 = Cx$. (5 分)

所以原方程的通解为 $\ln \frac{y}{x} = Cx + 1$. (7 分)

12. 已知函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中 f 有二阶连续偏导数, g 可导, 求 z_x, z_{xy} .

解 $z_x = y f'_1 + y g'(x) f'_2 = y[f'_1 + g'(x) f'_2]$ (3 分)

$$z_{xy} = [f'_1 + g'(x) f'_2] + y[(x f''_{11} + g(x) f''_{12}) + g'(x)(x f''_{12} + g(x) f''_{22})].$$

$$= f_1' + g'(x)f_2' + xyf_{11}'' + [g(x) + xyg'(x)]f_{12}'' + yg'(x)g(x)f_{22}'' \quad (7 \text{ 分})$$

注 保留 f_{12}'', f_{21}'' 不扣分.


13. 计算二次积分 $I = \int_1^3 dx \int_{x-1}^2 \sin y^2 dy$.

解 内层积分中的被积函数 $\sin y^2$ 的原函数不能由初等函数表示,

因此, 交换积分次序

$$I = \int_0^2 dy \int_1^{1+y} \sin y^2 dx = \int_0^2 y \sin y^2 dy \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 \sin y^2 d(y^2) = -\frac{1}{2} \cos y^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (1 - \cos 4). \quad (7 \text{ 分})$$



14. 求三重积分 $I = \iiint_V (x^3 + y^2 + z) dv$, 其中 V 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, a > 0$.

解 $I = \iiint_V y^2 dv = \frac{1}{3} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dv \quad (3 \text{ 分})$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^a \rho^4 \sin \varphi d\rho \quad (5 \text{ 分})$$

$$= \frac{4\pi}{15} a^5. \quad (7 \text{ 分})$$

15. 求 $I = \iint_S (z^2 + x) dy dz - z dx dy$, 其中 S 是 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 2)$ 下侧.

解法一 补面 $S_1: z = 2 (x^2 + y^2 \leq 4)$ 上侧, 则 $S + S_1$ 封闭, 且指向外侧. (2 分)

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{S+S_1} (z^2 + x) dy dz - z dx dy - \iint_{S_1} (z^2 + x) dy dz - z dx dy \\ &= \iiint_V 0 dv + \iint_S z dx dy \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} 2 dx dy = 8\pi. \quad (7 \text{ 分})$$

解法二 用统一投影法, 向 xy 平面投影, 得

$$I = \iint_S [(z^2 + x)(-x) - z] dx dy \quad (2 \text{ 分})$$

$$= -\iint_D \left\{ -x \left[\frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right]^2 - x^2 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right\} dx dy \quad (D: x^2 + y^2 \leq 4) \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned}
 &= \iint_D \left[x^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] dx dy = \iint_D \left[\frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] dx dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr = 8\pi.
 \end{aligned}
 \tag{7 分}$$

16. 将 $f(x) = \arctan x$ 展开为 Maclaurin 级数, 并求 $f^{(20)}(0), f^{(21)}(0)$.

解 因 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, |x| < 1$, 所以

$$f(x) = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, |x| < 1. \tag{3 分}$$

当 $x = \pm 1$, 因 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 及 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}$ 均收敛, 由和函数的连续性, 得

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \text{ 在 } x = \pm 1 \text{ 时也成立,}$$

$$\text{即 } \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, |x| \leq 1. \tag{5 分}$$

$$f^{(20)}(0) = 0, \text{ 由 } \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!} \Rightarrow f^{(21)}(0) = 21! \cdot \frac{(-1)^{10}}{21} = 20!. \tag{7 分}$$

四. 应用题 (每小题 7 分, 2 个小题共 14 分, 必须写出主要过程.)

17. 求 $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ 的极值.

解 令 $\begin{cases} f_x(x, y) = 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ f_y(x, y) = 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases}$, 两式相减可得 $x = y$, 带入方程 (1) 得: $x = 0$

及 $x = \pm 1$, 所以 $f(x, y)$ 的驻点为 $(1, 1)$, $(-1, -1)$ 及 $(0, 0)$. (2 分)

又 $f_{xx} = 12x^2 - 2$, $f_{xy} = -2$, $f_{yy} = 12y^2 - 2$, 所以

	A	B	C	$AC - B^2$	
$(1, 1)$	10	-2	10	$96 > 0$	$f(1, 1) = -2$ 为极小值
$(-1, -1)$	10	-2	10	$96 > 0$	$f(-1, -1) = -2$ 为极小值
$(0, 0)$	-2	-2	-2	0	方法失效

(5 分)

由于 $f(0,0)=0$ ，取 $y=x$ ，则 $f(x,y)=2x^4-4x^2=2x^2(x^2-1)<0$ （在 $(0,0)$ 附近）；

取 $y=-x$ ，则 $f(x,y)=2x^4>0$ （在 $(0,0)$ 附近），故 $(0,0)$ 不是极值点. (7 分)

18. 已知曲线积分 $\int_L y f(x) dx + [f(x) - x^2] dy$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 有一阶连续导数，且 $f(0)=1$ ，求 $f(x)$ 和 $I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} y f(x) dx + [f(x) - x^2] dy$ 的值.

解 由积分与路径无关，得 $f'(x) - 2x = f(x)$ ，即 $f'(x) - f(x) = 2x$. (2 分)

$$f(x) = e^{\int dx} (\int 2xe^{-x} dx + C) = e^x (\int 2xe^{-x} dx + C) = e^x (-2e^{-x} - 2xe^{-x} + C). \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{由 } f(0)=1, \text{ 得 } C=3, \quad f(x)=3e^x-2x-2. \quad (5 \text{ 分})$$

选择积分路径为折线 $L_1: y=0(x \text{ 从 } 0 \rightarrow 1)$; $L_2: x=1(y \text{ 从 } 0 \rightarrow 1)$

$$I = 0 + \int_0^1 [f(1) - 1] dy = f(1) - 1 = 3e - 5. \quad (7 \text{ 分})$$

五. 综合题（每小题 5 分，2 个小题共 10 分，必须写出主要过程.）

19. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ ，证明不等式： $\iint_D \sin \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy \leq \frac{2}{5} \pi$.

证 利用极坐标

$$I = \iint_D \sin \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \sin r^3 dr = 2\pi \int_0^1 r \sin r^3 dr. \quad (2 \text{ 分})$$

因当 $t > 0$ 时， $\sin t < t$ ，因此 $r \sin r^3 < r^4$. 又 $2\pi \int_0^1 r^4 dr = \frac{2}{5} \pi$,

$$\text{故} \quad \iint_D \sin \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy \leq \frac{2}{5} \pi. \quad (5 \text{ 分})$$

20. 设 $f(0)=1, f'(0)=0$ ，且 $f''(x)$ 在原点的邻域内有界，证明： $\alpha > \frac{1}{2}$ 时，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1 \right) \text{ 绝对收敛.}$$

证 由泰勒公式 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\theta x)}{2}x^2$ ， $\theta \in (0,1)$ 及题设条件有

$$\left| f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1 \right| = \frac{1}{2} \left| f''\left(\frac{\theta}{n^\alpha}\right) \right| \frac{1}{n^{2\alpha}} \leq \frac{M}{2} \frac{1}{n^{2\alpha}}, \quad (3)$$

$$\alpha > \frac{1}{2} \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2\alpha}} \text{ 收敛, 故 } \sum_{n=1}^{\infty} \left(f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1 \right) \text{ 绝对收敛.} \quad (5)$$