

MAE5776 - 1º Semestre/2022 – Análise Multivariada - Lista 3

Alunos:

Fernando F. Paulos Vieira - nº USP: 13492870

Leandro Alves da Silva - nº USP: 11868023

Thiago Ferreira Miranda - nº USP: 11925711

1 - A partir de uma matriz de dados normalizados $Y_{n \times p}^*$, considere a matriz de covariâncias $nS_{p \times p} = Y^{*'}Y^* = V\Lambda V'$, tal que $V_{p \times p} = (V_1, \dots, V_p)$ e $\Lambda = \text{diag}(\lambda_j)$ são matrizes de autovetores (das colunas de $Y_{n \times p}^*$) e autovalores, respectivamente, e a matriz de distâncias $D_{n \times n}$, tal que seus elementos são função dos elementos de $B_{n \times n} = Y^*Y^{*'} = U\Lambda U'$, com $U_{n \times n} = (U_1, \dots, U_n)$ matriz de autovetores (das linhas de $Y_{n \times p}^*$). Três pesquisadores realizaram análises estatísticas e chegaram à seguinte redução de dimensionalidade de Y^* .

Pesquisador 1: $Y_{n \times p}^* \rightarrow \tilde{Y}_{n \times 2} = Y^*(V_1 \ V_2)$

Pesquisador 2: $Y_{n \times p}^* \rightarrow \tilde{Y}_{n \times 2} = Y^*\left(\frac{V_1}{\sqrt{\lambda_1}} \ \frac{V_2}{\sqrt{\lambda_2}}\right)$

Pesquisador 3: $Y_{n \times p}^* \rightarrow \tilde{Y}_{n \times 2} = Y^*(V_1\sqrt{\lambda_1} \ V_2\sqrt{\lambda_2})$

1.1 - Qual análise estatística cada pesquisador realizou? Que propriedades dos dados estão preservadas em cada caso? Eles partiram do mesmo objetivo? Faça suposições necessárias.

R:

O pesquisador 1 - Realizou uma Análise de Componentes Principais. Buscou preservar a variância total dos dados (ou a maior proporção da variância total que possa ser preservada).

O pesquisador 2 - Realizou uma Análise Fatorial Exploratória. Buscou aproximar a matriz de covariâncias em termos de fatores latentes comuns e específicos, descrevendo as variáveis em função de m fatores.

O pesquisador 3 - Realizou uma Análise de Coordenadas Principais ou Escalonamento Multidimensional. Analogamente ao Pesquisador 1, buscou preservar a variância total dos dados (ou a maior proporção da variância total que possa ser preservada).

Num primeiro momento, acredita-se que estes pesquisadores partiram de um mesmo objetivo de redução de dimensionalidade das variáveis presentes nos dados originais disponíveis.

1.2 - Simule dados e realize as análises dos três pesquisadores. Interprete os resultados.

Amostra	Vetor de Médias	Matriz de Covariâncias
$n_1 = 100$	$\mu_1 = (5, 7, 10, 8, 11)$	$\Sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0.3 & 0.5 & 0.2 & 0.7 \\ 0.3 & 1 & 0.2 & 0.4 & 0.6 \\ 0.5 & 0.2 & 2.5 & 1.2 & 1.5 \\ 0.2 & 0.4 & 1.2 & 2 & 1.5 \\ 0.7 & 0.6 & 1.5 & 1.5 & 3 \end{pmatrix}$

1.3 - Para os dados simulados, obtenha uma representação Biplot. Como esse gráfico é construído?

2 - Considere os dados “bodyfat” disponíveis na biblioteca TH.data do R. Neste caso, a matriz de trabalho contém 71 observações avaliadas em 10 variáveis. Gere 5 observações (para tanto, adote um critério) e considere seu novo conjunto de dados “bodyfat_new”. Com base na matriz de trabalho resultante realize as seguintes análises:

2.1 - Componentes Principais.

Centróides dos componentes:

PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
50.75	30.6439	87.2789	105.0844	6.5048	9.3218	3.8605	4.2793	3.8764	5.383

Centróides dos componentes com dados padronizados:

PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
50.75	30.6439	87.2789	105.0844	6.5048	9.3218	3.8605	4.2793	3.8764	5.383

Autovalores dos componentes:

PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
415.484	162.7966	19.4313	11.2885	0.3823	0.2692	0.1336	0.0345	0.0077	0.0018

Autovalores dos componentes com dados padronizados:


PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
6.7355	1.2452	0.7084	0.7067	0.2697	0.1289	0.1054	0.0638	0.0311	0.0054

Importância dos componentes:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
Standard deviation	20.3834	12.7592	4.4081	3.3598	0.6183	0.5189	0.3656	0.1859	0.088	0.0421
Proportion of Variance	0.6813	0.2670	0.0319	0.0185	0.0006	0.0004	0.0002	0.0001	0.000	0.0000
Cumulative Proportion	0.6813	0.9483	0.9801	0.9986	0.9993	0.9997	0.9999	1.0000	1.000	1.0000

Importância dos componentes com dados padronizados:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
Standard deviation	2.5953	1.1159	0.8416	0.8407	0.5193	0.3590	0.3247	0.2525	0.1763	0.0733
Proportion of Variance	0.6736	0.1245	0.0708	0.0707	0.0270	0.0129	0.0105	0.0064	0.0031	0.0005
Cumulative Proportion	0.6736	0.7981	0.8689	0.9396	0.9666	0.9794	0.9900	0.9964	0.9995	1.0000




Autovetores:


	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
age	-0.2959	-0.9515	0.0355	-0.0753	0.0094	0.0023	0.0044	0.0023	-0.0003	0.0002
DEXfat	-0.5140	0.1068	0.2621	0.8026	0.0261	0.1014	0.0228	0.0014	-0.0014	-0.0024
waistcirc	-0.6428	0.1895	-0.7129	-0.2054	-0.0080	0.0151	-0.0094	-0.0039	0.0025	0.0016
hipcirc	-0.4817	0.2169	0.6491	-0.5460	-0.0312	-0.0203	0.0105	0.0016	0.0007	0.0001
elbowbreadth	-0.0078	0.0071	-0.0156	0.0082	0.2307	-0.3360	0.9058	0.1138	0.0083	0.0051
kneebreadth	-0.0327	0.0143	0.0146	0.0168	0.7956	-0.4714	-0.3769	-0.0086	0.0289	-0.0087
anthro3a	-0.0191	-0.0009	0.0016	0.0406	-0.1997	-0.3557	-0.0229	-0.4422	-0.6344	0.4827
anthro3b	-0.0187	-0.0020	0.0026	0.0479	-0.2752	-0.3689	-0.0712	-0.0442	0.7192	0.5111
anthro3c	-0.0220	0.0005	-0.0017	0.0473	-0.2914	-0.3843	-0.1690	0.8156	-0.2657	-0.0187
anthro4	-0.0254	-0.0024	0.0003	0.0573	-0.3340	-0.4936	-0.0513	-0.3525	0.0930	-0.7109

Autovetores com dados padronizados:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
age	0.1456	0.5618	0.7324	0.3430	0.0407	-0.0149	0.0778	-0.0334	0.0094	-0.0046
DEXfat	0.3663	-0.0838	-0.0746	0.2012	0.1138	-0.0947	0.0292	0.8841	0.0780	0.0471
waistcirc	0.3447	-0.1733	-0.0219	0.2481	0.4187	0.6043	-0.4527	-0.1811	-0.0962	-0.0397
hipcirc	0.3263	-0.2279	-0.1581	0.3918	0.3615	-0.5205	0.3510	-0.3711	-0.0228	-0.0021
elbowbreadth	0.1653	-0.5331	0.5998	-0.5266	0.1871	-0.0455	0.1178	0.0189	-0.0016	-0.0044
kneebreadth	0.2866	-0.3884	0.1281	0.3342	-0.7856	0.0795	-0.0228	-0.1060	-0.0589	0.0140
anthro3a	0.3624	0.1596	-0.0591	-0.2252	-0.1031	-0.2918	-0.4290	-0.1220	0.5764	-0.4026
anthro3b	0.3541	0.2394	-0.1185	-0.2759	-0.0899	-0.0663	0.0453	0.0187	-0.7239	-0.4338
anthro3c	0.3505	0.1835	-0.1789	-0.2029	-0.0611	0.4818	0.6445	-0.0886	0.3333	0.0117
anthro4	0.3608	0.2094	-0.0829	-0.2641	-0.0695	-0.1567	-0.2215	-0.1097	-0.1152	0.8035



Biplots:




2.2 - Escalonamento Multidimensional (ou Coordenadas Principais) – Compare as soluções métricas e não-métricas.

R:

```
> Initial stress      : 0.00731
> stress after 10 iters: 0.00486, magic = 0.461
> stress after 20 iters: 0.00468, magic = 0.500
> stress after 30 iters: 0.00468, magic = 0.500

> initial value 4.018740
> final value 3.493559
> converged
```



2.3 - Análise Fatorial Exploratória – Solução de MVS (rotacionar, se for de interesse). Em cada caso, que proporção da variância total dos dados pode ser explicada por 2 componentes? Quais variáveis mais influenciaram na redução de dimensionalidade? Represente os dados em eixos bidimensionais, identifique as observações e compare os resultados das três análises.

R: Foram feitas 3 análises fatoriais, a primeira sendo via Componentes Principais, a segunda e a terceira via Máxima Verossimilhança, sendo que na terceira rotacionamos via Varimax. Em dois componentes, análise fatorial via CP explicou 78,8 da variação total dos dados e a análise fatorial via MVS sem rotação e com rotação Varimax explicou 74,5.

Análise Fatorial Exploratória via CP:

Autovalores e Variância explicada:

	CP01	CP02	CP03	CP04	CP05	CP06	CP07	CP08	CP09	CP10
Eigenvalues	6.736	1.245	0.708	0.707	0.270	0.129	0.105	0.064	0.031	0.005
Cumulative Proportion	0.674	0.798	0.869	0.940	0.967	0.979	0.990	0.996	0.999	1.000

Matriz de cargas:

	vecn1	vecn2
	-0.3778	0.6269
	-0.9508	-0.0935
	-0.8947	-0.1934
	-0.8469	-0.2543
	-0.4290	-0.5949
	-0.7439	-0.4334
	-0.9405	0.1781
	-0.9190	0.2672
	-0.9098	0.2047
	-0.9365	0.2337

Análise Fatorial Exploratória via Máxima Verossimilhança - Sem Rotação:

Cargas Fatoriais:

	Factor1	Factor2
age	0.3863035	-0.0938985
DEXfat	0.8605744	0.4561501
waistcirc	0.7728966	0.5158784
hipcirc	0.7079938	0.6112358
elbowbreadth	0.3318770	0.2222714
kneebreadth	0.5775541	0.5619146
anthro3a	0.9831915	-0.0050008
anthro3b	0.9819688	-0.0831253
anthro3c	0.9307952	0.0218796
anthro4	0.9959090	-0.0610975

Variância Explicada:

	Factor1	Factor2
SS loadings	6.221	1.233
Proportion Var	0.622	0.123
Cumulative Var	0.622	0.745

Análise Fatorial Exploratória via Máxima Verossimilhança - Rotação Varimax:




Cargas Fatoriais:

	Factor1	Factor2
age	0.3831653	0.1059796
DEXfat	0.5297791	0.8173098
waistcirc	0.4241169	0.8268159
hipcirc	0.3210104	0.8785310
elbowbreadth	0.1817450	0.3556904
kneebreadth	0.2310648	0.7719623
anthro3a	0.8613290	0.4741338
anthro3b	0.8982827	0.4052908
anthro3c	0.8024745	0.4721156
anthro4	0.8997401	0.4313183


Variância Explicada:

	Factor1	Factor2
SS loadings	3.799	3.655
Proportion Var	0.380	0.366
Cumulative Var	0.622	0.745

Cargas ou coeficientes dos fatores comuns:




Plot de escore dos componentes:



Biplot entre os fatores:

AF – Bartlet – Sem Rotação AF – Bartlet – Rotação Varimax



Especificidades:

age	DEXfat	waistcirc	hipcirc	elbowbreadth	kneebreadth	anthro3a	anthro3b	anthro3c	anthro4
0.842	0.051	0.136	0.125	0.84	0.351	0.033	0.029	0.133	0.005

Matrizes de correlação para a qual a aproximação é feita:

	age	DEXfat	waistcirc	hipcirc	elbowbreadth	kneebreadth	anthro3a	anthro3b	anthro3c	anthro4
age	1.0000	0.3105	0.2656	0.1820	-0.0243	0.1481	0.3780	0.3856	0.3340	0.3911
DEXfat	0.3105	1.0000	0.8987	0.8906	0.3647	0.7573	0.8422	0.8132	0.8165	0.8281
waistcirc	0.2656	0.8987	1.0000	0.8659	0.4090	0.7260	0.7543	0.7086	0.7414	0.7396
hipcirc	0.1820	0.8906	0.8659	1.0000	0.3268	0.7382	0.6916	0.6447	0.6697	0.6680
elbowbreadth	-0.0243	0.3647	0.4090	0.3268	1.0000	0.4665	0.3473	0.2841	0.2700	0.3203
kneebreadth	0.1481	0.7573	0.7260	0.7382	0.4665	1.0000	0.5836	0.5114	0.5402	0.5401
anthro3a	0.3780	0.8422	0.7543	0.6916	0.3473	0.5836	1.0000	0.9516	0.8930	0.9828
anthro3b	0.3856	0.8132	0.7086	0.6447	0.2841	0.5114	0.9516	1.0000	0.9382	0.9841
anthro3c	0.3340	0.8165	0.7414	0.6697	0.2700	0.5402	0.8930	0.9382	1.0000	0.9240
anthro4	0.3911	0.8281	0.7396	0.6680	0.3203	0.5401	0.9828	0.9841	0.9240	1.0000

2.4 - Escolha uma das variáveis do banco de dados e obtenha uma tabela de contingência categorizando esta variável de acordo com faixas etárias das observações. Realize uma Análise de Correspondência e comente sobre o padrão de associação presente nesses dados.