

Thiago Goldin Chiampa

253041008

/ /

Estatística Descritiva

1	2	Faixas de tempo	f_i	F_{ac}	
		18-22	4	4	
		22-26	7	(11)	fac ant
li		26-30	(9)	20	
		30-34	7	27	
		34-38	3	30	

$F_i = 30$

② $EM = \frac{N}{2} = \frac{30}{2} = 15^{\text{a}}$ posição classe mediana 26-30

$$M_e = li + \frac{EM - F_{ac \text{ ant}}}{f_i \text{ classe}} \cdot h$$

$$M_e = 26 + \frac{15 - 11}{9} \cdot 4$$

$$M_e = 26 + \frac{4}{9} \cdot 4$$

$$M_e = 26 + 0,44 \cdot 4$$

$$M_e = 27,78$$

/ /

Thiago Goldim Champa

253041008

2- a) No chamados	No analistas	$x_i \cdot f_i$	
14	4	56	
17	5	85	
18	7	126	
20	10	200	
21	39	819	
22	5	110	
25	3	75	
27	2	54	
$\sum f_i = 75$		$\sum x_i \cdot f_i = 1525$	

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{1525}{75} = 20,33 \text{ chamados}$$

$$Q_3 = \frac{i(N+1)}{4}$$

$$EQ_3 = \frac{3(75+1)}{4}$$

$$EQ_3 = \frac{3(76)}{4} = 57 \approx \text{posição}$$

$$Q_3 = 21 \text{ chamados}$$

Resposta: 75% dos analistas resolveram até 21 chamados e 25% mais que 21 chamados.

800140525 afonso ribeiro paulo

1 / 1

Thiago Goldim Viana 253041008

Tempo (seg)	f_i	$x_i \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$
4,7	1	4,7	$(4,7 - 5,05)^2 \cdot 1 = 0,12$
4,8	1	4,8	$(4,8 - 5,05)^2 \cdot 1 = 0,06$
4,9	1	4,9	$(4,9 - 5,05)^2 \cdot 1 = 0,02$
5,0	2	10,0	$(5,0 - 5,05)^2 \cdot 2 = 0,00$
5,1	2	10,2	$(5,1 - 5,05)^2 \cdot 2 = 0,00$
5,2	1	5,2	$(5,2 - 5,05)^2 \cdot 1 = 0,02$
5,3	1	5,3	$(5,3 - 5,05)^2 \cdot 1 = 0,06$
5,4	1	5,4	$(5,4 - 5,05)^2 \cdot 1 = 0,12$
	$f_i = 10$	$x_i f_i = 50,5$	$\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i = 0,40$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{50,5}{10}$$

$$\bar{x} = 5,05$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{n-1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{0,40}{9}} = \sqrt{0,04} = 0,21 \text{ segundos}$$

(/ /)

Thiago Goldim Chianfo 253041008

$$\textcircled{4} \quad CV = \frac{S}{\bar{x}} \cdot 100$$

$$CV = \frac{9,71}{61,50} \cdot 100 = 15,78$$

$$CV = \frac{8,15}{60,54} \cdot 100 = 13,46$$

Resposta 2: O Grupo 2 apresentou os resultados mais homogêneos, pois possui o menor Coeficiente de Variação.