

Fundamentos de Matemática

Thiago Rodrigo Ramos

24 de agosto de 2026

Sumário

1	Linguagem matemática e lógica	2
1.1	Proposições e sentenças abertas	2
1.2	Conectivos lógicos	3
1.2.1	Negação	3
1.2.2	Conjunção	4
1.2.3	Disjunção	4
1.3	Tabelas-verdade	5
1.3.1	Tautologia, contradição e equivalência lógica	7
1.4	Implicação	7
1.4.1	Recíproca e contrapositiva	9
1.4.2	Equivalência e negação de uma implicação	10
1.5	Quantificadores	12
1.5.1	Quantificador universal	12
1.5.2	Quantificador existencial	13
1.5.3	Ordem dos quantificadores	14
1.5.4	Negação de proposições quantificadas	16
1.5.5	Contrapositiva sob quantificadores e negação	17
1.6	Exercícios resolvidos de revisão	18

1 Linguagem matemática e lógica

1.1 Proposições e sentenças abertas

A matemática é construída a partir de afirmações sobre objetos matemáticos. Para estudar como essas afirmações se relacionam e, posteriormente, como podemos justificá-las por meio de demonstrações, começamos pela noção de *proposição*.

Definição 1. *Uma proposição é uma sentença declarativa à qual se pode atribuir um único valor lógico: verdadeiro ou falso.*

É importante distinguir duas questões: primeiro, se uma determinada sentença é ou não uma proposição; segundo, caso seja uma proposição, se ela é verdadeira ou falsa. Em particular, uma proposição não precisa ser verdadeira.

Exemplo 1. *Considere as seguintes sentenças:*

1. O número 10 é par.
2. O número 10 é primo.
3. Qual é o valor de $2 + 3$?
4. Feche a porta.

As duas primeiras são proposições: a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A terceira é uma pergunta e a quarta é uma ordem; portanto, nenhuma das duas é uma proposição.

As proposições matemáticas podem ser representadas por letras, como p , q e r . Por exemplo, podemos escrever

$$p : \text{10 é par}, \quad q : \text{10 é primo}.$$

Nesse caso, p é verdadeira e q é falsa.

Nem toda sentença envolvendo símbolos matemáticos é uma proposição. Frequentemente encontramos expressões cujo valor lógico depende do valor atribuído a uma ou mais variáveis.

Definição 2. *Uma sentença aberta é uma sentença que contém uma ou mais variáveis livres e cujo valor lógico pode depender dos valores atribuídos a essas variáveis.*

Exemplo 2. *A sentença $x + 1 = 3$ não é uma proposição enquanto o valor de x não estiver especificado. Se tomarmos $x = 2$, obtemos $2 + 1 = 3$, que é uma proposição verdadeira; por outro lado, se tomarmos $x = 5$, obtemos $5 + 1 = 3$, que é uma proposição falsa. Portanto, $x + 1 = 3$ é uma sentença aberta.*

O conjunto no qual uma variável assume seus valores também é parte importante de uma afirmação matemática e deve ser especificado sempre que for relevante.

Exemplo 3. *Considere $x^2 + 1 > 0$, com $x \in \mathbb{R}$. Embora a desigualdade seja satisfeita por todo número real, a variável permanece livre; portanto, a expressão é uma sentença aberta, e não uma proposição. Mais adiante os quantificadores permitirão expressar que a propriedade vale para todo x .*

Uma proposição possui um valor lógico independentemente de ser fácil ou difícil determiná-lo. Por exemplo, “101 é primo” é uma proposição mesmo antes de verificarmos seus possíveis divisores. Reconhecer uma proposição é, portanto, diferente de demonstrar que ela é verdadeira.

Observação 1. *Testar casos fornece evidências, mas, em geral, não constitui uma demonstração. Por exemplo, $n^2 + n + 41$ é primo para muitos valores iniciais de n , mas para $n = 40$ obtemos $40^2 + 40 + 41 = 41^2$, que não é primo.*

Exercício 1. *Classifique cada sentença como proposição, sentença aberta ou nenhuma das duas. Quando for uma proposição, determine seu valor lógico.*

1. 11 é ímpar.
2. 15 é primo.
3. $x^2 = 9$.
4. $2x + 1 > 0$.
5. Qual é o valor de $\sqrt{16}$?
6. Calcule $10!$.
7. $0 < 1$.
8. $\sqrt{9} = -3$.

Exercício 2. *Considere a sentença aberta*

$$p(x) : x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Determine o valor lógico das proposições obtidas ao substituir $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ e $x = 4$. Para quais valores de $x \in \mathbb{R}$ a sentença $p(x)$ se torna verdadeira?

1.2 Conectivos lógicos

A partir de proposições simples podemos construir novas proposições por meio de *conectivos lógicos*. O valor lógico da proposição resultante é determinado pelos valores lógicos das proposições que a compõem. Começaremos com três operações fundamentais: negação, conjunção e disjunção.

1.2.1 Negação

Definição 3. *Se p é uma proposição, a negação de p , denotada por $\neg p$, é a proposição que é verdadeira quando p é falsa e falsa quando p é verdadeira.*

A expressão $\neg p$ pode ser lida como “não p ” ou “não é verdade que p ”. Assim, a negação troca o valor lógico de uma proposição.

Exemplo 4. Considere a proposição

$$p : 10 \text{ é par.}$$

Sua negação é $\neg p$: “10 não é par”. Nesse caso, p é verdadeira e $\neg p$ é falsa.

Negar corretamente uma sentença não significa simplesmente inserir a palavra “não” em algum ponto. A negação deve descrever precisamente todas as situações nas quais a sentença original é falsa.

Exemplo 5. A negação da sentença $x > 5$ não é $x < 5$, pois, quando $x = 5$, ambas são falsas. A negação correta é

$$x \leq 5.$$

Exemplo 6. As negações das sentenças

$$x = 2, \quad x \neq 4, \quad x < 7, \quad x \geq 0$$

são, respectivamente,

$$x \neq 2, \quad x = 4, \quad x \geq 7, \quad x < 0.$$

1.2.2 Conjunção

Definição 4. Se p e q são proposições, a conjunção de p e q , denotada por $p \wedge q$, é a proposição “ p e q ”. A conjunção é verdadeira somente quando p e q são ambas verdadeiras.

Exemplo 7. Considere as sentenças $p(x)$: “ $x > 0$ ” e $q(x)$: “ $x < 5$ ”. A conjunção $p(x) \wedge q(x)$ exige que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente e, portanto, corresponde a

$$0 < x < 5.$$

Observação 2. A conjunção possui a mesma ideia lógica da interseção de conjuntos. Se $p(x)$ significa “ $x \in A$ ” e $q(x)$ significa “ $x \in B$ ”, então

$$p(x) \wedge q(x) \iff x \in A \cap B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\wedge$ corresponde à ideia de $\cap$: em ambos os casos, exigimos que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente.

1.2.3 Disjunção

Definição 5. Se p e q são proposições, a disjunção de p e q , denotada por $p \vee q$, é a proposição “ p ou q ”. A disjunção é verdadeira quando pelo menos uma das proposições p e q é verdadeira.

Em matemática, salvo indicação em contrário, a palavra “ou” é utilizada no sentido *inclusivo*. Isso significa que $p \vee q$ também é verdadeira quando p e q são simultaneamente verdadeiras.

Exemplo 8. Considere p : “6 é par” e q : “ $6 > 0$ ”. Nesse caso, ambas são verdadeiras e, conseqüentemente, $p \vee q$ também é verdadeira. Esse exemplo ilustra que o “ou” matemático não exige que exatamente uma das proposições seja verdadeira.

Exemplo 9. Considere $p(x)$: “ $x < -2$ ” e $q(x)$: “ $x > 2$ ”. A disjunção $p(x) \vee q(x)$ corresponde à condição

$$x < -2 \quad \text{ou} \quad x > 2.$$

Ela é verdadeira, por exemplo, para $x = -5$ e para $x = 10$, mas é falsa para $x = 0$.

Observação 3. A disjunção possui a mesma ideia lógica da união de conjuntos. Se $p(x)$ significa “ $x \in A$ ” e $q(x)$ significa “ $x \in B$ ”, então

$$p(x) \vee q(x) \quad \longleftrightarrow \quad x \in A \cup B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\vee$ corresponde à ideia de $\cup$: em ambos os casos, basta que pelo menos uma das duas condições seja satisfeita.

1.3 Tabelas-verdade

As definições dos conectivos lógicos podem ser organizadas por meio de *tabelas-verdade*. Uma tabela-verdade apresenta o valor lógico de uma proposição composta para cada combinação possível dos valores lógicos de suas proposições componentes. Utilizaremos V para verdadeiro e F para falso.

Exemplo 10. A tabela-verdade da negação é

p	$\neg p$
V	F
F	V

Se temos duas proposições p e q , existem quatro combinações possíveis para seus valores lógicos:

$$(V, V), \quad (V, F), \quad (F, V), \quad (F, F).$$

Exemplo 11. As tabelas-verdade da conjunção e da disjunção podem ser apresentadas simultaneamente:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

A coluna de $p \wedge q$ confirma que uma conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras, enquanto a coluna de $p \vee q$ mostra que uma disjunção só é falsa quando ambas são falsas.

Também podemos construir tabelas-verdade para expressões que envolvem vários conectivos. Nesse caso, é conveniente introduzir colunas intermediárias e calcular a expressão em etapas.

Exemplo 12. Para construir a tabela-verdade de $\neg p \wedge q$, determinamos primeiro o valor de $\neg p$ e, em seguida, calculamos sua conjunção com q :

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

Exemplo 13. Considere agora a proposição $\neg(p \wedge q)$. Sua tabela-verdade é

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Por outro lado, para $\neg p \vee \neg q$, obtemos

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

As colunas finais coincidem. O mesmo procedimento, proposto nos exercícios, vale para $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$. Assim,

$$\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q.$$

Essas equivalências são as leis de De Morgan: ao negar uma conjunção ou disjunção, trocamos o conectivo e negamos cada proposição.

Exercício 3. Determine o valor lógico das proposições compostas abaixo, sabendo que p é verdadeira, q é falsa e r é verdadeira.

1. $\neg p$;
2. $p \wedge q$;
3. $p \vee q$;
4. $\neg q \wedge r$;
5. $p \wedge \neg r$;
6. $\neg p \vee (q \wedge r)$.

Exercício 4. Construa a tabela-verdade de cada proposição.

1. $p \wedge \neg q$;

2. $\neg p \vee q$;
3. $\neg(p \vee q)$;
4. $\neg p \wedge \neg q$;
5. $(p \vee q) \wedge \neg q$.

1.3.1 Tautologia, contradição e equivalência lógica

Ao construir a tabela-verdade de uma proposição composta, pode acontecer de a última coluna ser constante: sempre verdadeira ou sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Esses dois casos recebem nomes especiais.

Definição 6. Uma proposição composta é uma tautologia quando é verdadeira para toda atribuição de valores lógicos às proposições que a compõem. Ela é uma contradição quando é falsa para toda atribuição de valores lógicos.

Exemplo 14. As duas situações aparecem lado a lado na tabela:

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	V	F
F	V	V	F

$p \vee \neg p$ é uma tautologia, enquanto $p \wedge \neg p$ é uma contradição.

A maioria das proposições compostas não é tautologia nem contradição: seu valor lógico varia de acordo com os valores das proposições componentes. É o que ocorre, por exemplo, com $p \wedge q$ ou $p \Rightarrow q$.

A noção de tautologia permite definir precisamente quando duas proposições distintas possuem sempre o mesmo valor lógico.

Definição 7. Duas proposições A e B são logicamente equivalentes quando possuem o mesmo valor lógico para toda atribuição de valores às proposições que as compõem, isto é, quando suas tabelas-verdade coincidem. Nesse caso, escrevemos

$$A \Leftrightarrow B.$$

As leis de De Morgan obtidas anteriormente são exemplos de equivalências lógicas. Mais adiante veremos também $p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$.

1.4 Implicação

Definição 8. Se p e q são proposições, a implicação $p \Rightarrow q$ é a proposição lida como “se p , então q ”. A proposição p é chamada de antecedente e q de conseqüente.

A implicação merece um pouco mais de atenção que os conectivos anteriores, pois seu valor lógico pode parecer menos intuitivo à primeira vista. A afirmação

$$p \Rightarrow q$$

estabelece uma regra: sempre que p ocorrer, q também deve ocorrer. Assim, para que essa regra seja falsa, precisamos encontrar uma situação em que o antecedente p seja verdadeiro, mas o consequente q seja falso.

Exemplo 15. Considere a seguinte regra:

Se um aluno obtiver nota maior ou igual a 7, então ele será aprovado.

Defina

p : O aluno obteve nota maior ou igual a 7

e

q : O aluno foi aprovado.

Há quatro situações possíveis. Se o aluno obteve nota maior ou igual a 7 e foi aprovado, a regra foi cumprida. Se obteve nota maior ou igual a 7 e não foi aprovado, a regra foi violada e, portanto, a implicação é falsa.

Agora suponha que o aluno tenha obtido nota menor que 7. Nesse caso, a regra não determina o que deve acontecer: ela não diz que alunos com nota menor que 7 devem ser reprovados. Portanto, tanto um aluno com nota menor que 7 que seja aprovado quanto um aluno com nota menor que 7 que seja reprovado não contradizem a regra estabelecida.

Esse exemplo revela a ideia fundamental por trás da implicação: a afirmação $p \Rightarrow q$ não diz o que deve acontecer quando p é falsa. Ela apenas proíbe a situação em que p é verdadeira e q é falsa.

Podemos resumir as quatro possibilidades da seguinte maneira:

p	q	$p \Rightarrow q$	Interpretação
V	V	V	a regra foi cumprida
V	F	F	a regra foi violada
F	V	V	a regra não foi violada
F	F	V	a regra não foi violada

Definição 9. Um contraexemplo para uma implicação

$$p \Rightarrow q,$$

é um caso em que p é verdadeira e q é falsa. Exibir um contraexemplo é suficiente para refutar a implicação.

Exemplo 16. Considere a afirmação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par}.$$

Para que essa afirmação fosse falsa, precisaríamos encontrar um número que fosse múltiplo de 4 e, ao mesmo tempo, não fosse par. Como não existe tal número, a implicação é verdadeira.

Observe que números que não são múltiplos de 4 não podem refutar a afirmação. Por exemplo, 6 é par e não é múltiplo de 4, enquanto 3 não é par nem múltiplo de 4; nenhum desses casos contradiz a regra de que todo múltiplo de 4 é par.

Exercício 5. Determine se cada uma das implicações abaixo é verdadeira ou falsa. Quando for falsa, apresente um valor que mostre que a implicação falha.

1. Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.
2. Se n é múltiplo de 3, então n é múltiplo de 6.
3. Se $x > 5$, então $x > 2$.
4. Se $x > 2$, então $x > 5$.
5. Se $x = 3$, então $x^2 = 9$.
6. Se $x^2 = 9$, então $x = 3$.

1.4.1 Recíproca e contrapositiva

Uma implicação pode dar origem a outras proposições relacionadas a ela. Duas delas aparecem com frequência em matemática: a *recíproca* e a *contrapositiva*. É importante distinguir essas construções, pois elas possuem propriedades bastante diferentes.

Definição 10. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua recíproca é a proposição

$$q \Rightarrow p.$$

A recíproca é obtida simplesmente trocando o antecedente e o conseqüente. Entretanto, a validade de uma implicação não garante a validade de sua recíproca.

A contrapositiva é construída de maneira diferente. Além de inverter a ordem das proposições, negamos ambas.

Definição 11. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua contrapositiva é a proposição

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Exemplo 17. Considere a implicação $x > 4 \Rightarrow x^2 > 16$, com $x \in \mathbb{R}$. As três formas ficam reunidas em um único quadro:

Forma	Afirmação
Original	$x > 4 \Rightarrow x^2 > 16$
Recíproca	$x^2 > 16 \Rightarrow x > 4$
Contrapositiva	$x^2 \leq 16 \Rightarrow x \leq 4$

A original e a contrapositiva são verdadeiras. A recíproca é falsa, pois $x = -5$ satisfaz $x^2 > 16$, mas não satisfaz $x > 4$.

A contrapositiva possui uma propriedade fundamental: ela sempre tem o mesmo valor lógico que a implicação original. Podemos verificar isso por meio de uma tabela-verdade.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Observe que as duas últimas colunas são idênticas. Assim, em qualquer situação em que $p \Rightarrow q$ seja verdadeira, sua contrapositiva também é verdadeira; e na única situação em que a implicação original é falsa, a contrapositiva também é falsa.

Exemplo 18. Considere

$$x^2 > 9 \Rightarrow |x| > 3.$$

Sua contrapositiva é

$$|x| \leq 3 \Rightarrow x^2 \leq 9.$$

As duas afirmações expressam, de maneiras diferentes, a mesma relação lógica.

Essa relação será particularmente importante quando estudarmos demonstrações. Em muitos problemas, demonstrar diretamente que $p \Rightarrow q$ pode ser difícil, enquanto demonstrar sua contrapositiva $\neg q \Rightarrow \neg p$ pode ser mais simples.

1.4.2 Equivalência e negação de uma implicação

Como vimos, $p \Rightarrow q$ é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa. Essa caracterização permite obter uma forma equivalente para a implicação e, em seguida, sua negação.

Considere a proposição

$$\neg p \vee q.$$

Se p é falsa, então $\neg p$ é verdadeira e, portanto, a disjunção $\neg p \vee q$ é verdadeira independentemente do valor lógico de q . Se p é verdadeira, então $\neg p$ é falsa, e o valor da disjunção passa a depender de q : ela será falsa somente quando q também for falsa.

Esse é exatamente o comportamento de $p \Rightarrow q$.

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \Rightarrow q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, as proposições $p \Rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ possuem sempre o mesmo valor lógico.

Exemplo 19. Considere

$$p: x > 5, \quad q: x > 0.$$

A implicação $p \Rightarrow q$ é “se $x > 5$, então $x > 0$ ”. A proposição $\neg p \vee q$ pode ser escrita como

$$x \leq 5 \text{ ou } x > 0.$$

Embora as duas frases pareçam bastante diferentes quando escritas em linguagem natural, suas tabelas-verdade são iguais.

Essa forma de representar uma implicação será útil posteriormente para manipular expressões lógicas e demonstrar relações entre proposições.

Saber negar corretamente uma implicação é especialmente importante. Como a única situação que a torna falsa é aquela em que p ocorre e q não ocorre, sua negação deve descrever justamente essa situação.

Assim, $\neg(p \Rightarrow q)$ possui o mesmo valor lógico que $p \wedge \neg q$.

Exemplo 20. Considere a afirmação

$$\text{Se } x > 3, \text{ então } x^2 > 9.$$

Sua negação é

$$x > 3 \text{ e } x^2 \leq 9.$$

Não devemos inverter a implicação nem negar separadamente suas duas partes. Mantemos o antecedente $x > 3$ e negamos o consequente completamente: $\neg(x^2 > 9)$ é $x^2 \leq 9$.

Podemos verificar essa relação diretamente por meio de uma tabela-verdade:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg(p \Rightarrow q)$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, a única maneira de negar uma implicação é afirmar que seu antecedente é verdadeiro e seu consequente é falso.

Quando introduzirmos quantificadores, essa ideia permitirá negar afirmações como “para todo n , se $p(n)$ ocorre, então $q(n)$ ocorre”. Nesse caso, além de negar a implicação, teremos de tratar cuidadosamente o quantificador.

Exercício 6. Para cada uma das afirmações abaixo:

1. escreva a recíproca;
 2. escreva a contrapositiva;
 3. escreva a negação.
1. Se um inteiro é múltiplo de 10, então ele é par.
 2. Se $x > 3$, então $x > 1$.
 3. Se n é ímpar, então $n + 1$ é par.

1.5 Quantificadores

Uma sentença aberta, como $x^2 = 4$, não possui um valor lógico enquanto a variável x permanecer livre. Duas maneiras fundamentais de transformar essa sentença em uma proposição são afirmar que ela vale para todos os elementos de um conjunto ou afirmar que ela vale para pelo menos um elemento desse conjunto.

Por exemplo, considere as afirmações

$$x^2 = 4 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}$$

e

$$x^2 = 4 \text{ para algum } x \in \mathbb{R}.$$

A primeira é falsa, pois existem números reais cujo quadrado não é 4. A segunda é verdadeira, pois, por exemplo, $2^2 = 4$. As expressões “para todo” e “para algum” são representadas por meio de *quantificadores*.

Como vimos ao estudar sentenças abertas, o domínio é parte da afirmação e deve permanecer explícito nas proposições quantificadas.

1.5.1 Quantificador universal

O símbolo $\forall$ é chamado de *quantificador universal* e pode ser lido como “para todo”, “para cada” ou “qualquer que seja”.

Definição 12. *Seja $p(x)$ uma sentença aberta, com x variando em um conjunto A . A proposição*

$$\forall x \in A, \quad p(x)$$

afirma que $p(x)$ é verdadeira para todos os elementos de A .

Para que uma proposição universal seja verdadeira, nenhum elemento do domínio pode deixar de satisfazer a propriedade apresentada.

Exemplo 21. *A proposição*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0$$

pode ser lida como “para todo número real x , temos $x^2 \geq 0$ ”. Ela é verdadeira, pois o quadrado de qualquer número real é não negativo.

Exemplo 22. *Considere a proposição*

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad p \text{ é primo} \Rightarrow p \text{ é ímpar}.$$

Ela afirma que todo número natural primo é ímpar. Essa proposição é falsa: 2 é primo, mas não é ímpar.

O número 2 é um contraexemplo, pois satisfaz a condição de ser primo, mas não satisfaz a conclusão da afirmação.

Assim, basta um contraexemplo para mostrar que uma proposição universal é falsa. Por outro lado, verificar apenas alguns elementos do domínio não é, em geral, suficiente para concluir que ela é verdadeira.

Exemplo 23. Considere a proposição

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 + n \text{ é par.}$$

Podemos calcular

$$1^2 + 1 = 2, \quad 2^2 + 2 = 6, \quad 3^2 + 3 = 12$$

e observar que os resultados são pares. Essas verificações fornecem evidências, mas não analisam todos os números inteiros.

Para justificar a afirmação de maneira geral, observamos que

$$n^2 + n = n(n + 1).$$

Os números n e $n + 1$ são consecutivos; portanto, um deles é par. Logo, o produto $n(n + 1)$ é par para qualquer $n \in \mathbb{Z}$.

Exercício 7. Determine quais proposições são verdadeiras. Para cada proposição falsa, apresente um contraexemplo.

1. $\forall n \in \mathbb{Z}, n + 1 > n$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > n$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > x$.
5. Todo múltiplo de 6 é múltiplo de 3.
6. Todo número ímpar é primo.

1.5.2 Quantificador existencial

O símbolo $\exists$ é chamado de *quantificador existencial* e pode ser lido como “existe”, “existe pelo menos um” ou “para algum”.

Definição 13. Seja $p(x)$ uma sentença aberta, com x variando em um conjunto A . A proposição

$$\exists x \in A, \quad p(x)$$

afirma que existe pelo menos um elemento de A para o qual $p(x)$ é verdadeira.

Para justificar que uma proposição existencial é verdadeira, basta exibir um elemento do domínio que possua a propriedade desejada.

Definição 14. Uma testemunha para uma proposição existencial

$$\exists x \in A, \quad p(x)$$

é um elemento $a \in A$ para o qual $p(a)$ é verdadeira.

Exemplo 24. A proposição

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 49$$

é verdadeira. O número 7 é uma testemunha, pois $7 \in \mathbb{Z}$ e $7^2 = 49$. O número -7 também é uma testemunha, mas apenas uma delas seria suficiente para estabelecer a existência.

Observação 4. O quantificador existencial afirma que existe pelo menos um elemento com determinada propriedade. Ele não afirma que esse elemento é único. Para expressar existência e unicidade simultaneamente, utiliza-se o símbolo $\exists!$, lido como “existe um único”.

Exemplo 25. A proposição

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = -1$$

é falsa, pois $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Entretanto, a proposição

$$\exists z \in \mathbb{C}, \quad z^2 = -1$$

é verdadeira: o número complexo i é uma testemunha. Esse exemplo mostra que uma mudança no domínio pode alterar o valor lógico da proposição.

Mostrar que uma proposição existencial é falsa exige mostrar que nenhum elemento do domínio pode servir como testemunha. Assim como no caso universal, experimentar apenas alguns valores não é suficiente quando o domínio é infinito.

Exemplo 26. A proposição

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n = 5$$

é falsa. De fato, $2n$ é par para todo número inteiro n , enquanto 5 é ímpar. Portanto, nenhum inteiro pode satisfazer a igualdade.

Exercício 8. Determine o valor lógico de cada proposição. Quando ela for verdadeira, apresente uma testemunha. Quando for falsa, explique por que nenhuma testemunha pode existir.

1. $\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 81$.
2. $\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n = 7$.
3. $\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 - 5x + 6 = 0$.
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 = 0$.
5. Existe um número natural que é simultaneamente par e ímpar.
6. Existe um número primo que é par.

1.5.3 Ordem dos quantificadores

Uma proposição pode conter mais de um quantificador. Nesses casos, a ordem em que os quantificadores aparecem é importante.

Considere as frases:

Todo aluno leu algum livro.

e

Existe um livro que todos os alunos leram.

Na primeira frase, cada aluno pode ter lido um livro diferente. Na segunda, deve existir um único livro que tenha sido lido por todos. Portanto, as duas frases não expressam a mesma afirmação.

Se A representa o conjunto dos alunos, L o conjunto dos livros e $p(a, l)$ a sentença “o aluno a leu o livro l ”, então as frases podem ser representadas, respectivamente, por

$$\forall a \in A, \exists l \in L, \quad p(a, l)$$

e

$$\exists l \in L, \forall a \in A, \quad p(a, l).$$

Exemplo 27. A proposição

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0$$

é verdadeira. De fato, dado qualquer número real x , podemos escolher $y = -x$. A escolha de y pode depender do valor de x .

Por outro lado, a proposição

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0$$

é falsa. Ela exigiria um único número real y que funcionasse para todos os valores de x . Dado qualquer candidato y , podemos escolher $x = 1 - y$ e obter $x + y = 1$, e não 0.

Quando dois quantificadores do mesmo tipo aparecem em sequência, sua ordem não produz essa diferença. Por exemplo,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad x + y = y + x$$

possui o mesmo significado se trocarmos a ordem de x e y . A mudança de sentido é especialmente importante quando quantificadores universais e existenciais são combinados.

Exercício 9. Explique em palavras a diferença entre cada par de proposições e determine se elas são verdadeiras ou falsas.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$;
 $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x < y$.
2. $\forall n \in \mathbb{Z}, \exists m \in \mathbb{Z}, m > n$;
 $\exists m \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}, m > n$.
3. Todo aluno resolveu algum exercício;
existe um exercício que todos os alunos resolveram.

1.5.4 Negação de proposições quantificadas

Para negar corretamente uma proposição quantificada, devemos descrever a situação exata em que ela é falsa.

Considere a afirmação:

Todos os alunos entregaram o trabalho.

Para que ela seja falsa, deve existir pelo menos um aluno que não entregou o trabalho. Portanto, sua negação é:

Existe um aluno que não entregou o trabalho.

De modo geral, a negação de uma proposição universal é uma proposição existencial:

$$\neg(\forall x \in A, p(x)) \iff \exists x \in A, \neg p(x).$$

Agora considere:

Existe um aluno que entregou o trabalho.

Para que essa afirmação seja falsa, todos os alunos devem ter deixado de entregar o trabalho. Assim, sua negação é:

Todos os alunos não entregaram o trabalho.

ou, de maneira mais natural,

Nenhum aluno entregou o trabalho.

De modo geral, a negação de uma proposição existencial é uma proposição universal:

$$\neg(\exists x \in A, p(x)) \iff \forall x \in A, \neg p(x).$$

Exemplo 28. A negação de

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 2$$

é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 \neq 2.$$

Não basta trocar $\exists$ por $\forall$; também é necessário negar a igualdade.

Combinando a negação de quantificadores com a negação de uma implicação, obtemos a regra geral

$$\neg(\forall x \in A, p(x) \Rightarrow q(x)) \iff \exists x \in A, p(x) \wedge \neg q(x).$$

Em palavras, existe um elemento que satisfaz o antecedente, mas não o consequente.

Exemplo 29. A negação de

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad xy = 1$$

é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad xy \neq 1.$$

A negação é verdadeira: $x = 0$ faz com que $xy = 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$.

Exercício 10. Escreva a negação de cada proposição, sem utilizar a expressão “não é verdade que”.

1. Todo número natural é par.
2. Existe um número real cujo quadrado é 3.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x + 1 > x$.
4. $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 = -4$.
5. Todo número primo é ímpar.
6. Existe um aluno que resolveu todos os exercícios.

Exercício 11. Negue corretamente cada proposição.

1. $\forall n \in \mathbb{Z}, n \text{ é par} \Rightarrow n^2 \text{ é par}$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, x > 0 \wedge x^2 < 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$.
4. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0$.

1.5.5 Contrapositiva sob quantificadores e negação

A contraposição é uma equivalência entre implicações. Para cada valor fixado de x , temos

$$P(x) \Rightarrow Q(x) \iff \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x).$$

Por isso, podemos substituir uma forma pela outra dentro de qualquer quantificador. Em particular,

$$\forall x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x) \iff \forall x \in A, \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x),$$

$$\exists x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x) \iff \exists x \in A, \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x).$$

O quantificador permanece porque não negamos a proposição completa: apenas substituímos sua expressão interna por outra logicamente equivalente.

Isso é diferente de negar a proposição inteira. Quando a negação atravessa o quantificador, $\forall$ e $\exists$ trocam entre si; além disso, a negação da implicação é uma conjunção. Assim,

$$\neg(\forall x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x)) \iff \exists x \in A, P(x) \wedge \neg Q(x),$$

$$\neg(\exists x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x)) \iff \forall x \in A, P(x) \wedge \neg Q(x).$$

Exemplo 30. Considere

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = 1 \Rightarrow x = 1.$$

Sua contrapositiva equivalente é

$$\forall x \in \mathbb{R}, x \neq 1 \Rightarrow x^2 \neq 1,$$

enquanto sua negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 1 \wedge x \neq 1.$$

A afirmação original e sua contrapositiva são falsas: $x = -1$ é um contraexemplo para ambas. A negação é verdadeira, e o mesmo valor $x = -1$ é uma testemunha.

1.6 Exercícios resolvidos de revisão

Os exercícios desta seção integram os conceitos do capítulo. As soluções são apresentadas em detalhes para servir como modelo de organização do raciocínio e da escrita matemática.

Exercício 1 — Funções booleanas. Sejam p , q e r proposições. Para cada uma das operações booleanas abaixo:

1. escreva uma proposição equivalente utilizando apenas os conectivos $\neg$, $\wedge$ e $\vee$;
 2. construa uma tabela-verdade para verificar sua resposta.
- (a) **Ou exclusivo** — $\text{XOR}(p, q)$. É verdadeiro quando exatamente uma das proposições p e q é verdadeira.
- (b) **Não-e** — $\text{NAND}(p, q)$. É falso somente quando p e q são simultaneamente verdadeiras.
- (c) **Não-ou** — $\text{NOR}(p, q)$. É verdadeiro somente quando p e q são simultaneamente falsas.
- (d) **Equivalência** — $\text{XNOR}(p, q)$. É verdadeiro quando p e q possuem o mesmo valor lógico.
- (e) **Maioria** — $\text{MAJ}(p, q, r)$. É verdadeiro quando pelo menos duas das três proposições são verdadeiras.
- (f) **Condiciona** — $\text{COND}(p, q, r)$. Possui o valor de q quando p é verdadeira e o valor de r quando p é falsa.

Solução do Exercício 1. Para cada item, escrevemos a operação booleana em termos de $\neg$, $\wedge$ e $\vee$ e, em seguida, construímos uma tabela-verdade que confirma que a expressão obtida possui exatamente o comportamento descrito no enunciado.

Item (a) — Ou exclusivo. O ou exclusivo é verdadeiro quando uma das proposições é verdadeira e a outra é falsa. Portanto,

$$\text{XOR}(p, q) \iff (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q).$$

Uma forma equivalente de escrevê-lo é

$$\text{XOR}(p, q) \iff (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

A tabela-verdade abaixo confirma a primeira expressão:

p	q	$p \wedge \neg q$	$\neg p \wedge q$	$\text{XOR}(p, q)$
V	V	F	F	F
V	F	V	F	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	F

De fato, $\text{XOR}(p, q)$ é verdadeiro exatamente quando p e q possuem valores lógicos distintos.

Item (b) — Não-e. A operação não-e é, por definição, a negação da conjunção:

$$\text{NAND}(p, q) \iff \neg(p \wedge q).$$

A tabela-verdade correspondente é

p	q	$p \wedge q$	$\text{NAND}(p, q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

A última coluna confirma que $\text{NAND}(p, q)$ é falso somente quando p e q são simultaneamente verdadeiras, como pede o enunciado.

Item (c) — Não-ou. Analogamente, a operação não-ou é a negação da disjunção:

$$\text{NOR}(p, q) \iff \neg(p \vee q).$$

A tabela-verdade correspondente é

p	q	$p \vee q$	$\text{NOR}(p, q)$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V

A última coluna confirma que $\text{NOR}(p, q)$ é verdadeiro somente quando p e q são simultaneamente falsas.

Item (d) — Equivalência. A equivalência é verdadeira quando as duas proposições possuem o mesmo valor lógico, ou seja, quando são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Assim,

$$\text{XNOR}(p, q) \iff (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).$$

A tabela-verdade correspondente é

p	q	$p \wedge q$	$\neg p \wedge \neg q$	$\text{XNOR}(p, q)$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	F	F	F
F	F	F	V	V

A última coluna confirma que $\text{XNOR}(p, q)$ é verdadeiro exatamente quando p e q possuem o mesmo valor lógico. Observe que $\text{XNOR}(p, q)$ é, portanto, a negação de $\text{XOR}(p, q)$.

Item (e) — Maioria. Para que pelo menos duas entre p , q e r sejam verdadeiras, deve ocorrer pelo menos uma das conjunções $p \wedge q$, $p \wedge r$ ou $q \wedge r$. Logo,

$$\text{MAJ}(p, q, r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (q \wedge r).$$

Como agora há três proposições, a tabela-verdade possui $2^3 = 8$ linhas:

p	q	r	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$q \wedge r$	$\text{MAJ}(p, q, r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

A última coluna é verdadeira exatamente nas quatro linhas em que pelo menos duas das proposições p , q e r são verdadeiras.

Item (f) — Condicional. Na operação condicional, usamos q quando p é verdadeira e r quando p é falsa. Portanto,

$$\text{COND}(p, q, r) \iff (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r).$$

A tabela-verdade correspondente é

p	q	r	$\neg p$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge r$	$\text{COND}(p, q, r)$
V	V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	V	F	V
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F
F	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	F	F

Comparando com a tabela do item (e), observe que, nas quatro linhas em que p é verdadeira, a última coluna coincide com a coluna de q ; nas quatro linhas em que p é falsa, ela coincide com a coluna de r — exatamente o comportamento descrito no enunciado.

Este exercício mostra que uma tabela-verdade pode ser usada tanto para analisar uma expressão lógica quanto para verificar que uma proposição construída a partir de $\neg$, $\wedge$ e $\vee$ reproduz um comportamento lógico previamente especificado.

Exercício 2 — Quantificadores e implicação. Para cada afirmação abaixo:

1. escreva-a utilizando quantificadores;

2. determine seu valor lógico;
 3. justifique sua resposta por meio de um argumento, uma testemunha ou um contraexemplo, conforme o caso;
 4. quando houver uma implicação, escreva também sua contrapositiva, prestando atenção ao escopo dos quantificadores;
 5. escreva a negação da afirmação.
- (a) Existe um número natural cujo quadrado é maior que 100.
 - (b) Existe um número inteiro n tal que $2n + 1$ é par.
 - (c) Se um número inteiro é par, então ele é múltiplo de 4.
 - (d) Se um número real x é maior que 1, então $x^2 > x$.
 - (e) Para todo $x \in \mathbb{R}$, se $x^2 < 0$, então $x = 7$.
 - (f) Se um número natural p é primo e $p > 2$, então p é ímpar.
 - (g) Se um número inteiro é múltiplo de 6, então ele é múltiplo de 2 e de 3.
 - (h) Existe um número real x tal que $x < 0$ e $x^2 < 0$.
 - (i) Para todo número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$.
 - (j) Para todo número real x , existe um número real y tal que $y^2 = x$.
 - (k) Existe um número real y tal que, para todo número real x , temos $x + y = 0$.
 - (l) Existe $x \in \mathbb{R}$ tal que, se $x > 2$, então $x^2 > 4$.
 - (m) Seja $S \subseteq \mathbb{Z}$. Se existe um múltiplo de 4 em S , então existe um número par em S .

Solução do Exercício 2. Para cada item, traduzimos a afirmação em símbolos, determinamos seu valor lógico e justificamos essa resposta. Quando há uma implicação, escrevemos sua contrapositiva respeitando o escopo dos quantificadores; em todos os casos, escrevemos a negação.

Item (a). Em símbolos,

$$\exists n \in \mathbb{N}, \quad n^2 > 100.$$

A afirmação é **verdadeira**. Uma testemunha é $n = 11$, pois $11^2 = 121 > 100$.

A negação é

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n^2 \leq 100.$$

Item (b). Em símbolos,

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n + 1 \text{ é par.}$$

A afirmação é **falsa**. Para todo $n \in \mathbb{Z}$, $2n$ é par e, portanto, $2n + 1$ é ímpar. Logo, nenhuma testemunha pode existir.

A negação é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad 2n + 1 \text{ não é par,}$$

que é verdadeira.

Item (c). Em símbolos,

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é par} \Rightarrow n \text{ é múltiplo de 4.}$$

A afirmação é **falsa**. Um contraexemplo é $n = 6$: ele é par, mas não é múltiplo de 4.

A contrapositiva equivalente é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ não é múltiplo de 4} \Rightarrow n \text{ não é par.}$$

Ela também é falsa para $n = 6$.

A negação é

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é par} \wedge n \text{ não é múltiplo de 4,}$$

que é verdadeira, testemunhada por $n = 6$.

Item (d). Em símbolos,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x > 1 \Rightarrow x^2 > x.$$

A afirmação é **verdadeira**. Se $x > 1$, então $x > 0$ e $x - 1 > 0$; logo, $x(x - 1) > 0$, isto é, $x^2 > x$.

A contrapositiva equivalente é

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \leq x \Rightarrow x \leq 1.$$

A negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x > 1 \wedge x^2 \leq x,$$

que é falsa pelo argumento acima.

Item (e). Em símbolos,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 < 0 \Rightarrow x = 7.$$

A afirmação é **verdadeira por vacuidade**: não existe $x \in \mathbb{R}$ para o qual $x^2 < 0$. Portanto, não há caso em que o antecedente seja verdadeiro e o consequente falso.

A contrapositiva equivalente é

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \neq 7 \Rightarrow x^2 \geq 0,$$

que também é verdadeira.

A negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 < 0 \wedge x \neq 7,$$

que é falsa.

Item (f). Em símbolos,

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad (p \text{ é primo} \wedge p > 2) \Rightarrow p \text{ é ímpar.}$$

A afirmação é **verdadeira**. O único primo par é 2; portanto, um primo maior que 2 só pode ser ímpar.

Negando a conjunção do antecedente por De Morgan, obtemos a contrapositiva

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad p \text{ é par} \Rightarrow (p \text{ não é primo} \vee p \leq 2).$$

A negação é

$$\exists p \in \mathbb{N}, \quad p \text{ é primo} \wedge p > 2 \wedge p \text{ não é ímpar,}$$

que é falsa.

Item (g). Em símbolos,

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é múltiplo de } 6 \Rightarrow (n \text{ é múltiplo de } 2 \wedge n \text{ é múltiplo de } 3).$$

A afirmação é **verdadeira**. Se $n = 6k$, então $n = 2(3k) = 3(2k)$; logo, n é múltiplo de 2 e de 3.

Negando a conjunção do consequente, a contrapositiva é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad (n \text{ não é múltiplo de } 2 \vee n \text{ não é múltiplo de } 3) \Rightarrow n \text{ não é múltiplo de } 6.$$

A negação é

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ é múltiplo de } 6 \wedge (n \text{ não é múltiplo de } 2 \vee n \text{ não é múltiplo de } 3),$$

que é falsa.

Item (h). Em símbolos,

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x < 0 \wedge x^2 < 0.$$

A afirmação é **falsa**, pois $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

A negação, usando De Morgan, é

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \geq 0 \vee x^2 \geq 0,$$

que é verdadeira; o segundo termo da disjunção já é sempre verdadeiro.

Item (i). Em símbolos,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0.$$

A afirmação é **verdadeira**: dado $x \in \mathbb{R}$, podemos escolher $y = -x$. A testemunha pode depender do valor de x .

A negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad x + y \neq 0,$$

que é falsa, pois para qualquer x podemos tomar $y = -x$.

Item (j). Em símbolos,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad y^2 = x.$$

A afirmação é **falsa**. Um contraexemplo é $x = -1$, pois não existe $y \in \mathbb{R}$ tal que $y^2 = -1$.

A negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad y^2 \neq x,$$

que é verdadeira, testemunhada por $x = -1$.

Item (k). Em símbolos,

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0.$$

A afirmação é **falsa**. Dado qualquer candidato y , podemos escolher $x = 1 - y$ e obter $x + y = 1$, e não 0.

A negação é

$$\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, \quad x + y \neq 0,$$

que é verdadeira: para cada y , a escolha $x = 1 - y$ produz $x + y = 1$.

Item (l). Em símbolos,

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x > 2 \Rightarrow x^2 > 4.$$

A afirmação é **verdadeira**; por exemplo, $x = 3$ é uma testemunha. Aplicando a contrapositiva dentro do quantificador existencial, obtemos a afirmação equivalente

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \leq 4 \Rightarrow x \leq 2.$$

O quantificador permanece existencial porque apenas substituímos a implicação interna por outra equivalente. O mesmo $x = 3$ também testemunha a contrapositiva, pois seu antecedente é falso.

Ao negar a proposição inteira, o quantificador muda:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x > 2 \wedge x^2 \leq 4.$$

Essa negação é falsa; por exemplo, $x = 0$ não satisfaz $x > 2$.

Item (m). Em símbolos, a afirmação é

$$(\exists n \in S, \quad 4 \mid n) \Rightarrow (\exists m \in S, \quad 2 \mid m).$$

Ela é **verdadeira** para todo $S \subseteq \mathbb{Z}$. Se $n \in S$ é múltiplo de 4, então é par; o mesmo elemento pode ser usado como testemunha no consequente.

A contrapositiva da implicação inteira é

$$\neg(\exists m \in S, \quad 2 \mid m) \Rightarrow \neg(\exists n \in S, \quad 4 \mid n),$$

ou, sem negações diante dos quantificadores,

$$(\forall m \in S, \quad 2 \nmid m) \Rightarrow (\forall n \in S, \quad 4 \nmid n).$$

A negação da afirmação original é

$$(\exists n \in S, \quad 4 \mid n) \wedge (\forall m \in S, \quad 2 \nmid m),$$

que é falsa: um múltiplo de 4 é necessariamente par.

Este exercício reúne as principais ferramentas do capítulo: tradução de afirmações em quantificadores, determinação de valores lógicos por meio de argumentos, testemunhas e contraexemplos, construção de contrapositivas e negação de implicações, conectivos e quantificadores. Os últimos itens também destacam a ordem dos quantificadores e a diferença entre aplicar uma equivalência dentro de um quantificador e negar uma proposição inteira.