Materiales y métodos y Resultados

Efectos neurobiológicos a largo plazo de la exposición a *Stevia rebaudiana* durante la etapa juvenil y la adultez

Thiago Sayegh — IByME-CONICET

Versión para revisión de la Dra. M. S. Kruse — octubre de 2026

Cómo leer este documento. Son las secciones 4 y 5 de la tesis, seguidos del Anexo A (que ambos citan) y de su propia lista de referencias (solo las que se citan en estas secciones, numeradas por orden de aparición, por lo que los números difieren de los de la tesis completa). Las referencias a otras secciones (por ejemplo, §3.4) conservan la numeración de la tesis. Lo que falta o hay que verificar está marcado en color: **[PENDIENTE:** falta redactar o conseguir un dato**]** y **[CONFIRMAR:** dato a confirmar con la tutora**]**.

4. Materiales y métodos

4.1. Animales de experimentación

Los procedimientos con animales fueron aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME-CONICET, Argentina; protocolo 19/2025), de acuerdo con los lineamientos para el cuidado y uso de animales de laboratorio del Consejo de la Comunidad Europea (86/609/CEE) y del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH). Se utilizaron ratas macho Sprague-Dawley, alojadas en grupos de 3 a 4 animales por caja y mantenidas en un ciclo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad, con alimento balanceado (Gepsa, Grupo Pilar S.A., Argentina) y agua disponibles *ad libitum*.

Durante un período de 25 días, ratas de 25 días de edad (PD25; grupo juvenil) y ratas de 75 días de edad (PD75; grupo adulto) tuvieron acceso irrestricto a agua (grupos control) o la opción de beber, además de agua, una solución de sacarosa al 10 % (p/v; grupos sacarosa) o un extracto acuoso de *Stevia rebaudiana* Bertoni al 4 % (v/v; grupos stevia) *ad libitum*. Las soluciones se renovaron día por medio. Finalizado este período de 25 días de exposición, se retiraron las botellas con la solución de sacarosa o de stevia y todos los animales bebieron únicamente agua durante otros 25 días (Figura 4.1) [1, 2]. Al finalizar el protocolo, los animales fueron evaluados en las pruebas conductuales: *open field* (OF), reconocimiento de objeto novedoso (NOR) y reconocimiento espontáneo de posición (SLR). Luego de las pruebas, un subgrupo de animales de los grupos control y sacarosa fue perfundido para los estudios de inmunocitoquímica (§4.4).

El consumo de agua, de solución endulzada (sacarosa o stevia) y de alimento se registró día por medio durante todo el período experimental, y el peso corporal, dos veces por semana. El consumo se midió por caja y se normalizó al peso corporal total de los animales alojados en ella (mL o g por g de peso corporal por día); por lo tanto, la caja se consideró la unidad experimental en todos los análisis de consumo.




Figura 4.1. Línea temporal de los procedimientos experimentales. Durante 25 días, ratas PD25 (grupo juvenil) y PD75 (grupo adulto) tuvieron acceso irrestricto a agua (control) o la opción de beber, además de agua, una solución de sacarosa al 10 % o un extracto de stevia al 4 %. Luego, todos los animales bebieron únicamente agua durante otros 25 días, tras lo cual se realizaron las pruebas conductuales y los estudios de inmunocitoquímica.

4.2. Preparación y caracterización de la infusión de stevia

Las hojas de *Stevia rebaudiana* Bertoni se obtuvieron de Caña Dulce® (San Ignacio, Misiones, Argentina), con certificación de Argencert, Argentina (R.P.A.A. N.º MI000348 y R.P.E.A. N.º MI000097). El extracto de stevia se preparó según un método descrito previamente [3], adaptado de Sharma et al. [4], elegido por su alto rendimiento de glucósidos de esteviol [5] y por su similitud con los procedimientos de preparación orientados a la salud. Se hirvieron 20 g de hojas de stevia en 1 L de agua durante 10 min, se dejó reposar 20 min, se filtró y se volvió a hervir durante 45–50 min hasta reducir el volumen a 300 mL. El extracto se fraccionó en alícuotas de 40 mL, que se almacenaron a −20 °C; las alícuotas se descongelaron día por medio y se diluyeron a 1 L (4 % v/v). La solución de sacarosa al 10 % (p/v; Ledesma, Argentina) se preparó en agua. Estas concentraciones se eligieron sobre la base de estudios previos y del consumo voluntario de los animales [1–3, 6].

La caracterización química del extracto de stevia fue realizada por el Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones (Argentina), siguiendo protocolos establecidos [5, 7]. El contenido de glucósidos de esteviol se determinó por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). Los compuestos fenólicos totales y los taninos se cuantificaron con un espectrofotocolorímetro y la actividad antioxidante se evaluó mediante el ensayo de captación del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). La composición del extracto se resume en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Composición química del extracto de stevia. Los valores se expresan como media ± SEM ($n = 3$). DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo; GAE: equivalentes de ácido gálico; QE: equivalentes de quercetina; IC_{50}: concentración inhibitoria media.

Componente	Valor
Esteviósido	3,80 ± 0,29 mg/mL
Rebaudiósido A	1,47 ± 0,10 mg/mL
Rebaudiósido C	0,25 ± 0,02 mg/mL
Glucósidos de esteviol totales	5,52 ± 0,42 mg/mL
Fenoles	2,99 ± 0,38 mg GAE/mL de extracto
Flavonoides	1,49 ± 0,17 mg QE/mL de extracto
Taninos	1,73 ± 0,11 mg GAE/mL de extracto
Actividad antioxidante (DPPH), IC_{50}	14,04 ± 0,56 µg/mL

4.3. Procedimientos conductuales

Los dispositivos de prueba se iluminaron con una luz de 42 W suspendida a aproximadamente 1 m de altura y dirigida hacia el techo. Los animales se aclimataron a la sala de comportamiento durante 20 min antes de las pruebas, que se realizaron por la mañana (10:00 h). Los dispositivos se limpiaron con etanol al 70 % entre animales. Las sesiones de comportamiento se grabaron en video, se codificaron y se analizaron con el software de seguimiento AnyMaze© (Stoelting Co., EE. UU.).

4.3.1. *Open field* (OF)

El dispositivo consistió en una arena cuadrada de 75 cm de lado con paredes opacas de 30 cm de alto. Las ratas se colocaron en el centro de la arena y se les permitió explorarla libremente durante 5 min. La arena se dividió digitalmente en tres zonas concéntricas: central, intermedia y periférica (zonas 1 a 3; Figura 4.2). El piso de la arena está dividido en una cuadrícula de 5×5 cuadrados de 15 cm de lado: la zona 1 corresponde al cuadrado central (15×15 cm); la zona 2, al anillo de ocho cuadrados que lo rodea (límite externo de 45×45 cm); y la zona 3, a la franja de 15 cm de ancho adyacente a las paredes. Se registraron la distancia total recorrida, el número de zonas visitadas y las entradas, las distancias recorridas y el tiempo de permanencia en cada zona [1]. Se registró además el *rearing*, una conducta de exploración vertical en la que el animal se incorpora sobre las patas traseras [8], como número de eventos y tiempo total.




Figura 4.2. Aparato de *open field* (OF) y zonas de registro: captura cenital de AnyMaze© de la arena (75 cm de lado), con la cuadrícula del piso (cuadrados de 15 cm de lado) y las tres zonas definidas digitalmente: central (1), intermedia (2) y periférica (3).

4.3.2. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR)

El aparato consistió en una caja abierta de madera oscura (75 cm de largo × 30 cm de alto × 55 cm de ancho). Los objetos a discriminar diferían en forma y textura; eran de vidrio, plástico o cerámica y tenían cuatro formas distintas (frascos de vidrio, una rana de juguete de plástico, cajas de plástico y tazas de cerámica), y no podían ser desplazados por las ratas [9, 10]. Brevemente, durante la semana previa a la prueba las ratas fueron manipuladas una vez al día durante 3 días consecutivos. Tres días antes de la prueba se permitió que las ratas exploraran el aparato durante 5 min por día. En estas sesiones de habituación no había objetos en la caja. Veinticuatro horas después de la última sesión de habituación, las ratas fueron entrenadas para el reconocimiento de objetos permitiéndoles explorar durante 5 min dos objetos idénticos colocados en la arena de prueba (fase de muestreo). Durante esta fase de muestreo (T1), los objetos (dos frascos de vidrio de 12,5 cm de alto y 5 cm de diámetro) se colocaron al azar en dos esquinas opuestas del aparato, a 10 cm de las paredes laterales (Figura 4.4A). La rata se colocó en el centro del aparato y se le permitió explorar los dos objetos idénticos. Después de T1, la rata fue devuelta a su caja y, tras un intervalo entre ensayos de 2 h (memoria a corto plazo, T2), de 24 h (memoria a largo plazo, T3) y de 7 días desde la fase de muestreo (memoria consolidada, T4), fue evaluada nuevamente en los ensayos de elección. Durante T2, T3 y T4, un objeto novedoso reemplazó a uno de los objetos presentados durante T1. Así, las ratas fueron reexpuestas durante 5 min a dos objetos: una copia del objeto familiar (F) y el objeto novedoso (N) (Figura 4.4B); es decir, un frasco de vidrio se reemplazó por una rana de juguete de plástico, por una caja de plástico anaranjada de 10,5 cm de largo × 9 cm de ancho × 4 cm de alto y por una taza cónica de cerámica blanca de 8,5 cm de alto y 8,5 cm de diámetro en T2, T3 y T4, respectivamente (Figura 4.3; los objetos se muestran en la Figura 5.8). Todas las combinaciones y ubicaciones de los objetos se contrabalancearon para reducir el posible

sesgo causado por la preferencia por ubicaciones u objetos particulares. Las sesiones T1 a T4 se grabaron en video y se analizaron los cruces de línea con el software AnyMaze© (Stoelting Co., Wood Dale, IL, EE. UU.). El tiempo que las ratas dedicaron a explorar cada objeto durante T1 a T4 fue registrado manualmente por un único experimentador que desconocía la asignación de los grupos. La exploración se definió de la siguiente manera: dirigir la nariz hacia el objeto a una distancia de 2 cm o menos y/o tocar el objeto con la nariz. Dar vueltas alrededor del objeto o sentarse sobre él no se consideró comportamiento exploratorio. Los datos se informan como la tasa de exploración, que es el tiempo dedicado a explorar el objeto novedoso (t_N) dividido por el tiempo dedicado a explorar ambos objetos:

$$\text{tasa de exploración} = \frac{t_N}{t_N + t_F}. \tag{4.1}$$





Figura 4.3. Esquema del protocolo de la prueba NOR. En la fase de muestreo (T1) se presentan dos objetos idénticos (A); en los ensayos de elección, realizados 2 h (T2), 24 h (T3) y 7 días (T4) después de T1, uno de ellos se reemplaza por un objeto novedoso distinto en cada ensayo (B, C y D). Esquema cedido por la Dra. M. S. Kruse.



(A) **(B)**

Figura 4.4. Fases del NOR en vista cenital. (A) Fase de muestreo (T1): dos objetos idénticos. (B) Ensayos de elección (T2 a T4): una copia del objeto familiar y un objeto novedoso.

4.3.3. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR)

Este procedimiento se realizó como fue descrito por Reichelt et al. [11, 12]. El aparato consistió en un campo abierto circular de plástico gris y base opaca, de 100 cm de diámetro $\times$ 45 cm de alto, sin techo. La arena estuvo rodeada de tres señales espaciales distintivas (pósteres negros y blancos con patrones únicos) de 35 cm de alto $\times$ 50 cm de ancho, ubicadas equidistantes alrededor de la arena, y de las señales distales proporcionadas por los muebles de la sala, incluidos los estantes y la puerta.

Durante la semana previa a la habituación, los animales fueron manipulados una vez al día durante 5 días consecutivos. Antes del día del primer ensayo se permitió que cada animal explorara el dispositivo durante 5 min por día durante 3 días consecutivos (habituación). Los objetos fueron tazas con dibujos o ranas de juguete (Figura 4.6), limpiados con etanol al 70 % entre pruebas; dentro de cada sesión, los objetos de la fase de muestreo y de la fase de prueba fueron copias idénticas.

En el primer ensayo se expuso a las ratas a tres objetos idénticos, A1, A2 y A3, durante 10 min (fase de muestreo). La disposición de los objetos dependió de la configuración evaluada: d-SLR o s-SLR (Figura 4.5). En ambas configuraciones, los objetos se colocaron a lo largo de una circunferencia, a 10 cm de la pared. En cada experimento, la mitad de los animales fue asignada a la tarea d-SLR y la otra mitad a la s-SLR (n = 9–10 por grupo y configuración; Anexo A). Para la d-SLR, los objetos A1, A2 y A3 se colocaron equidistantes, a 120° y a una distancia aproximada de 49 cm entre ellos. Para la s-SLR, los objetos A2 y A3 se colocaron a 50° de distancia, a 20,5 cm entre ellos, mientras que A1 se ubicó a la misma distancia de A2 y de A3. El ensayo se fundamenta en la separación de patrones: la demanda cognitiva es mayor cuanto menor es la distancia entre los objetos, de modo que la s-SLR impone una demanda cognitiva mayor, y es más dependiente de la neurogénesis, que la d-SLR [12]. Veinticuatro horas después de la fase de muestreo, los animales regresaron a la arena, donde fueron expuestos solo a dos objetos, uno familiar (A1) y otro novedoso (N), durante 5 min (fase de prueba). El objeto N se ubicó en la posición media entre las que ocupaban los objetos A2 y A3 en la fase de muestreo (Figura 4.5).

Los datos se informan como el índice de discriminación (DI), que es la diferencia entre el tiempo dedicado a explorar el objeto en la posición novedosa (t_N) y el tiempo de exploración del objeto en la posición familiar (t_F), dividida por el tiempo total de exploración de ambos objetos:

$$\mathrm{DI} = \frac{t_N - t_F}{t_N + t_F}. \tag{4.2}$$

Se informa también la tasa de exploración equivalente (Ecuación 4.1), de la cual el DI es una transformación lineal ($\mathrm{DI} = 2 \cdot \text{tasa} - 1$). En la fase de muestreo se registraron, además, la exploración total de los tres objetos y el porcentaje de esa exploración dirigido al objeto




Figura 4.5. Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR). En la fase de muestreo (día 1, 10 min) el animal explora tres objetos idénticos (A1, A2 y A3) en la configuración d-SLR (fila superior) o s-SLR (fila inferior). En la fase de prueba (día 2, 24 h después, 5 min) se presentan dos objetos: uno en la posición familiar de A1 y otro en una posición novedosa (N), ubicada entre las posiciones que antes ocupaban A2 y A3 (círculos punteados). Los símbolos oscuros alrededor de la arena representan las señales espaciales, y la flecha indica la mayor demanda cognitiva de la configuración s-SLR. Adaptado de [12].



Figura 4.6. Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete.

que permanecería en su posición en la fase de prueba (nivel de azar: 33,3 %).

4.3.4. Registro con AnyMaze©

El registro se realizó con el software de videoseguimiento AnyMaze© (Stoelting Co., EE. UU.; versión 7.66), que opera sobre el video cenital de cada sesión. El programa segmenta al animal del fondo por contraste y sigue su posición cuadro a cuadro, reconstruyendo la trayectoria del centroide. De esa trayectoria deriva de manera automática un conjunto de variables cinemáticas y de ocupación: la distancia total recorrida, la velocidad media, los cruces de línea (*line crossings*) sobre una grilla virtual y, mediante zonas definidas por el usuario —regiones de interés trazadas alrededor de cada objeto o sector de la arena—, el número de entradas y el tiempo de permanencia en cada zona.

Permanecer dentro de la zona de un objeto no equivale a explorarlo: el seguimiento detecta posición, no atención. Un animal que se sienta sobre un objeto, se acicala a su lado o descansa dentro de la zona acumularía «tiempo en zona» sin exploración real. Por eso la exploración activa —definida como dirigir la nariz hacia el objeto a 2 cm o menos o tocarlo con la nariz, excluyendo treparlo o posarse sobre él— se cuantificó de forma manual mediante la función de marcación por tecla de AnyMaze©: revisando el video, un único experimentador ciego al tratamiento mantuvo presionada una tecla mientras el animal ejecutaba conducta exploratoria hacia un objeto dado, y el software integró ese tiempo por objeto. El *rearing* del OF se puntuó de la misma manera. Por esta razón, el registro de cada prueba contiene dos familias de variables: la exploración activa, de origen manual, de la que se calculan la tasa de exploración y el índice de discriminación; y las variables cinemáticas y de ocupación, de origen automático, que se emplean como control locomotor y como lectura de conducta tipo ansiosa en el OF. Todas las sesiones se grabaron, se codificaron y se cuantificaron de forma diferida, no en vivo, de modo que el experimentador desconocía el tratamiento de cada animal y el criterio se mantuvo uniforme.

4.4. Inmunocitoquímica y microscopía de fluorescencia (IHC)

Los animales fueron anestesiados profundamente mediante una inyección intraperitoneal de ketamina-xilacina (120 + 12 mg/kg; Holliday/Richmond, Argentina) y fijados por perfusión intracardíaca con 600 mL de paraformaldehído (PFA) al 4 % frío en PBS (pH 7,4) [13]. Los cerebros se extrajeron de inmediato y se dejaron en PFA al 4 % durante toda la noche a 4 °C. Luego se lavaron con PBS y se seccionaron con un vibrátomo. Se obtuvieron cortes coronales de 70 µm de espesor (Bregma −2,8 a −4,2 mm), determinados con un atlas del cerebro de rata [14], que se incubaron en PBS con 0,1 % de Tween 20 y 7 % de suero

normal de burro durante 1 h a temperatura ambiente. Las muestras de tejido se incubaron luego con un anticuerpo de ratón anti-PCNA (dilución 1:250; ref. MAB424, Merck) y un anticuerpo de cabra anti-DCX (dilución 1:200; ref. sc-8066, Santa Cruz Biotechnology) en PBS con 2 % de suero de burro y 0,1 % de Tween 20, durante toda la noche a 4 °C. Posteriormente se lavaron en PBS durante 30 min y se incubaron con un anticuerpo de burro anti-ratón Alexa 488 y un anticuerpo de burro anti-cabra Alexa 555 (ref. A21202 y A21432, respectivamente; Thermo Fisher; ambos en dilución 1:1000) durante 2 h a temperatura ambiente. Los núcleos se contratiñeron con DAPI (1 µg/mL). Finalmente, después de los lavados, los cortes se montaron en portaobjetos de vidrio y se examinaron con un microscopio confocal de disco giratorio Olympus IX81-DSU. Todas las imágenes se obtuvieron en las mismas condiciones: el tiempo de exposición, la intensidad de la lámpara y los filtros se mantuvieron constantes. En algunos cortes se omitió el anticuerpo primario como control; estos cortes se procesaron con el mismo protocolo descrito, y la intensidad de fluorescencia obtenida en ellos se utilizó como referencia para identificar la marca positiva. Todos los portaobjetos se codificaron y fueron analizados por dos observadores independientes que desconocían el tratamiento.

4.4.1. Recuento celular

Los cortes se tomaron en una serie 1:4 (separados por 280 µm; 5 cortes por animal) y se analizaron con ImageJ Fiji win64 (`http://imagej.nih.gov/ij`). Las células positivas para PCNA y/o DCX se contaron dentro de un área delimitada que comprendía la zona subgranular del giro dentado. Para el recuento se consideraron tanto la hoja superior como la inferior de la capa de células granulares y de la zona subgranular. El número de células inmunopositivas fue contado manualmente por dos observadores independientes que desconocían el protocolo experimental. Los resultados se expresan como número de células positivas por mm^2; en el análisis estadístico, cada corte se consideró como un valor.

4.5. Análisis estadístico

El tamaño muestral se estimó sobre la base de estudios previos (95 % de confianza, 10 % de error y 80 % de potencia estadística) [1–3, 6], siguiendo las recomendaciones estándar [15].

La normalidad de los datos y la homogeneidad de las varianzas se evaluaron mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y de Brown-Forsythe, respectivamente. En este estudio se verificó la homogeneidad de las varianzas (prueba de Brown-Forsythe, $p > 0{,}05$), salvo en el recuento de células $PCNA^+/DCX^+$ (§5.5), y no se aplicaron correcciones adicionales.

El consumo de soluciones y de alimento, así como el peso corporal a lo largo del tiempo, se analizó mediante ANOVA de medidas repetidas (ANOVA MR) de dos vías, considerando el tratamiento (control vs. sacarosa vs. stevia) como factor entre sujetos y el tiempo como factor de medidas repetidas. Se empleó ANOVA de dos vías para analizar los parámetros informados en el OF, el NOR, la SLR y la IHC.

Cuando se detectaron efectos principales estadísticamente significativos, se aplicó la prueba *post hoc* de Tukey para ajustar las comparaciones múltiples (en los análisis de consumo, la prueba de Šídák). Además, la tasa de exploración del NOR y el DI de la SLR de cada grupo se compararon con el nivel de azar (0,5 y 0, respectivamente) mediante la prueba *t* de una muestra, y cuando los residuos se apartaron de la normalidad las diferencias se confirmaron con la prueba de Mann-Whitney. Las diferencias de medias se informan como primer grupo menos segundo grupo, con su intervalo de confianza del 95 %. El nivel de significación estadística se estableció en $p < 0{,}05$, y los datos se expresaron como media ± error estándar de la media (SEM).

Los resultados provienen de dos experimentos independientes, correspondientes a dos cohortes experimentales realizadas en distintos momentos, utilizando grupos independientes de animales, pero siguiendo el mismo diseño experimental y los mismos protocolos. Los datos de ambas cohortes se combinaron para realizar los análisis estadísticos. Todos los análisis se llevaron a cabo con el programa GraphPad Prism, versión 11.1.0, salvo el de la exploración total de la SLR, que se realizó sobre el logaritmo del tiempo en Python (statsmodels y SciPy).

5. Resultados


5.1. Consumo de líquidos y peso corporal

5.1.1. Consumo de líquidos durante el tratamiento

El curso temporal del consumo difirió según la edad y el edulcorante (ANOVA MR de dos vías; grupo juvenil: $F_{\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(44, 288) = 5{,}341$; $p < 0{,}0001$; grupo adulto: $F_{\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(44, 330) = 2{,}339$; $p < 0{,}0001$; Figura 5.1A y B, respectivamente). Los animales expuestos a sacarosa consumieron más sacarosa que el control (agua) durante todo el período de exposición, en ambas edades. En cambio, los animales expuestos a stevia consumieron más volumen de stevia que el control solo en PD27 (grupo juvenil) y en PD89 (grupo adulto).

Promediado a lo largo del período de exposición, los animales juveniles consumieron, en relación con su peso corporal, más solución endulzada que los adultos, tanto de sacarosa (2,4 veces más) como de stevia (2,8 veces más) (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}}(1, 64) = 63{,}19$; $p < 0{,}0001$; Figura 5.2). Es decir, la dosis de sacarosa o de stevia a la que estuvieron expuestos los animales juveniles fue más del doble que la de los adultos.

El índice de preferencia (consumo de solución endulzada dividido por el consumo total de líquido) fue de 0,957 en el grupo sacarosa juvenil y de 0,950 en el adulto, y de 0,768 en el grupo stevia juvenil y de 0,782 en el adulto. **[PENDIENTE:** ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) del índice de preferencia por caja y su gráfico, pedido por la Dra. Kruse.**]**



(A) Juvenil **(B)** Adulto

Figura 5.1. Curso temporal del consumo de líquidos durante el tratamiento. (A) Grupo juvenil. (B) Grupo adulto. Eje horizontal: día postnatal (PD); eje vertical: consumo de líquido normalizado al peso corporal (mL/g de peso corporal/día). Cada curva corresponde a una condición y a un fluido (agua o solución endulzada); la leyenda es común a ambos gráficos. Datos expresados como media ± SEM. $n = 7$ cajas por grupo.




Figura 5.2. Consumo de líquidos promediado a lo largo del período experimental, por condición y edad. Datos expresados como media ± SEM. Los asteriscos indican diferencias entre la exposición juvenil y la adulta dentro de cada condición (prueba de Tukey; * $p < 0{,}05$; *** $p < 0{,}001$; **** $p < 0{,}0001$). $n = 7$ cajas por grupo.

5.1.2. Consumo de agua luego del tratamiento con los endulzantes (período agua)

Finalizado el tratamiento, todos los animales bebieron únicamente agua durante otros 25 días. El consumo de agua en este período, expresado como porcentaje del grupo control, cambió a lo largo del tiempo de manera distinta según la edad y el tratamiento previo (ANOVA de medidas repetidas de tres vías, $F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(4{,}59, 110{,}09) = 7{,}58$; $p < 0{,}0001$; Figura 5.3). Promediado a lo largo del período, el consumo de agua fue de $92{,}32 \pm 5{,}58$ % y $105{,}67 \pm 2{,}97$ % del control en los grupos juveniles previamente expuestos a sacarosa y a stevia, respectivamente, y de $103{,}48 \pm 5{,}44$ % y $93{,}57 \pm 4{,}04$ % en los grupos adultos correspondientes ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}}(1, 24) = 6{,}30$; $p = 0{,}019$; $F_{\text{Edad}}(1, 24) = 0{,}01$; $p = 0{,}919$; $F_{\text{Tratamiento}}(1, 24) = 0{,}14$; $p = 0{,}714$). **[PENDIENTE:** gráfico de barras del consumo promedio, como el de la Figura 5.2, y análisis por separado de los días 1 a 10 y de los días 11 a 25 del período, sugerido por la Dra. Kruse.**]**

Los animales juveniles previamente expuestos a stevia bebieron más agua que los previamente expuestos a sacarosa en D11 y en D25 (prueba *post hoc* de Šídák, $p = 0{,}030$ y $p = 0{,}005$, respectivamente), mientras que en los animales adultos no hubo diferencias entre tratamientos en ningún día. Además, los animales juveniles previamente expuestos a stevia bebieron más agua que los adultos en D11 ($p = 0{,}014$), D13 ($p = 0{,}0016$), D15 ($p = 0{,}0003$), D17 ($p = 0{,}0018$), D21 ($p = 0{,}0075$) y D23 ($p = 0{,}031$), mientras que dentro del grupo previamente expuesto a sacarosa no hubo diferencias entre edades en ningún día. Estos resultados indican que la respuesta al retiro de la stevia dependió de la edad de exposición, y que esta diferencia se hizo evidente principalmente durante la segunda mitad del período.




Figura 5.3. Consumo de agua luego del tratamiento con los endulzantes (período agua), expresado como porcentaje del grupo control. Datos expresados como media ± SEM, según la edad y el tratamiento previo.

5.1.3. Consumo de alimento

Los animales juveniles consumieron más alimento, en relación con su peso corporal, que los adultos en los tres tratamientos (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Edad}}(1, 21) = 2363{,}85$; $p < 0{,}0001$; prueba *post hoc* de Šídák, $p < 0{,}0001$ en los tres casos). El consumo de alimento dependió además del tratamiento ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 21) = 57{,}37$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Interacción}}(2, 21) = 3{,}86$; $p = 0{,}037$). En ambas edades, los animales expuestos a sacarosa comieron menos que los controles (juvenil: $p < 0{,}0001$; adulto: $p = 0{,}0005$) y que los expuestos a stevia ($p < 0{,}0001$ en ambas edades). Los animales expuestos a stevia no difirieron de los controles en el grupo juvenil y comieron más que los controles en el grupo adulto ($p = 0{,}034$). Este patrón se mantuvo a lo largo del tratamiento, tanto en el grupo juvenil (ANOVA de medidas repetidas, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 11) = 26{,}88$; $p = 0{,}0002$; $F_{\text{Tiempo}}(2{,}34, 21{,}07) = 203{,}97$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Interacción}}(4{,}68, 21{,}07) = 11{,}54$; $p < 0{,}0001$) como en el adulto ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 12) = 33{,}99$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Tiempo}}(1{,}51, 18{,}10) = 91{,}04$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Interacción}}(3{,}02, 18{,}10) = 14{,}99$; $p < 0{,}0001$) (Figura 5.4).




Figura 5.4. Curso temporal del consumo de alimento (normalizado al peso corporal) durante el tratamiento, grupo juvenil. **[PENDIENTE:** agregar el gráfico del grupo adulto, que llega junto con los datos de peso corporal.**]** Datos expresados como media ± SEM.

5.1.4. Peso corporal

[PENDIENTE: redactar cuando estén los datos de peso corporal.**]**

5.2. Conducta tipo ansiosa (OF)

La actividad locomotora y la exploración de la arena se evaluaron en el OF al finalizar el protocolo. La Tabla 5.1 presenta las medias y el número de animales de cada grupo y la Tabla 5.2 resume los ANOVA de dos vías (edad × tratamiento); las comparaciones *post hoc* de Tukey se realizaron entre los tres tratamientos dentro de cada edad. El número de animales difiere entre variables y entre grupos, y los grupos expuestos a stevia (6 o 7 animales) son los de menor tamaño frente a los grupos control y sacarosa (10 a 18 animales).

Tabla 5.1. Variables del OF por grupo experimental. Valores expresados como media ± SEM; entre paréntesis, número de animales.

	Juvenil			Adulto		
Variable	**Control**	**Sacarosa**	**Stevia**	**Control**	**Sacarosa**	**Stevia**
Distancia total (m)	16,9 ± 1,2 (17)	18,3 ± 1,2 (15)	17,1 ± 1,0 (6)	17,0 ± 1,9 (11)	19,1 ± 1,5 (16)	18,2 ± 0,7 (7)
Entradas a zona 1	3,8 ± 0,9 (16)	2,9 ± 0,5 (15)	4,2 ± 1,8 (6)	0,7 ± 0,3 (17)	1,2 ± 0,3 (17)	4,4 ± 1,2 (7)
Distancia en zona 1 (m)	0,31 ± 0,07 (18)	0,28 ± 0,05 (15)	0,39 ± 0,16 (6)	0,09 ± 0,03 (17)	0,17 ± 0,05 (17)	0,37 ± 0,09 (7)
Entradas a zonas 1+2	13,9 ± 1,0 (15)	7,1 ± 0,8 (14)	33,5 ± 3,2 (6)	13,3 ± 2,6 (10)	12,6 ± 1,6 (11)	37,0 ± 2,6 (7)
Distancia en zonas 1+2 (m)	4,02 ± 0,65 (16)	1,70 ± 0,35 (15)	6,69 ± 0,57 (6)	1,71 ± 0,34 (15)	1,95 ± 0,30 (16)	6,55 ± 0,41 (7)
Zonas visitadas (n.º)	37,1 ± 5,9 (17)	18,0 ± 3,9 (12)	75,7 ± 5,6 (6)	24,9 ± 4,1 (14)	30,3 ± 4,2 (13)	73,3 ± 6,3 (7)
Rearing, n.º de eventos	21,9 ± 1,4 (18)	11,8 ± 1,3 (15)	8,5 ± 1,2 (6)	18,8 ± 1,5 (17)	19,9 ± 2,2 (16)	12,3 ± 1,2 (7)
Rearing, tiempo (s)	36,5 ± 2,6 (18)	20,8 ± 2,8 (14)	11,4 ± 2,1 (6)	41,7 ± 4,9 (17)	43,1 ± 5,9 (16)	22,4 ± 3,0 (7)

Tabla 5.2. Resumen del ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) para las variables del OF. En negrita, los efectos significativos ($p < 0{,}05$).

	Tratamiento		Edad		Interacción	
Variable	F **(gl)**	p	F **(gl)**	p	F **(gl)**	p
Distancia total	0,90 (2,66)	0,41	0,31 (1,66)	0,58	0,06 (2,66)	0,94
Entradas a zona 1	4,11 (2,72)	**0,020**	6,20 (1,72)	**0,015**	2,29 (2,72)	0,11
Distancia en zona 1	2,80 (2,74)	0,067	3,85 (1,74)	0,053	0,94 (2,74)	0,39
Entradas a zonas 1+2	91,79 (2,57)	**<0,0001**	3,51 (1,57)	0,066	1,88 (2,57)	0,16
Distancia en zonas 1+2	38,88 (2,69)	**<0,0001**	3,15 (1,69)	0,080	5,05 (2,69)	**0,0090**
Zonas visitadas	37,01 (2,63)	**<0,0001**	0,03 (1,63)	0,87	3,28 (2,63)	**0,044**
Rearing, n.º de eventos	12,69 (2,73)	**<0,0001**	3,54 (1,73)	0,064	6,67 (2,73)	**0,0022**
Rearing, tiempo	8,81 (2,72)	**0,0004**	10,12 (1,72)	**0,0022**	2,24 (2,72)	0,11

5.2.1. Actividad locomotora

No se encontraron diferencias en la distancia total recorrida entre los seis grupos (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 66) = 0{,}90$; $p = 0{,}41$; $F_{\text{Edad}}(1, 66) = 0{,}31$; $p = 0{,}58$; $F_{\text{Interacción}}(2, 66) = 0{,}06$; $p = 0{,}94$; Figura 5.5), y ninguna comparación de Tukey resultó significativa. Las medias de los seis grupos se ubicaron entre 16,9 y 19,1 m en los 5 min de

la sesión, lo que indica que ni la sacarosa ni la stevia modificaron la actividad locomotora general.




Figura 5.5. Distancia total recorrida en el *open field* (OF) en ratas expuestas a agua (control), sacarosa o stevia durante la ventana juvenil o adulta. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Ninguna comparación de Tukey resultó significativa.

5.2.2. Exploración de las zonas centrales y de la arena

A diferencia de la distancia total, la exploración de las zonas centrales dependió del tratamiento. En ambas edades, los animales expuestos a stevia ingresaron más veces a las zonas centrales (zonas 1+2) que los controles y que los expuestos a sacarosa (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 57) = 91{,}79$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 57) = 3{,}51$; $p = 0{,}066$; $F_{\text{Interacción}}(2, 57) = 1{,}88$; $p = 0{,}16$; Figura 5.6A). En los juveniles, la diferencia control − stevia fue de −19,6 entradas (IC 95 %: −26,1 a −13,0; $p < 0{,}0001$) y la diferencia sacarosa − stevia, de −26,4 (IC 95 %: −33,1 a −19,8; $p < 0{,}0001$); en los adultos, de −23,7 (IC 95 %: −30,4 a −17,0; $p < 0{,}0001$) y de −24,4 (IC 95 %: −30,9 a −17,8; $p < 0{,}0001$), respectivamente (prueba *post hoc* de Tukey). Por su parte, los animales expuestos a sacarosa ingresaron menos veces que los controles solo en el grupo juvenil (diferencia control − sacarosa = 6,9; IC 95 %: 1,8 a 11,9; $p < 0{,}01$), sin diferencia en el grupo adulto (0,7; IC 95 %: −5,3 a 6,6).

De manera similar, los animales expuestos a stevia recorrieron más distancia en las zonas 1+2 (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 69) = 5{,}05$; $p = 0{,}009$; $F_{\text{Tratamiento}}(2, 69) = 38{,}88$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 69) = 3{,}15$; $p = 0{,}080$; Figura 5.6B). En los juveniles, recorrieron más distancia que los controles (diferencia control − stevia = −2,7 m; IC 95 %: −4,6 a −0,8; $p < 0{,}01$) y que los expuestos a sacarosa (diferencia sacarosa − stevia = −5,0; IC 95 %: −6,9 a −3,1; $p < 0{,}0001$), y estos últimos recorrieron menos que los controles (diferencia control − sacarosa = 2,3; IC 95 %: 0,9 a 3,7; $p < 0{,}001$). En los adultos, los animales expuestos a stevia recorrieron más distancia que los controles (diferencia control − stevia = −4,8; IC 95 %: −6,7 a −3,0; $p < 0{,}0001$) y que los expuestos a sacarosa (diferencia sacarosa − stevia = −4,6; IC 95 %: −6,4 a −2,8; $p < 0{,}0001$), sin diferencia entre control y sacarosa




Figura 5.6. Exploración de las zonas centrales y de la arena en el *open field* (OF). (A) Entradas a las zonas centrales (zonas 1+2). (B) Distancia recorrida en las zonas 1+2. (C) Número de zonas visitadas. (D) Entradas a la zona central (zona 1). (E) Distancia recorrida en la zona 1. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Los corchetes indican las comparaciones de Tukey significativas entre tratamientos dentro de cada edad (* $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$; *** $p < 0{,}001$; **** $p < 0{,}0001$); no se indican las no significativas.

(−0,2; IC 95 %: −1,7 a 1,2).

Los animales expuestos a stevia también visitaron más zonas que los controles y que los expuestos a sacarosa en ambas edades (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 63) = 3{,}28$; $p = 0{,}044$; $F_{\text{Tratamiento}}(2, 63) = 37{,}01$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 63) = 0{,}03$; $p = 0{,}87$; Figura 5.6C): en los juveniles, la diferencia control − stevia fue de −38,6 (IC 95 %: −58,8 a −18,3; $p < 0{,}0001$) y la diferencia sacarosa − stevia, de −57,7 (IC 95 %: −79,0 a −36,3; $p < 0{,}0001$); en los adultos, de −48,4 (IC 95 %: −68,1 a −28,6; $p < 0{,}0001$) y de −43,0 (IC 95 %: −63,0 a −23,0; $p < 0{,}0001$). Los juveniles expuestos a sacarosa visitaron menos zonas que los controles (diferencia control − sacarosa = 19,1; IC 95 %: 3,0 a 35,2; $p < 0{,}05$), sin diferencia en los adultos (−5,4; IC 95 %: −21,8 a 11,1).

En la zona central (zona 1) las diferencias se limitaron al grupo adulto. Los animales adultos expuestos a stevia ingresaron más veces a la zona 1 que los controles (diferencia control − stevia = −3,7; IC 95 %: −6,4 a −1,1; $p < 0{,}01$) y que los expuestos a sacarosa (diferencia sacarosa − stevia = −3,2; IC 95 %: −5,8 a −0,6; $p < 0{,}05$), mientras que en los juveniles no hubo diferencias entre tratamientos (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 72) = 4{,}11$; $p = 0{,}020$; $F_{\text{Edad}}(1, 72) = 6{,}20$; $p = 0{,}015$; $F_{\text{Interacción}}(2, 72) = 2{,}29$; $p = 0{,}11$; Figura 5.6D). Además, los animales adultos expuestos a stevia recorrieron más distancia en la zona 1 que los controles (diferencia control − stevia = −0,28 m; IC 95 %: −0,54 a −0,02; $p < 0{,}05$; Figura 5.6E), sin diferencias entre tratamientos en los juveniles ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 74) = 2{,}80$; $p = 0{,}067$; $F_{\text{Edad}}(1, 74) = 3{,}85$; $p = 0{,}053$; $F_{\text{Interacción}}(2, 74) = 0{,}94$; $p = 0{,}39$).

En conjunto, estos resultados indican que los animales expuestos a stevia exploraron más las zonas centrales de la arena que los controles y que los expuestos a sacarosa, en ambas edades y sin cambios en la distancia total recorrida (§5.2.1), mientras que los animales expuestos a sacarosa durante la etapa juvenil las exploraron menos que sus controles.

5.2.3. Conducta de *rearing*

La conducta de *rearing* también se modificó con los tratamientos. En los juveniles, tanto los animales expuestos a sacarosa como los expuestos a stevia realizaron menos eventos de *rearing* que los controles (diferencia control − sacarosa = 10,1; IC 95 %: 4,9 a 15,4; $p < 0{,}0001$; diferencia control − stevia = 13,4; IC 95 %: 6,4 a 20,5; $p < 0{,}0001$), sin diferencias entre ambos tratamientos (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 73) = 6{,}67$; $p = 0{,}0022$; $F_{\text{Tratamiento}}(2, 73) = 12{,}69$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 73) = 3{,}54$; $p = 0{,}064$; Figura 5.7A). En los adultos, los animales expuestos a sacarosa no difirieron de los controles (diferencia control − sacarosa = −1,1; IC 95 %: −6,4 a 4,1), y los expuestos a stevia realizaron menos eventos que los expuestos a sacarosa (diferencia sacarosa − stevia = 7,7; IC 95 %: 0,8 a 14,5; $p < 0{,}05$), sin alcanzar la significancia respecto de los controles (diferencia control − stevia = 6,5; IC 95 %: −0,2 a 13,3).




Figura 5.7. Conducta de *rearing* en el *open field* (OF). (A) Número de eventos. (B) Tiempo. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Los corchetes indican las comparaciones de Tukey significativas entre tratamientos dentro de cada edad (* $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$; *** $p < 0{,}001$; **** $p < 0{,}0001$); no se indican las no significativas.

De manera similar, el tiempo dedicado al *rearing* dependió del tratamiento y de la edad (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 72) = 8{,}81$; $p = 0{,}0004$; $F_{\text{Edad}}(1, 72) = 10{,}12$; $p = 0{,}0022$; $F_{\text{Interacción}}(2, 72) = 2{,}24$; $p = 0{,}11$; Figura 5.7B). En los juveniles, fue menor en los animales expuestos a sacarosa (diferencia control − sacarosa = 15,7 s; IC 95 %: 1,8 a 29,5; $p < 0{,}05$) y en los expuestos a stevia (diferencia control − stevia = 25,1 s; IC 95 %: 6,7 a 43,4; $p < 0{,}01$) que en los controles, sin diferencia entre ambos tratamientos (9,4 s; IC 95 %: −9,6 a 28,4). En los adultos, fue menor en los animales expuestos a stevia que en los controles (diferencia control − stevia = 19,3 s; IC 95 %: 1,8 a 36,8; $p < 0{,}05$) y que en los expuestos a sacarosa (diferencia sacarosa − stevia = 20,7 s; IC 95 %: 3,1 a 38,3; $p < 0{,}05$), sin diferencia entre control y sacarosa (−1,4 s; IC 95 %: −15,0 a 12,1). Estos resultados indican que la exposición a sacarosa redujo la exploración vertical solo en la etapa juvenil, mientras que la exposición a stevia la redujo en ambas edades: respecto de los controles en los juveniles (en número y en tiempo) y, en los adultos, respecto de los expuestos a sacarosa (en número y en tiempo) y de los controles (solo en tiempo).

5.3. Memoria de reconocimiento de objetos (NOR)

La exploración preferencial del objeto novedoso frente al familiar proporciona una medida de la memoria de reconocimiento. Tras la exposición a dos objetos idénticos (fase de muestreo, T1), la memoria se evaluó en los ensayos siguientes reemplazando uno de los objetos familiares por uno novedoso (Figura 5.8D) y calculando la tasa de exploración $[t_N/(t_N + t_F)]$. La Tabla 5.3 presenta la tasa de exploración de cada grupo y su comparación con el nivel de azar (0,5), y la Tabla 5.4 resume los ANOVA de dos vías (edad × tratamiento).

Tras un intervalo de 2 h (memoria a corto plazo, T2), se encontró una interacción edad-

tratamiento significativa en la capacidad de discriminar el objeto novedoso del familiar (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 49) = 10{,}13$; $p = 0{,}0002$). Los grupos control juvenil y adulto mostraron una clara preferencia por explorar el objeto novedoso (tasa de exploración de 0,632 y de 0,703, respectivamente; prueba t de una muestra, $t(8) = 10{,}31$ y $t(9) = 10{,}56$; $p < 0{,}0001$ en ambos casos), al igual que el grupo adulto expuesto a sacarosa, que no difirió de su control (prueba *post hoc* de Tukey, $p = 0{,}962$). En cambio, el grupo juvenil expuesto a sacarosa no superó el nivel de azar (Tabla 5.3) y exploró menos el objeto novedoso que su control (diferencia control − sacarosa = 0,138; IC 95 %: 0,047–0,228; $p = 0{,}0017$) y que el grupo adulto expuesto a sacarosa (diferencia juvenil − adulto = −0,199; $p < 0{,}0001$; Figura 5.8A). En cuanto a la stevia, el grupo juvenil no difirió de su control ($p = 0{,}461$), mientras que el grupo adulto exploró menos el objeto novedoso que su control (diferencia control − stevia = 0,155; IC 95 %: 0,067–0,243; $p = 0{,}0003$) y no superó el nivel de azar (Tabla 5.3).

De manera similar, la interacción edad-tratamiento fue significativa a las 24 h (memoria a largo plazo, T3; $F_{\text{Interacción}}(2, 49) = 11{,}67$; $p < 0{,}0001$). Los grupos control mantuvieron la preferencia por el objeto novedoso (juvenil: 0,716; $t(8) = 8{,}62$; $p < 0{,}0001$; adulto: 0,653; $t(9) = 4{,}72$; $p = 0{,}0011$). El grupo juvenil expuesto a sacarosa volvió a explorar menos el objeto novedoso que su control (diferencia control − sacarosa = 0,150; IC 95 %: 0,058–0,242; $p = 0{,}0008$) y que el grupo adulto expuesto a sacarosa (diferencia juvenil − adulto = −0,170; $p < 0{,}0001$; Figura 5.8B). En esta demora, el grupo juvenil expuesto a stevia también exploró menos el objeto novedoso que su control (diferencia control − stevia = 0,155; IC 95 %: 0,063–0,248; $p = 0{,}0005$), mientras que en el grupo adulto no hubo diferencias entre tratamientos ($p \geq 0{,}077$).

Siete días después de la fase de muestreo (memoria consolidada, T4), la interacción edad-tratamiento también fue significativa ($F_{\text{Interacción}}(2, 49) = 7{,}82$; $p = 0{,}0011$). Los grupos control conservaron la preferencia por el objeto novedoso (juvenil: 0,677; $t(8) = 15{,}66$; $p < 0{,}0001$; adulto: 0,662; $t(9) = 4{,}61$; $p = 0{,}0013$), mientras que el grupo juvenil expuesto a sacarosa exploró menos el objeto novedoso que su control (diferencia control − sacarosa = 0,172; IC 95 %: 0,065–0,280; $p = 0{,}0009$) y que el grupo adulto expuesto a sacarosa (diferencia juvenil − adulto = −0,217; $p < 0{,}0001$; Figura 5.8C), y tampoco superó el nivel de azar (Tabla 5.3). El grupo adulto expuesto a sacarosa no difirió de su control. En el grupo juvenil expuesto a stevia, la diferencia respecto del control no alcanzó la significancia (diferencia control − stevia = 0,097; IC 95 %: −0,011–0,204; $p = 0{,}087$). El grupo adulto expuesto a stevia no difirió de su control, pero exploró menos el objeto novedoso que el grupo adulto expuesto a sacarosa (diferencia sacarosa − stevia = 0,113; IC 95 %: 0,005–0,220; $p = 0{,}038$). Los grupos control no difirieron entre edades en ninguna demora ($p = 0{,}059$, $p = 0{,}097$ y $p = 0{,}718$ en T2, T3 y T4, respectivamente), y tampoco los grupos expuestos a stevia ($p \geq 0{,}296$ en todas las comparaciones).


En conjunto, estos resultados indican: (1) los grupos control de ambas edades y el grupo adulto expuesto a sacarosa conservaron la memoria del objeto familiar y pudieron distinguirlo del novedoso hasta al menos 7 días después de una única fase de muestreo; (2) la exposición a sacarosa durante la etapa juvenil, pero no durante la adultez, redujo la discriminación del objeto novedoso en las tres demoras; y (3) la exposición a stevia redujo la tasa de exploración respecto del control solo a las 24 h en el grupo juvenil y solo a las 2 h en el grupo adulto. La Figura 5.9 resume las diferencias entre grupos junto con sus intervalos de confianza.

Tabla 5.3. Tasa de exploración en la prueba NOR a cada demora y comparación con el nivel de azar (0,5) mediante prueba *t* de una muestra. Valores expresados como media ± SEM; entre paréntesis, número de animales.


	T2 (2 h)			T3 (24 h)			T4 (7 días)		
Grupo	**Tasa**	***t* (gl)**	***p***	**Tasa**	***t* (gl)**	***p***	**Tasa**	***t* (gl)**	***p***
Juvenil – Control	0,632 ± 0,013 (9)	10,31 (8)	**<0,0001**	0,716 ± 0,025 (9)	8,62 (8)	**<0,0001**	0,677 ± 0,011 (9)	15,66 (8)	**<0,0001**
Juvenil – Sacarosa	0,494 ± 0,040 (9)	−0,15 (8)	0,885	0,566 ± 0,032 (9)	2,05 (8)	0,074	0,505 ± 0,024 (9)	0,22 (8)	0,830
Juvenil – Stevia	0,587 ± 0,023 (9)	3,80 (8)	**0,0052**	0,561 ± 0,021 (9)	2,88 (8)	**0,021**	0,581 ± 0,021 (9)	3,83 (8)	**0,0050**
Adulto – Control	0,703 ± 0,019 (10)	10,56 (9)	**<0,0001**	0,653 ± 0,032 (10)	4,72 (9)	**0,0011**	0,662 ± 0,035 (10)	4,61 (9)	**0,0013**
Adulto – Sacarosa	0,693 ± 0,024 (9)	7,98 (8)	**<0,0001**	0,736 ± 0,021 (9)	11,40 (8)	**<0,0001**	0,722 ± 0,036 (9)	6,23 (8)	**0,0003**
Adulto – Stevia	0,548 ± 0,032 (9)	1,50 (8)	0,172	0,707 ± 0,024 (9)	8,55 (8)	**<0,0001**	0,610 ± 0,046 (9)	2,37 (8)	**0,045**

Tabla 5.4. Resumen del ANOVA de dos vías (edad de exposición × tratamiento) para la tasa de exploración en cada demora de la prueba NOR. η_p^2: eta cuadrado parcial.

	T2			T3			T4		
Fuente	***F* (gl)**	***p***	η_p^2	***F* (gl)**	***p***	η_p^2	***F* (gl)**	***p***	η_p^2
Tratamiento	7,89 (2,49)	**0,0011**	0,244	1,87 (2,49)	0,165	0,071	3,11 (2,49)	0,054	0,113
Edad	12,74 (1,49)	**0,0008**	0,206	14,92 (1,49)	**0,0003**	0,233	9,07 (1,49)	**0,0041**	0,156
Interacción	10,13 (2,49)	**0,0002**	0,293	11,67 (2,49)	**<0,0001**	0,323	7,82 (2,49)	**0,0011**	0,242



(A) T2 (2 h) **(B)** T3 (24 h) **(C)** T4 (7 días)



T1 T2 T3 T4

(D) Esquema y objetos de cada ensayo

Figura 5.8. Tasa de exploración en la prueba NOR. (A) T2 (2 h). (B) T3 (24 h). (C) T4 (7 días). (D) Esquema del protocolo y objetos presentados en cada ensayo [2]. Las barras indican media ± SEM; cada punto representa un animal. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos (* $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$; *** $p < 0{,}001$; **** $p < 0{,}0001$). n = 9–10 animales por grupo.




Figura 5.9. Diferencias de medias de la tasa de exploración entre grupos (prueba de Tukey) con su intervalo de confianza del 95 %, para las demoras T2 (A), T3 (B) y T4 (C). Cada fila corresponde a una comparación; una diferencia positiva indica una tasa mayor en el primer grupo de la comparación. En rojo se indican las comparaciones significativas ($p < 0{,}05$). La línea punteada indica ausencia de diferencia.

5.4. Separación de patrones espaciales (SLR)

La prueba SLR evalúa la capacidad de distinguir una posición novedosa de una familiar, con una demanda de separación de patrones mayor en la configuración s-SLR que en la d-SLR (Figura 4.5). Los datos se informan como índice de discriminación (DI, nivel de azar 0; Tabla 5.5 y Figura 5.10) y como tasa de exploración equivalente (nivel de azar 0,5; Tabla 5.7 y Figura 5.11); dado que $\text{DI} = 2 \cdot \text{tasa} - 1$, ambos índices producen resultados estadísticos idénticos (mismos F, t y p). La Tabla 5.6 resume los ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) de cada configuración.

En la configuración d-SLR, la discriminación de la posición novedosa dependió del tratamiento (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 52) = 4{,}58$; $p = 0{,}015$; $\eta_p^2 = 0{,}15$; $F_{\text{Edad}}(1, 52) = 0{,}22$; $p = 0{,}642$; $F_{\text{Interacción}}(2, 52) = 2{,}04$; $p = 0{,}140$). Los grupos control juvenil y adulto exploraron preferentemente el objeto ubicado en la posición novedosa (prueba t de una muestra, $p = 0{,}001$ y $p = 0{,}003$, respectivamente). El grupo juvenil expuesto a sacarosa mostró un DI menor que su control (prueba *post hoc* de Tukey, diferencia control − sacarosa = 0,324; IC 95 %: 0,071–0,577; $p = 0{,}009$), mientras que en el grupo adulto no hubo diferencias entre tratamientos ($p > 0{,}50$ en todas las comparaciones); la comparación entre edades dentro del grupo sacarosa no alcanzó la significancia ($p = 0{,}067$). Los grupos expuestos a stevia no difirieron de sus controles (juvenil: $p = 0{,}870$; adulto: $p > 0{,}50$), y el grupo juvenil expuesto a stevia mostró un DI mayor que el grupo juvenil expuesto a sacarosa (diferencia stevia − sacarosa = 0,272; IC 95 %: 0,026–0,519; $p = 0{,}027$; Figura 5.10A).

En la configuración s-SLR, de mayor demanda de separación de patrones, la discriminación también dependió del tratamiento (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 53) = 6{,}67$; $p = 0{,}003$; $\eta_p^2 = 0{,}20$; $F_{\text{Edad}}(1, 53) = 0{,}08$; $p = 0{,}779$; $F_{\text{Interacción}}(2, 53) = 0{,}53$; $p = 0{,}591$). Los grupos

control volvieron a discriminar la posición novedosa por encima del nivel de azar (juvenil: $p < 0{,}001$; adulto: $p = 0{,}007$). En esta configuración, los animales expuestos a sacarosa mostraron un DI menor que sus controles en ambas edades (juvenil: diferencia control − sacarosa = 0,322; IC 95 %: 0,011–0,633; $p = 0{,}041$; adulto: diferencia control − sacarosa = 0,326; IC 95 %: 0,023–0,629; $p = 0{,}032$; Figura 5.10B), sin diferencias entre edades dentro del tratamiento. Dado que los residuos de este modelo se apartaron de la normalidad (Shapiro-Wilk, $p = 0{,}006$), estas diferencias se contrastaron también con la prueba de Mann-Whitney, que las confirmó en ambas edades (juvenil: $p = 0{,}002$; adulto: $p = 0{,}031$); la homogeneidad de varianzas se mantuvo (Brown-Forsythe, $p = 0{,}16$), al igual que en la d-SLR (Shapiro-Wilk, $p = 0{,}48$; Brown-Forsythe, $p = 0{,}30$). Los grupos expuestos a stevia no difirieron de sus controles (juvenil: $p = 0{,}971$; adulto: $p = 0{,}293$), y la diferencia entre el grupo juvenil expuesto a stevia y el expuesto a sacarosa no alcanzó la significancia ($p = 0{,}069$).

Ninguno de los grupos expuestos a sacarosa o a stevia superó el nivel de azar en ninguna de las dos configuraciones (Tabla 5.5), y ningún grupo expuesto a stevia difirió entre edades.


Tabla 5.5. Índice de discriminación (DI) en la prueba SLR y comparación con el nivel de azar (DI = 0) mediante prueba *t* de una muestra. Valores expresados como media ± SEM; entre paréntesis, número de animales.

	d-SLR			s-SLR		
Grupo	**DI**	***t* (gl)**	***p***	**DI**	***t* (gl)**	***p***
Juvenil – Control	0,242 ± 0,050 (9)	4,80 (8)	**0,001**	0,210 ± 0,040 (10)	5,28 (9)	< **0,001**
Juvenil – Sacarosa	−0,082 ± 0,048 (9)	−1,70 (8)	0,127	−0,112 ± 0,077 (9)	−1,46 (8)	0,183
Juvenil – Stevia	0,191 ± 0,100 (10)	1,90 (9)	0,090	0,181 ± 0,109 (10)	1,67 (9)	0,130
Adulto – Control	0,218 ± 0,054 (10)	4,00 (9)	**0,003**	0,244 ± 0,070 (10)	3,47 (9)	**0,007**
Adulto – Sacarosa	0,109 ± 0,074 (10)	1,48 (9)	0,173	−0,082 ± 0,110 (10)	−0,75 (9)	0,475
Adulto – Stevia	0,106 ± 0,079 (10)	1,34 (9)	0,212	0,054 ± 0,107 (10)	0,51 (9)	0,624

Tabla 5.6. Resumen del ANOVA de dos vías (edad de exposición × tratamiento) para el DI en cada configuración de la prueba SLR. η_p^2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

	d-SLR			s-SLR		
Fuente de variación	***F* (gl)**	***p***	η_p^2	***F* (gl)**	***p***	η_p^2
Tratamiento	4,58 (2, 52)	**0,015**	0,150	6,67 (2, 53)	**0,003**	0,201
Edad	0,22 (1, 52)	0,642	0,004	0,08 (1, 53)	0,779	0,001
Interacción	2,04 (2, 52)	0,140	0,073	0,53 (2, 53)	0,591	0,020

La exploración total de los objetos (tiempo de exploración activa, registrado manualmente) disminuyó de la fase de muestreo (día 1) a la fase de prueba (día 2) en todos los grupos (entre 44 % y 59 %; Figura 5.12). Sin embargo, en la fase de muestreo la exploración no fue igual entre los grupos: fue mayor en los juveniles expuestos a sacarosa (54,5 ± 3,6 s) y en los adultos expuestos a stevia (55,8 ± 5,5 s) que en el resto (30,6 a 41,7 s) (ANOVA




(A) d-SLR **(B)** s-SLR

Figura 5.10. Índice de discriminación (DI) en la prueba SLR. (A) Configuración d-SLR. (B) Configuración s-SLR. Las barras indican media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos (ns: no significativo; * $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$). n = 9–10 animales por grupo.

Tabla 5.7. Tasa de exploración en la prueba SLR, equivalente al DI de la Tabla 5.5 (DI = 2 · tasa − 1). Valores expresados como media ± SEM; entre paréntesis, número de animales.

Grupo	d-SLR	s-SLR
Juvenil – Control	0,621 ± 0,025 (9)	0,605 ± 0,020 (10)
Juvenil – Sacarosa	0,459 ± 0,024 (9)	0,444 ± 0,038 (9)
Juvenil – Stevia	0,595 ± 0,050 (10)	0,590 ± 0,054 (10)
Adulto – Control	0,609 ± 0,027 (10)	0,622 ± 0,035 (10)
Adulto – Sacarosa	0,554 ± 0,037 (10)	0,459 ± 0,055 (10)
Adulto – Stevia	0,553 ± 0,039 (10)	0,527 ± 0,053 (10)



(A) d-SLR **(B)** s-SLR

Figura 5.11. Tasa de exploración en la prueba SLR. (A) Configuración d-SLR. (B) Configuración s-SLR. Las barras indican media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos (ns: no significativo; * $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$), estadísticamente idénticos a los del DI (Figura 5.10) por tratarse de una transformación lineal. n = 9–10 animales por grupo.

de dos vías sobre el logaritmo del tiempo, $F_{\text{Interacción}}(2, 111) = 6{,}72$; $p = 0{,}002$). En este análisis se combinaron las dos configuraciones, y cada observación corresponde a un animal (los grupos de d-SLR y de s-SLR están formados por animales distintos; Anexo A). En esa misma fase, el porcentaje de exploración dirigido al objeto que luego permaneció en su posición fue cercano al nivel de azar (33,3 %) en la mayoría de los grupos (32 % a 40 %), y algo mayor en los adultos control y sacarosa de la s-SLR (45 % y 48 %, respectivamente; Tabla A.2).




Figura 5.12. Exploración total (tiempo de exploración activa de los objetos, en segundos) en el día 1 (muestreo, barras llenas) y en el día 2 (prueba, barras rayadas) para cada grupo, con exposición juvenil (izquierda) y adulta (derecha). Las barras indican la media ± SEM y los puntos, las sesiones individuales, con las sesiones de d-SLR y s-SLR combinadas. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Número de sesiones por grupo, igual en ambos días: juvenil, control 19, sacarosa 18 y stevia 20; adulto, 20 en cada grupo.

En conjunto, estos resultados indican: (1) los animales control de ambas edades discriminaron la posición novedosa en las dos configuraciones; (2) la exposición a sacarosa durante la etapa juvenil redujo la discriminación en ambas configuraciones, mientras que la exposición durante la adultez la redujo solo en la s-SLR, la de mayor demanda de separación de patrones; y (3) los animales expuestos a stevia no difirieron de los controles en ninguna condición, aunque tampoco superaron el nivel de azar. La Figura 5.13 resume las diferencias entre grupos junto con sus intervalos de confianza.




Figura 5.13. Diferencias de medias del DI entre grupos (prueba de Tukey) con su intervalo de confianza del 95 %, para las configuraciones d-SLR (A) y s-SLR (B). Cada fila corresponde a una comparación; una diferencia positiva indica un DI mayor en el primer grupo de la comparación. En rojo se indican las comparaciones significativas ($p < 0{,}05$). La línea punteada indica ausencia de diferencia.

5.5. Neurogénesis hipocampal (PCNA y DCX)

La proliferación celular y la neurogénesis en el giro dentado se evaluaron mediante la inmunodetección de PCNA, marcador de células en proliferación, y de DCX, marcador de neuroblastos y neuronas inmaduras, en los animales de los grupos control y sacarosa (Figuras 5.14 y 5.15).

Los animales expuestos a sacarosa presentaron menos células PCNA$^+$ que los controles (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(1, 76) = 14{,}58$; $p = 0{,}0003$; Figura 5.14A). Se observó además un efecto de la edad, con valores menores en los adultos ($F_{\text{Edad}}(1, 76) = 4{,}79$; $p = 0{,}032$), sin interacción entre ambos factores ($F_{\text{Interacción}}(1, 76) = 0{,}15$; $p = 0{,}70$). La reducción fue significativa en el grupo adulto (prueba *post hoc* de Tukey, diferencia control − sacarosa = 735,5 células/mm^2; IC 95 %: 86,2 a 1384,8; $p = 0{,}020$), mientras que en el grupo juvenil no alcanzó la significancia (diferencia control − sacarosa = 599,2; IC 95 %: −50,1 a 1248,6; $p = 0{,}081$). Dentro de cada tratamiento, los grupos juvenil y adulto no difirieron entre sí (control: $p = 0{,}58$; sacarosa: $p = 0{,}27$).

En cambio, el número de células DCX$^+$ no difirió entre grupos ($F_{\text{Tratamiento}}(1, 76) = 0{,}96$; $p = 0{,}33$; $F_{\text{Edad}}(1, 76) = 0{,}03$; $p = 0{,}87$; $F_{\text{Interacción}}(1, 76) = 3{,}22$; $p = 0{,}077$; Figura 5.14B), y ninguna comparación de Tukey resultó significativa (control vs. sacarosa: juvenil, $p = 0{,}94$; adulto, $p = 0{,}21$).

Las células doblemente marcadas (PCNA$^+$/DCX$^+$), que corresponden a neuroblastos en proliferación, disminuyeron en los animales expuestos a sacarosa en ambas edades (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(1, 76) = 38{,}35$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 76) = 1{,}19$; $p = 0{,}28$; $F_{\text{Interacción}}(1, 76) = 0{,}13$; $p = 0{,}72$; Figura 5.14C): la diferencia control − sacarosa fue de 945,0 células/mm^2 en el grupo juvenil (IC 95 %: 409,6 a 1480,4; $p < 0{,}0001$) y de 840,0 en el adulto (IC 95 %: 304,6 a 1375,4; $p = 0{,}0005$). En este marcador, la dispersión de los valores fue marcadamente menor en los grupos expuestos a sacarosa (Brown-Forsythe, $p < 0{,}0001$).




Figura 5.14. Inmunocitoquímica del giro dentado en ratas expuestas a agua (control) o a sacarosa durante la ventana juvenil o adulta. (A) Células PCNA$^+$. (B) Células DCX$^+$. (C) Células PCNA$^+$/DCX$^+$. Las barras indican la media ± SEM ($n = 20$ cortes, provenientes de 4 animales por grupo). Azul: control; rojo: sacarosa. Se indican las comparaciones de Tukey significativas entre control y sacarosa dentro de cada edad (* $p < 0{,}05$; *** $p < 0{,}001$; **** $p < 0{,}0001$).

En conjunto, estos resultados indican: (1) la exposición a sacarosa redujo la proliferación celular en el giro dentado, con una diferencia significativa respecto del control en el grupo adulto; (2) redujo el número de neuroblastos en proliferación (PCNA$^+$/DCX$^+$) en ambas edades; y (3) no modificó el número total de células DCX$^+$.




Figura 5.15. Fotomicrografías representativas de la inmunorreactividad para PCNA (verde) y DCX (rojo) en el giro dentado de animales control y expuestos a sacarosa durante la ventana juvenil o adulta. Las flechas blancas señalan células $PCNA^{+}/DCX^{+}$, y los círculos muestran una ampliación de la zona indicada. Objetivo de 20×; barra de escala: 100 µm.

Anexos

Anexo A. Tamaño muestral y fase de muestreo de la prueba SLR

Tabla A.1. Número de animales por grupo experimental (edad de exposición × tratamiento) en cada configuración de la prueba SLR. Cada animal realizó una única configuración, de modo que el número total de animales por grupo es la suma de ambas columnas.

Grupo	d-SLR	s-SLR
Juvenil – Control	9	10
Juvenil – Sacarosa	9	9
Juvenil – Stevia	10	10
Adulto – Control	10	10
Adulto – Sacarosa	10	10
Adulto – Stevia	10	10

Los grupos control provienen exclusivamente de las cohortes 2025; ninguna cohorte de 2026 incluyó grupo control propio.

Tabla A.2. Exploración en la fase de muestreo (día 1) de la prueba SLR: exploración total de los tres objetos y porcentaje de esa exploración dirigido al objeto que permaneció en su posición en la fase de prueba (nivel de azar: 33,3 %). Valores expresados como media del grupo.

	d-SLR			s-SLR		
Grupo	*n*	**Total (s)**	**Objeto fijo (%)**	*n*	**Total (s)**	**Objeto fijo (%)**
Juvenil – Control	9	30,6	31,9	10	30,6	33,0
Juvenil – Sacarosa	9	50,7	33,4	9	58,2	35,4
Juvenil – Stevia	10	43,4	34,2	10	40,0	39,5
Adulto – Control	10	42,9	36,7	10	30,5	45,1
Adulto – Sacarosa	10	37,2	36,7	10	37,8	47,8
Adulto – Stevia	10	56,1	34,0	10	55,4	38,0

Referencias bibliográficas

[1] M. S. Kruse et al., “Sucrose exposure in juvenile rats produces long-term changes in fear memory and anxiety-like behavior,” *Psychoneuroendocrinology*, vol. 104, pp. 300–307, Jun. 2019. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.005

[2] H. Coirini et al., “Long-Term Memory Function Impairments following Sucrose Exposure in Juvenile versus Adult Rats,” *Biomedicines*, vol. 10, no. 11, Nov. 2022, Art. no. 2723. DOI: 10.3390/biomedicines10112723 [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2227-9059/10/11/2723

[3] M. S. Kruse, H. Coirini, and M. Rey, “Early Consumption of Stevia rebaudiana Bertoni on Rat Females: Actions on Their Fertility, Progeny, and Behavior,” *J. Nutr.*, vol. 155, no. 6, pp. 1839–1850, Jun. 2025. DOI: 10.1016/j.tjnut.2025.03.012 [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022316625002688

[4] M. R. Sharma, R. Mogra, and B. Upadhyay, “Effect of Stevia Extract Intervention on Lipid Profile,” *Stud. Ethno-Med.*, vol. 3, no. 2, pp. 137–140, 2009. DOI: 10.1080/09735070.2009.11886351

[5] L. Celaya, P. Martina, and N. Kolb-Koslobsky, “Infusions prepared with Stevia rebaudiana: application of a simplex centroid mixture design for the study of natural sweeteners and phenolic compounds,” *J. Food Sci. Technol.*, vol. 59, no. 1, pp. 55–64, 2022. DOI: 10.1007/s13197-021-04979-9

[6] M. Rey et al., “Effects of metformin on behavioral alterations produced by chronic sucrose consumption in male rats,” *J. Neuroendocrinol.*, vol. 36, no. 2, Feb. 2024, Art. no. e13362. DOI: 10.1111/jne.13362 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38148478

[7] E. Yildiz-Ozturk, A. Nalbantsoy, O. Tag, and O. Yesil-Celiktas, “A comparative study on extraction processes of Stevia rebaudiana leaves with emphasis on antioxidant, cytotoxic and nitric oxide inhibition activities,” *Ind. Crops Prod.*, vol. 77, pp. 961–971, 2015. DOI: 10.1016/j.indcrop.2015.10.010

[8] C. Lever, S. Burton, and J. O’Keefe, “Rearing on hind legs, environmental novelty, and the hippocampal formation,” *Rev. Neurosci.*, vol. 17, no. 1–2, 2006. DOI: 10.1515/revneuro.2006.17.1-2.111

[9] G. Pérez-García, O. Guzmán-Quevedo, R. Da Silva Aragão, and F. Bolaños-Jiménez, “Early malnutrition results in long-lasting impairments in pattern-separation for overlapping novel object and novel location memories and reduced hippocampal neurogenesis,” *Sci. Rep.*, vol. 6, Feb. 2016, Art. no. 21275. DOI: 10.1038/srep21275 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26882991/

[10] M. Leger et al., “Object recognition test in mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 8, no. 12, pp. 2531–2537, Dec. 2013. DOI: 10.1038/nprot.2013.155 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263092

[11] A. C. Reichelt, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, “Daily access to sucrose impairs aspects of spatial memory tasks reliant on pattern separation and neural proliferation in rats,” *Learn. Mem.*, vol. 23, no. 7, pp. 386–390, Jul. 2016. DOI: 10.1101/lm.041269.115 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27317199

[12] A. C. Reichelt et al., “The spontaneous location recognition task for assessing spatial pattern separation and memory across a delay in rats and mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 16, no. 12, pp. 5616–5633, Dec. 2021. DOI: 10.1038/s41596-021-00627-w [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41596-021-00627-w

[13] M. S. Kruse, M. Rey, M. C. Vega, and H. Coirini, “Alterations of LXRα and LXRβ expression in the hypothalamus of glucose-intolerant rats,” *J. Endocrinol.*, vol. 215, no. 1, pp. 51–58, Oct. 2012. DOI: 10.1530/JOE-12-0088 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22836489/

[14] G. Paxinos and C. Watson, *The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates*, 2nd. Sydney, Australia: Academic Press, 1986.

[15] J. Charan and N. D. Kantharia, “How to calculate sample size in animal studies?,” *J. Pharmacol. Pharmacother.*, vol. 4, no. 4, pp. 303–306, Oct. 2013. DOI: 10.4103/0976-500X.119726 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24250214