


“Efectos a largo plazo del consumo de Stevia sobre la conducta ansiosa en ratas juveniles y adultas”

Miguel A. Obeid, Mariana Rey, Héctor Coirini y María Sol Kruse



I B Y M E



Por qué estudiar la stevia

La OMS aconseja no utilizar edulcorantes no azucarados para controlar el peso en una nueva directriz



RESEARCH ARTICLE

September 3, 2025



Check for updates

En este trabajo estudiamos si el consumo de una bebida endulzada con stevia produce alteraciones en el comportamiento de tipo ansioso a largo plazo.

infobae


© VIVO Franco Colapinto Hace 15 minutos | Trends A320neo Federación de Camioneros Enzo Pérez Boca Juniors Privatización

TENDENCIAS >

Edulcorantes: qué tan saludables son y cuáles son los riesgos de su consumo diario


Protocolo

JUVENILE GROUP



(1), (2) o (3)

H₂O



ADULT GROUP

PS
OF

(1) only H₂O
Control group
n=16



(2) 10% sucrose
solution and H₂O
SUC group
n=16



(3) 4% stevia
solution and H₂O
stevia group
n=16



• Decocción de stevia:



20 g/ 1L
hervir
10min



20 min reposo
filtrar



hervir
1h



Vf 300
ml



40 mL/
1L
(4 % V/V)







Stevia vs **Sacar**



Resultados

01

Consumos y Pesos: juveniles y adultos






TEST DE PREFERENCIA POR SACAROSA (2 %)

Condiciones experimentales:

- Los animales tenían acceso simultáneo a: **Agua y solución de sacarosa al 2 % P/V** durante 3 días.
- Se registró el consumo de cada
- **Cálculo de preferencia (%):**

$$\text{Preferencia } SUC = \frac{\text{Volumen } SUC}{\text{Volumen } SUC + \text{Volumen agua}} \times 100$$






Test de ansiedad: OF


Resultados

03


Distancia Total




Entradas Zona 1




Distancia Zona 1




Número de Zonas visitadas




Entradas Zona 1+2




Distancia Zona 1+2



Rearing número de eventos



Tiempo Rearing



Conclusiones

- La exposición prolongada a stevia no afectó el peso corporal ni en jóvenes ni adultos
- Los animales prefirieron beber la stevia por sobre el agua, pero bebieron menor cantidad respecto al grupo sacarosa → menor poder hedónico
- A largo plazo, si afecta el comportamiento tipo ansioso: Los animales sometidos a stevia demostraron una disminución en el comportamiento tipo ansioso.
- La stevia disminuyó la conducta de rearing, reflejando una disminución de la exploración vertical.
- A largo plazo, la sacarosa produce un efecto ansiogénico en animales juveniles, mientras que el consumo de stevia produce un efecto ansiolítico, independientemente de la edad.

Muchas gracias!



CONICET



I B Y M E

