UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO - DCA/CT

DISCIPLINA: Otimização de Sistemas PROFESSOR: Manoel Firmino de Medeiros Jr.

Período: 2022.2; Data: 16_/11_/2022_

Nome do aluno:	Número de matrícula:	

Prova da 2ª Avaliação

1) Uma firma construtora possui obras nas cidades A, B, C e D, que devem ser abastecidas com tijolos produzidos por empresas cerâmicas, cujas fábricas se situam nas localidades I II e III. As fábricas possuem estoques de 60, 90 e 110 milheiros de tijolos, respectivamente. As demandas das obras são 50, 60, 70 e 80 milheiros, respectivamente. Os custos unitários (R\$/milheiro) são especificados no Quadro de Custos abaixo (R\$):

	A	В	С	D	Ofertas
I	250	200	150	250	60
II	150	200	300	100	90
III	100	150	200	250	110
Demandas	50	60	70	80	

Deseja-se encontrar o plano ótimo de abastecimento das obras, admitindo que as cerâmicas adotem a mesma prática de *frete incluso* no preço, para o milheiro de tijolo. Para tanto:

- a) Determine, primeiramente, uma solução inicial para o problema, adotando a Regra do Noroeste;
- b) Implemente a solução encontrada no sistema de equações, apresentando-o na forma canônica.
- c) Em seguida, aplique o método **SIMPLEX** para determinar o plano ótimo de transporte.

Escolha e resolva 2 (duas) dentre as questões seguintes (2,3,4).

- 2) Considere o triângulo definido pelos pontos $P_1(2,1)$, $P_2(4,8)$ e $P_3(10,5)$.
- a) Determine a equação da reta que contém o lado P₁- P₃;
- b) Encontre o segmento de reta de comprimento mínimo, que une o vértice oposto, P₂, a essa reta (altura do triângulo), aplicando as condições de otimalidade à função objetivo adequada;
- c) Mostre que o segmento assim determinado é perpendicular ao lado oposto.
 - 3) Considere a função dada pela expressão abaixo:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + a \cdot x_1 x_2 + 2x_2^2$$

Quais os valores que o número real a pode assumir, de maneira que essa função apresente um **mínimo** local estrito? É possível encontrar algum valor para a, de maneira que a função possua um **máximo** local estrito? JUSTIFIQUE!

4) Considere a função $f(x) = -2\sin(2x) - 3\cos(x)$, definida no intervalo $[0, \pi]$.

Partindo de x=0, aplique o método de otimização de máxima descida, para determinar o ponto de mínimo, de acordo com os seguintes passos:

- a) Determinar $\mathbf{d}^{(k)}$ de acordo com $\mathbf{d}^{(k)} = -\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$
- b) Determinar o passo $\alpha^{(k)}$, sobre a direção de descida, através de uma busca linear exata, partindo de x=0. Mantenha constante esse valor de passo, para as próximas iterações.
- c) Calcular $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha^{(k)} \cdot \mathbf{d}^{(k)}$, até k=3.