
Chimie Quantique — Travaux dirigés

L3 Chimie, Année académique 2022–2023 à l'Université de Lorraine

Mots-clés : Mécanique et chimie quantiques, spectroscopie atomique et moléculaire

1 Vecteurs & opérateurs

NB : dans ce qui suit, a, b, c, ω et α sont des constantes, tandis que x, y, z et t sont des variables (réelles ou complexes selon le contexte).

QUESTION 1 — Montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz : soient u et v deux fonctions à valeur complexe, ou deux vecteurs à composantes complexes. Nous avons

$$|\langle u, v \rangle|^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2.$$

Pour ce faire, on peut commencer par supposer que v est différent du vecteur nul, et généraliser ensuite.

QUESTION 2 — Montrer que le module du produit scalaire de deux vecteurs normalisés est compris entre 0 et 1. Dans le cas de fonctions à valeurs réelles ou de vecteurs à composantes réelles, montrer que le produit scalaire de deux de ces objets a une valeur comprise entre -1 et 1 .

QUESTION 3 — Soient \hat{A} et \hat{B} deux opérateurs. Montrer que

$$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger.$$

QUESTION 4 — Evaluer $g(\cdot) = (\hat{A}f)(\cdot)$, où \hat{A} et f sont donnés par

| \hat{A} | $f(\cdot)$ |
|---|----------------|
| $\frac{d^3}{dx^3} + x^3$ | e^{-ax} |
| $\int_0^1 dx$ | $x^3 - 2x + 3$ |
| $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ | $x^3 y^2 z^4$ |

QUESTION 5 — Dites si les opérateurs suivants sont linéaires ou non linéaires :

$$\hat{A}f(x) = [f(x)]^2 \text{ [prise du carré]}$$

$$\hat{A}f(x) = f^*(x) \text{ [prise du complexe conjugué]}$$

$$\hat{A}f(x) = 0 \text{ [multiplication par zéro]}$$

$$\hat{A}f(x) = [f(x)]^{-1} \text{ [prise de l'inverse]}$$

$$\hat{A}f(x) = f(0) \text{ [prise de la valeur en zéro]}$$

$$\hat{A}f(x) = \ln f(x) \text{ [prise du logarithme naturel]}$$

QUESTION 6 — Dans chaque cas, montrer que f est fonction propre de l'opérateur donné, et trouver la valeur propre.

| \hat{A} | $f(\cdot)$ |
|--|------------------|
| $\frac{d^2}{dx^2}$ | $\cos(\omega x)$ |
| $\frac{d}{dt}$ | $e^{i\omega t}$ |
| $\frac{d^2}{dx^2} + 2\frac{d}{dx} + 3$ | $e^{\alpha x}$ |
| $\frac{\partial}{\partial y}$ | $x^2 e^{6y}$ |

QUESTION 7 — Montrer que $\cos(ax)\cos(by)\cos(cz)$ est fonction propre de

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

appelé opérateur laplacien. Trouver la valeur propre correspondante.

QUESTION 8 — Ecrire \hat{A}^2 pour

$$\hat{A} = \frac{d^2}{dx^2}$$

$$\hat{A} = \frac{d}{dx} + x$$

$$\hat{A} = \frac{d^2}{dx^2} - 2x \frac{d}{dx} + 1$$

QUESTION 9 — Soit $\delta_{n,m}$ le delta de Kronecker, défini comme étant égal à 1 lorsque $m = n$ et à 0 lorsque $m \neq n$. Montrer que

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \delta_{n,m} = c_m$$

et que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_n b_m \delta_{n,m} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n.$$

QUESTION 10 — Déterminer si ces paires d'opérateurs commutent ou pas :

| \hat{A} | \hat{B} |
|--------------------|------------------------------------|
| $\frac{d}{dx}$ | $\frac{d^2}{dx^2} + 2\frac{d}{dx}$ |
| x | $\frac{d}{dx}$ |
| $x^2 \frac{d}{dx}$ | $\frac{d^2}{dx^2}$ |

QUESTION 11 — En algèbre ordinaire, $(P+Q)(P-Q) = P^2 - Q^2$. Développer $(\hat{P} + \hat{Q})(\hat{P} - \hat{Q})$. Dans quelles conditions trouvons-nous le même résultat qu'en algèbre ordinaire ?

QUESTION 12 — Evaluer les commutateurs des paires d'opérateurs suivantes :

| \hat{A} | \hat{B} |
|------------------------|----------------------|
| $\frac{d^2}{dx^2}$ | x |
| $\frac{d}{dx} - x$ | $\frac{d}{dx} + x$ |
| $\frac{d^2}{dx^2} - x$ | $\frac{d}{dx} + x^2$ |

QUESTION 13 — Montrer que les valeurs propres d'un opérateur hermitien non-dégénéré sont réelles et que ses vecteurs propres sont orthogonaux deux à deux.

QUESTION 14 — Montrer qu'un opérateur différentiel

$$\hat{A} = \frac{d}{dx}$$

vivant dans un espace de fonctions de carré sommable est anti-hermitien. Montrer ensuite que toute puissance impaire (respectivement, paire) d'un tel opérateur est anti-hermitienne (respectivement, hermitienne).

QUESTION 15 — Pour l'opérateur \hat{A} que la question 14, montrer que $-i\hbar \hat{A}$ est hermitien, et que $i\hat{A}^2$ est anti-hermitien.

2 Aube de la mécanique quantique

QUESTION 16 — Calculer en joule l'énergie d'un photon ayant pour longueur d'onde de de Broglie $\lambda = 100$ pm.

QUESTION 17 — Calculer la longueur d'onde de de Broglie d'un mobile de 140 g se déplaçant à 40 m s^{-1} .

QUESTION 18 — Calculer la longueur d'onde de de Broglie associée à un électron se déplaçant à 1,00 % de la vitesse de la lumière.

QUESTION 19 — Sachant que l'énergie d'extraction du sodium métallique est égale à 1,82 eV, calculer la fréquence de seuil ν_0 du sodium.

QUESTION 20 — Quand on expose une surface de lithium à un faisceau lumineux, l'énergie cinétique des électrons éjectés est de $2,935 \times 10^{-19} \text{ J}$ pour $\lambda = 300,0 \text{ nm}$ et de $1,280 \times 10^{-19} \text{ J}$ pour $\lambda = 400,0 \text{ nm}$. Calculez, à partir de ces données, (a) la constante de Planck, (b) la fréquence de seuil et (c) l'énergie d'extraction du lithium.

QUESTION 21 — Le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène postule que l'électron de cet atome se meut sur des orbites circulaires dont la circonférence est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde de de Broglie de l'électron. En rendant égales les normes des forces centrifuges et coulombiennes dans ce modèle, donner l'expression *quantifiée* (i.e., discrétisée) du rayon et de l'énergie de l'électron de l'atome d'hydrogène dans la $n^{\text{ième}}$ orbite de Bohr.

QUESTION 22 — Calculer la valeur du rayon de la première orbite de Bohr, ainsi que la valeur de l'énergie de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène selon le modèle de Bohr.

QUESTION 23 — Montrer que le modèle de Bohr permet de déduire une formule similaire à celle de Rydberg pour l'énergie des transitions électroniques dans l'atome d'hydrogène. Comparez la valeur de la constante de Rydberg expérimentale ($109\,677,6 \text{ cm}^{-1}$) au coefficient prédit par le modèle de Bohr.

QUESTION 24 — Calculer l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène depuis son état électronique fondamental selon ce modèle.

QUESTION 25 — Généraliser la quantification de l'énergie électronique de Bohr aux hydrogénoides.

QUESTION 26 — Calculer l'énergie d'ionisation de He^+ depuis son état électronique fondamental selon le modèle de Bohr.

QUESTION 27 — Calculer le nombre de photons existant dans un jet lumineux de 2,00 mJ à (a) $1,06 \mu\text{m}$, (b) 537 nm , et (c) 266 nm .

QUESTION 28 — Un atome d'hydrogène à l'état fondamental absorbe un photon de lumière dont la longueur d'onde est $97,2 \text{ nm}$. Il émet ensuite un photon dont la longueur d'onde est de 486 nm . Quel est l'état final de l'atome d'hydrogène en question ?

QUESTION 29 — Calculer les longueurs d'onde limites des raies des séries de Lyman, Balmer et Paschen.

QUESTION 30 — Calculer la longueur d'onde de de Broglie d'un (a) électron ayant une énergie cinétique de 100 eV, (b) un proton ayant une énergie cinétique de 100 eV et (c) un électron situé sur la première orbite de Bohr d'un atome d'hydrogène.

3 Postulats et conséquences

QUESTION 31 — Partir de l'équation de Schrödinger dépendante du temps

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

pour déduire l'équation de Schrödinger indépendante du temps

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

pour les états stationnaires, dans le cas non-relativiste.

QUESTION 32 — Construire l'expression de l'opérateur hamiltonien dans le cas unidimensionnel et vérifier que cet opérateur a bien les dimensions d'une énergie. Déduire l'expression de l'opérateur impulsion dans le cas unidimensionnel.

QUESTION 33 — Démontrer la relation d'incertitude généralisée pour deux observables

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right)^2.$$

QUESTION 34 — À partir de ce résultat, déduire, dans le cas unidimensionnel,

$$\sigma_x \sigma_{p_x} \geq \frac{\hbar}{2}.$$

QUESTION 35 — Quelle est l'incertitude sur la vitesse d'un objet de 100 kg astreint à se déplacer dans un intervalle de 10 m ? Quelle est l'incertitude sur la position d'un mobile de 140 g se déplaçant à 40 ms⁻¹ sachant que son impulsion est mesurée à 10⁻⁶ % de précision ?

QUESTION 36 — Quelle est l'incertitude sur la vitesse si nous souhaitons localiser l'électron non-relativiste à l'intérieur de l'atome, c'est-à-dire que l'on fixe un Δx égal à 50 pm et que la masse utilisée est celle de l'électron "au repos" ?

QUESTION 37 — Soit une fonction f qui peut se développer en série entière comme

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(0) x^k \text{ avec } f^{(k)}(0) = \left. \frac{d^k}{dx^k} f(x) \right|_{x=0}.$$

On définit la fonction d'opérateur par ce même développement où on a remplacé la variable de f par un opérateur \hat{A} :

$$f(\hat{A}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(0) \hat{A}^k,$$

avec les mêmes coefficients $f^k(0)$. Montrer que

$$e^{\hat{A}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\hat{A}^k}{k!}.$$

Montrer également que, dans le cas général, $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}$, $e^{\hat{B}}e^{\hat{A}}$ et $e^{\hat{A}+\hat{B}}$ ne sont pas égaux. À quelle condition ces trois opérateurs sont-ils égaux ?

QUESTION 38 — Soit le problème aux valeurs propres suivant : $\hat{A}\varphi_n = a_n\varphi_n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que les φ_n sont également fonctions propres de $f(\hat{A})$ pour une fonction f quelconque. Donner l'expression des valeurs propres de $e^{\hat{A}}$.

QUESTION 39 — Soit \hat{A} un opérateur indépendant du temps. Donner l'expression de la dérivée de $e^{\hat{A}t}$ par rapport au temps. Vérifier ensuite que, si la fonction d'onde d'un système à l'instant t_0 s'écrit $\Psi(\mathbf{r}, t_0)$, celle à l'instant t s'écrit

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \hat{U}(t, t_0)\Psi(\mathbf{r}, t_0) \quad \text{avec} \quad \hat{U}(t, t_0) = \exp_e \left[-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_0) \right].$$

À quelle équation obéit l'opérateur évolution \hat{U} ?

QUESTION 40 — Connaissant la valeur de la fonction d'onde d'un système au temps t_0 ,

$$\Psi(\mathbf{r}, t_0) = \sum_n c_n \varphi_n(\mathbf{r}),$$

les φ_n étant les fonctions propres de l'hamiltonien, déduire à l'aide de l'opérateur d'évolution ci-dessus la valeur de la fonction d'onde à l'instant t .

QUESTION 41 — Montrer que la norme d'un vecteur d'état dépendant du temps — c'est-à-dire obéissant à l'équation de Schrödinger dépendante du temps, avec un hamiltonien hermitien — ne dépend pas du temps.

QUESTION 42 — Montrer, dans le cas général d'un état $|\psi\rangle$ non-nécessairement superposé que, pour une observable quelconque,

$$\frac{d\langle \hat{A} \rangle_\psi}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}(t)] \rangle_\psi + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle_\psi.$$

Définir ce qu'est une *constante du mouvement* en mécanique quantique. Appliquez la relation ci-dessus dans le cas où $\hat{A} = \hat{H}$ avec un potentiel indépendant du temps, ainsi que dans le cas $\hat{A} = \hat{\mathbb{I}}$.

QUESTION 43 — En déduire le théorème d'Ehrenfest qui pose, pour un potentiel scalaire stationnaire,

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{R}} \rangle_\psi = \frac{1}{m} \langle \hat{\mathbf{P}} \rangle_\psi \quad \text{et} \quad \frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{P}} \rangle_\psi = - \langle \nabla \hat{V}(\hat{\mathbf{R}}) \rangle_\psi.$$

QUESTION 44 — Soient $|\psi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ deux états normalisés et orthogonaux. Montrer qu'une superposition linéaire de ces deux états ne s'interprète pas comme un mélange statistique de ces

deux états quant à la probabilité d'obtenir un résultat de mesure portant sur une observable.

QUESTION 45 — Montrer les conséquences d'une superposition linéaire d'états stationnaires sur la densité de probabilité en un point, ainsi que sur l'espérance d'une observable quelconque et sur la probabilité d'obtenir un résultat de mesure portant sur une observable quelconque.

4 Modèles simples

QUESTION 46 — Montrer que $[n \in \mathbb{N} \text{ et } \Re(\beta) > 0]$

$$\int_0^\infty dx x^n e^{-\beta x} = \frac{n!}{\beta^{n+1}}.$$

Une possibilité pour y arriver est d'utiliser une preuve par récurrence.

QUESTION 47 — Indiquer, parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont normalisables dans l'intervalle précisé :

- (a) $x \mapsto e^{-x^2/2}$ sur \mathbb{R}
- (b) $x \mapsto e^x$ sur \mathbb{R}_+
- (c) $\theta \mapsto e^{i\theta}$ sur $[0; 2\pi]$
- (d) $x \mapsto \sinh(x)$ sur \mathbb{R}_+
- (e) $x \mapsto xe^{-x}$ sur \mathbb{R}_+

Normaliser celles qui peuvent l'être. Les autres fonctions d'onde sont-elles satisfaisantes pour une interprétation physique directe ? On donne

$$\int_0^\infty dx e^{-ax^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \text{ avec } (a > 0)$$

QUESTION 48 — Indiquer, parmi les fonctions suivantes, celles qui sont normalisées sur l'espace à deux dimensions précisé :

- (a) $(x, y) \mapsto e^{-(x^2+y^2)/2}$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$
- (b) $(x, y) \mapsto e^{-(x+y)/2}$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$
- (c) $(x, y) \mapsto \gamma \sin(\pi x/a) \sin(\pi y/b)$ avec $x \in [0; a]$, $y \in [0; b]$, et

$$\gamma = \left(\frac{4}{ab} \right)^{1/2}$$

QUESTION 49 — Parmi les fonctions suivantes, déterminer lesquelles sont acceptables en tant que fonction pouvant représenter un état quantique physique, dans l'intervalle considéré :

- (a) $x \mapsto 1/x$ sur \mathbb{R}_+
- (b) $x \mapsto e^{-2x} \sinh(x)$ sur \mathbb{R}_+
- (c) $x \mapsto e^{-x} \cos(x)$ sur \mathbb{R}_+
- (d) $x \mapsto e^x$ sur \mathbb{R} .

Normaliser celles qui ne le sont pas. Pour cela, on donne [α et C sont deux constantes scalaires] :

$$\int dx \sin^2(\alpha x) = \left[x \mapsto \frac{x}{2} - \frac{\sin(2\alpha x)}{4\alpha} + C \right]$$

QUESTION 50 — Trouver la constante de normalisation des fonctions propres de l'hamiltonien d'une particule libre dans une boîte unidimensionnelle linéaire, et montrer que ces fonctions sont orthogonales deux à deux.

QUESTION 51 — Soit une particule dans une boîte unidimensionnelle de longueur a . Calculer la probabilité de trouver cette particule à une position entre 0 et $a/2$.

QUESTION 52 — À l'aide de l'identité trigonométrique $\sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$, montrer que

$$\int_0^a dx \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) = 0.$$

QUESTION 53 — Calculer l'espérance et la déviation standard sur la mesure de la position et l'impulsion d'une particule libre dans une boîte unidimensionnelle linéaire, et calculer le produit des deux déviations standards. Pour cela, on donne [α et C sont deux constantes scalaires] :

$$\int dx x \sin^2(\alpha x) = \left[x \mapsto \frac{x^2}{4} - \frac{x \sin(2\alpha x)}{4\alpha} - \frac{\cos(2\alpha x)}{8\alpha^2} + C \right]$$

et

$$\int dx x^2 \sin^2(\alpha x) = \left[x \mapsto \frac{x^3}{6} - \left(\frac{x^2}{4\alpha} - \frac{1}{8\alpha^3} \right) \sin(2\alpha x) - \frac{x \cos(2\alpha x)}{4\alpha^2} + C \right].$$

QUESTION 54 — Le potentiel du puits infini est symétrique par rapport à $a/2$. Vérifier que ses solutions φ_n sont symétriques ou anti-symétriques par rapport à cette valeur selon la parité de l'indice n .

QUESTION 55 — Considérer le problème de la particule libre dans une boîte unidimensionnelle linéaire dont les murs sont situés en $(x = -a)$ et en $(x = a)$. Montrer que les énergies sont égales à celles d'une boîte située entre $(x = 0)$ et $(x = 2a)$, mais que les fonctions propres de l'hamiltonien ne sont plus les mêmes et que, dans ce cas, elles s'écrivent

$$\psi_n(x) = \frac{1}{a^{1/2}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2a}\right)$$

lorsque n est pair, et

$$\psi_n(x) = \frac{1}{a^{1/2}} \cos\left(\frac{n\pi x}{2a}\right)$$

lorsque n est impair. Le fait que les fonctions semblent dépendre de la position des murs est-il un problème ?

QUESTION 56 — On considère une particule de masse m astreinte à se déplacer dans le potentiel $V_\infty(x, y)$ égal à zéro si $(0 < x < a)$ et $(0 < y < b)$ et à l'infini dans le contraire. **1.** Vérifier que ce potentiel peut s'écrire sous la forme séparable

$$V_\infty(x, y) = V_\infty^x(x) + V_\infty^y(y),$$

où l'on explicitera $V_\infty^x(x)$ et $V_\infty^y(y)$. **2.** En déduire les énergies et les solutions du puits infini bidimensionnel. **3.** Si $(a = b)$, calculer en unités $\hbar^2/(2ma^2)$ les quatre premiers niveaux d'énergie, ainsi que leur dégénérescence. On explicitera, pour chacun de ces niveaux, les indices n_x et n_y associés.

QUESTION 57 — Donner l'expression des énergies et des fonctions d'onde solutions de l'équation de Schrödinger stationnaire pour une particule libre dans une boîte tridimensionnelle (non-nécessairement cubique).

QUESTION 58 — Soient x , y et z les trois coordonnées cartésiennes et q_1 , q_2 et q_3 trois coordonnées curvilignes. Un élément de volume dV dans ce système de coordonnées se calcule comme

$$dV = \prod_{i=1}^3 h_i dq_i,$$

avec

$$h_i^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i} \right)^2.$$

Le laplacien s'écrit, dans le système de coordonnées curvilignes,

$$\hat{\Delta} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial}{\partial q_3} \right) \right].$$

1. Les coordonnées *cylindriques circulaires* (r, ϕ, z) sont définies comme

$$0 \leq r < \infty, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad -\infty < z < \infty,$$

avec la correspondance avec les coordonnées cartésiennes suivante :

$$x = r \cos(\phi), \quad y = r \sin(\phi), \quad z = z.$$

Déduire que le laplacien en coordonnées *polaires planes* (r, ϕ) de celui en coordonnées cylindriques en posant que la valeur de z est constante et égale à zéro.

2. Les coordonnées *sphériques polaires* (r, θ, ϕ) sont définies comme

$$0 \leq r < \infty, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi,$$

avec la correspondance avec les coordonnées cartésiennes suivante :

$$x = r \sin(\theta) \cos(\phi), \quad y = r \sin(\theta) \sin(\phi), \quad z = r \cos(\theta).$$

Construire un élément de volume dV en coordonnées sphériques polaires, ainsi que l'opérateur laplacien. Calculer le volume d'une sphère.

QUESTION 59 — Sachant que, si s , t , u et v sont quatre vecteurs,

$$\langle s \times t, u \times v \rangle = \langle s, u \rangle \langle t, v \rangle - \langle s, v \rangle \langle t, u \rangle,$$

qu'en mécanique classique le vecteur moment cinétique (de norme L) est défini comme le produit vectoriel du vecteur position et du vecteur impulsion ($\mathbf{r} \times \mathbf{p}$) et que, pour une particule de masse au repos m en mouvement de rotation avec un rayon r variable ou non, son moment d'inertie

est défini par $I = mr^2$, montrer qu'en mécanique classique, l'énergie cinétique s'exprime comme

$$T = \frac{L^2}{2I}.$$

QUESTION 60 — Donner l'expression de l'opérateur moment cinétique orbitalaire en mécanique quantique en coordonnées cartésiennes et montrer qu'il est hermitien.

QUESTION 61 — Calculer le commutateur entre toutes les paires de composantes (x , y et z) de l'opérateur moment cinétique orbitalaire. En déduire l'expression du produit vectoriel de l'opérateur moment cinétique avec lui-même en mécanique quantique.

QUESTION 62 — Montrer que chaque composante (x , y et z) de l'opérateur moment cinétique orbitalaire commute avec le carré de l'opérateur moment cinétique orbitalaire.

QUESTION 63 — Considérer le problème aux valeurs propres

$$\frac{d^2\Phi(\phi)}{d\phi^2} = -m^2\Phi(\phi),$$

m étant un nombre réel (ni imaginaire ni complexe). Les deux fonctions propres dégénérées de $\hat{A} = d^2/d\phi^2$ avec pour valeur propre $-m^2$ sont définies comme

$$\Phi_m(\phi) = e^{im\phi} \text{ et } \Phi_{-m}(\phi) = e^{-im\phi}.$$

Montrer que toute combinaison linéaire de ces deux fonctions propres est également une fonction propre de \hat{A} avec la même valeur propre que Φ_m et Φ_{-m} .

QUESTION 64 — Trouver la constante de normalisation des fonctions propres de l'hamiltonien d'une particule libre sur un cercle.

QUESTION 65 — Montrer qu'ainsi les fonctions propres de l'hamiltonien d'une particule libre sur un cercle forment une base orthonormée.

QUESTION 66 — L'équation de Legendre associée s'écrit [β et m sont des constantes] :

$$\sin(\theta) \frac{d}{d\theta} \sin(\theta) \frac{d}{d\theta} \Theta(\theta) + (\beta \sin^2(\theta) - m^2) \Theta(\theta) = 0$$

avec, dans le cas de la particule sur une sphère ou du rotateur rigide tridimensionnel,

$$\beta = \frac{2IE}{\hbar^2}.$$

Poser $x := \cos(\theta)$ et $P(x) := \Theta(\theta)$ et montrer que l'équation de Legendre associée devient

$$(1 - x^2) \frac{d^2}{dx^2} P(x) - 2x \frac{d}{dx} P(x) + \left[\beta - \frac{m^2}{1 - x^2} \right] P(x) = 0.$$

La résolution de cette équation fait apparaître que β doit être égal à une constante, $\ell(\ell + 1)$, avec $\ell \in \mathbb{Z}$.

QUESTION 67 — Les harmoniques sphériques normalisées sont des fonctions définies par

$$(\theta, \phi) \mapsto Y_\ell^m(\theta, \phi) = (-1)^{(m-|m|)/2} K_{\ell,|m|} P_\ell^{|m|}[\cos(\theta)] e^{im\phi}.$$

avec $K_{\ell,|m|}$ une constante réelle de normalisation, et les $P_\ell^{|m|}$ appelées fonctions de Legendre associées vérifiant la relation d'orthogonalité et les deux relations de récurrence suivantes [on pose $u = \cos(\theta)$] :

Orthogonalité

$$\int_{-1}^1 du P_\ell^{|m|}(u) P_{\ell'}^{|m|}(u) = \frac{2}{2\ell+1} \frac{(\ell+|m|)!}{(\ell-|m|)!} \delta_{\ell,\ell'}$$

Récurrence I ($P_0^0 = 1, P_{\ell<0}^{|m|} = 0$)

$$(\ell - |m| + 1) P_{\ell+1}^{|m|}(u) = (2\ell + 1) u P_\ell^{|m|}(u) - (\ell + |m|) P_{\ell-1}^{|m|}(u).$$

Récurrence II

$$P_{\ell+1}^{|m|}(u) = (1 - u^2)^{-1/2} [(\ell - |m|) u P_\ell^{|m|}(u) - (\ell + |m|) P_{\ell-1}^{|m|}(u)].$$

Montrer que la constante de normalisation est égale à

$$K_{\ell,|m|} = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-|m|)!}{(\ell+|m|)!}}$$

et donner l'expression des harmoniques sphériques $Y_0^0, Y_1^0, Y_1^{-1}, Y_1^1, Y_2^0, Y_2^{-2}, Y_2^{-1}, Y_2^1$ et Y_2^2 .

QUESTION 68 — Les harmoniques sphériques satisfont la relation d'orthogonalité

$$\langle Y_{\ell'}^{m'} | Y_\ell^m \rangle = \delta_{\ell',\ell} \delta_{m',m}.$$

Montrer que

$$\cos(\theta) Y_\ell^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{(\ell-|m|)(\ell+|m|)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} Y_{\ell-1}^m(\theta, \phi),$$

et que

$$\langle Y_{\ell'}^{m'} | \cos(\theta) | Y_\ell^m \rangle \propto \delta_{|\ell'-\ell|,1} \delta_{m,m'}.$$

QUESTION 69 — Donner l'équation aux valeurs propres des opérateurs $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ dans le cas — pour \hat{H} — de la particule libre sur une sphère et du rotateur rigide tridimensionnel, en explicitant l'expression des valeurs propres.

QUESTION 70 — Prouver que $|m| \leq \ell$.

QUESTION 71 — Prouver que Y_0^0, Y_1^0 et $-Y_1^1$ sont normalisées et orthogonales deux à deux.

QUESTION 72 — Prouver que Y_1^{-1} est normalisée et orthogonale à Y_2^1 .

QUESTION 73 — Prouver que **(a)** Y_0^0 , **(b)** Y_1^0 , **(c)** $-Y_1^1$, et **(d)** Y_1^{-1} sont fonctions propres de \hat{L}^2 .

QUESTION 74 — Montrer que Y_1^{-1} n'est pas fonction propre de

$$\hat{L}_x = -i\hbar \left(-\sin(\phi) \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot(\theta) \cos(\phi) \frac{\partial}{\partial \phi} \right).$$

QUESTION 75 — Montrer que le spectre d'absorption rotationnel d'une molécule diatomique est constitué d'une série de raies équidistantes lorsque modélisé par un rotateur rigide.

QUESTION 76 — Montrer que les transitions entre niveaux de rotation d'une molécule diatomique modélisée par un rotateur rigide se produisent dans la région des micro-ondes ou dans l'infrarouge lointain, sachant que la valeur du moment d'inertie typique d'une molécule diatomique est de l'ordre de $5 \times 10^{-46} \text{ kg m}^2$.

QUESTION 77 — Construire, à partir du modèle classique, le potentiel harmonique

$$V(x) = \frac{\mu\omega^2 x^2}{2}$$

utilisé dans l'hamiltonien quantique de l'oscillateur harmonique linéaire, avec $\omega = (k/\mu)^{1/2}$. Montrer que k s'exprime en J/m^2 .

QUESTION 78 — On considère un oscillateur harmonique à deux dimensions décrit par l'hamiltonien

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \frac{\mu\omega^2}{2} (x^2 + y^2).$$

1. Quels sont les niveaux d'énergie \mathcal{E}_N de cet oscillateur et leur degré de dégénérescence g_N ? Ici, N est le nombre total de quanta d'excitation. Écrire l'expression des fonctions propres correspondant aux trois premiers niveaux d'énergie. **2.** Montrer que l'opérateur

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$$

est hermitien et qu'il commute avec \hat{H} .

QUESTION 79 — Les polynômes d'Hermite obéissent à la relation de récurrence

$$H_{n+1}(y) = 2yH_n(y) - 2nH_{n-1}(y) \quad \text{avec} \quad (n \in \mathbb{N})$$

avec la convention $H_0 = 1$ et $H_{-1} = 0$. Trouver H_2 et H_3 .

QUESTION 80 — Les polynômes d'Hermite constituent une famille de polynômes orthogonaux vérifiant la relation

$$\int_{\mathbb{R}} dy H_n(y) e^{-y^2} H_m(y) = 2^n \sqrt{\pi} n! \delta_{n,m}.$$

À partir de ce résultat, normaliser les fonctions propres de l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique linéaire

$$x \mapsto \varphi_n(x) = e^{-\alpha^2 x^2/2} H_n(\alpha x)$$

avec

$$\alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}.$$

QUESTION 81 — À l'aide de la relation de récurrence entre polynômes d'Hermite, démontrer la relation de récurrence entre fonctions propres de l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique linéaire

$$\sqrt{n+1}\varphi_{n+1}(x) = \sqrt{\frac{2\mu\omega}{\hbar}}x\varphi_n(x) - \sqrt{n}\varphi_{n-1}(x).$$

QUESTION 82 — Sachant que

$$\frac{d}{dy}H_n(y) = 2nH_{n-1}(y)$$

montrer la seconde relation de récurrence entre fonctions propres de l'oscillateur harmonique linéaire

$$\sqrt{n+1}\varphi_{n+1}(x) = -\sqrt{\frac{2\hbar}{\mu\omega}}\frac{d}{dx}\varphi_n(x) + \sqrt{n}\varphi_{n-1}(x).$$

QUESTION 83 — Sachant que, si a est un réel strictement positif,

$$\int_{\mathbb{R}} dx x^2 e^{-ax^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a^3}},$$

prouver que les deux fonctions propres de l'oscillateur harmonique linéaire de plus basse énergie, φ_0 et φ_1 , sont normalisées et orthogonales.

QUESTION 84 — En utilisant les relations de récurrence entre polynômes d'Hermite données précédemment montrer que

$$\frac{d}{dy}H_n(y) = 2yH_n(y) - H_{n+1}(y).$$

QUESTION 85 — L'énergie potentielle $V(R)$ de la molécule diatomique HCl peut être décrite par la fonction de Morse :

$$V(r) = D \left(1 - e^{-\alpha(R-R_{\text{eq}})}\right)^2 - D,$$

avec $D = 7.31 \cdot 10^{-19}$ J, $\alpha = 1.82 \cdot 10^{10} \text{ m}^{-1}$ et $R_{\text{eq}} = 1.25 \cdot 10^{-10} \text{ m}$.

1. On effectue un développement au second ordre du potentiel autour de la position d'équilibre R_{eq} :

$$V(R) = V_{\text{eq}} + \frac{1}{2}V''_{\text{eq}} \times (R - R_{\text{eq}})^2 + \mathcal{O}(3).$$

Exprimer V''_{eq} en fonction de D et α .

2. On rappelle que les valeurs propres de l'équation de Schrödinger stationnaire pour l'oscillateur harmonique linéaire a des valeurs propres quantifiées

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \text{ avec } n \in \mathbb{N}.$$

Donner, en eV, l'énergie des quatre premiers niveaux vibrationnels de la molécule. Comparer

aux énergies exactes du potentiel de Morse :

$$E_n = -D \left[1 - \frac{\alpha \hbar}{2\mu D} \left(n + \frac{1}{2} \right) \right]^2.$$

QUESTION 86 — On se propose dans cet exercice d'étudier la spectroscopie vibrationnelle de la molécule HCN. **1.** Combien de modes normaux cette molécule possède-t-elle ? **2.** En utilisant la table de caractères de $C_{\infty v}$, déduire les modes de vibration.

| $C_{\infty v}$ | E | $2C_\phi$ | $\infty\sigma_v$ | Λ | |
|----------------|-----|---------------|------------------|-----------|----------------------|
| Σ^+ | 1 | 1 | 1 | 0 | z |
| Σ^- | 1 | 1 | -1 | 0 | R_z |
| Π | 2 | $2\cos\phi$ | 0 | 1 | $(x, y), (R_x, R_y)$ |
| Δ | 2 | $2\cos 2\phi$ | 0 | 2 | (xz, yz) |
| Φ | 2 | $2\cos 3\phi$ | 0 | 3 | $(x^2 - y^2; xy)$ |
| ... | ... | ... | ... | | |

En première approximation, on peut décrire le mouvement de pliage de la molécule HCN par celui de l'atome d'hydrogène dans un plan perpendiculaire à l'axe de la molécule, et passant par sa position d'équilibre ($x = 0, y = 0$). **3.** Écrire en coordonnées cartésiennes (x, y) l'hamiltonien associé à ce mouvement. On notera $V(x, y)$ l'énergie potentielle ressentie par l'atome H. Justifier pourquoi on peut écrire ce potentiel sous la forme

$$V(x, y) = V_0 + \frac{k}{2}(x^2 + y^2)$$

dans une approximation harmonique. **4.** Écrire l'hamiltonien sous une forme séparable et en déduire l'expression de l'énergie totale de ces deux oscillateurs en fonction de n_x et n_y , nombres de quanta de vibration dans chacun d'entre eux (on utilisera la notation $\omega = \sqrt{k/\mu_{H,CN}}$). **5.** Quelle est la dégénérescence g_N du niveau associé $N = n_x + n_y$ quanta ? **6.** D'après la théorie des groupes, chaque niveau d'énergie vibrationnel doit correspondre à une ou plusieurs représentations irréductibles du groupe de symétrie de la molécule. En vous aidant de la forme des fonctions propres de l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique linéaire,

$$\varphi_0(x) \propto e^{-\alpha x^2}, \quad \varphi_1(x) \propto x e^{-\alpha x^2}, \quad \varphi_2(x) \propto (4x^2 - 2)e^{-\alpha x^2},$$

déterminer les représentations irréductibles associées aux trois premiers niveaux d'énergie. **7.** On considère maintenant l'anharmonicité qui modifie l'énergie de chaque oscillateur selon

$$E_n^{\text{anh}} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega - \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 A$$

avec $A \ll \hbar\omega$. Déterminer les énergies, en fonction de \hbar, ω et A , des quatre premiers niveaux.

QUESTION 87 — On considère une molécule diatomique A–B, et une réécriture de l'hamiltonien en coordonnées sphériques comme

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] + V(r).$$

1. Afin d'étudier la spectroscopie de cet hamiltonien, on commence par faire l'approximation

$$1/r^2 \simeq 1/r_{\text{eq}}^2.$$

Écrire le nouvel hamiltonien sous une forme séparable, et en déduire que les solutions peuvent s'écrire sous la forme

$$\Psi_{n,j,m}(r, \theta, \phi) = U_n(r) Y_j^m(\theta, \phi),$$

où l'on spécifiera l'équation différentielle à laquelle doivent satisfaire les fonctions U_n . **2.** Si on effectue l'approximation harmonique

$$V(r) = V_{\text{eq}} + \frac{\mu\omega^2}{2}(r - r_{\text{eq}})^2$$

et que l'on effectue le changement de fonction

$$U_n(r) = \frac{u_n(r)}{r},$$

écrire la nouvelle équation que doivent satisfaire les solutions u_n . À quel cas étudié précédemment correspond-elle? Notons au passage que les solutions sont supposées satisfaire Les fonctions propres associées à l'oscillateur harmonique linéaire vérifient

$$\int_{\mathbb{R}} dx u_m^*(x) x u_n(x) = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} (\sqrt{n+1}\delta_{m,n+1} + \sqrt{n}\delta_{m,n-1}).$$

3. En déduire les énergies de vibration-rotation $E_{n,j}$ et leur dégénérescence $g_{n,j}$. **4.** Si maintenant nous souhaitons étudier le spectre de vibration-rotation de la molécule A–B sous l'influence d'un champ électrique \mathbf{E} dirigé selon l'axe Oz , on commence tout d'abord par écrire le moment dipolaire de transition, en première approximation, comme

$$\boldsymbol{\mu} = [\mu_{\text{eq}} + \mu'_{\text{eq}}(r - r_{\text{eq}})] \frac{\mathbf{r}}{r}$$

qui induit le terme de couplage $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{E}$, responsable des transitions possibles. Une transition depuis l'état initial $|\Psi_{n_i,j_i,m_i}\rangle$ vers l'état final $|\Psi_{n_f,j_f,m_f}\rangle$ sera permise si l'élément de matrice suivant est non-nul :

$$\langle \Psi_{n_i,j_i,m_i} | \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{E} | \Psi_{n_f,j_f,m_f} \rangle.$$

Établir les règles de sélection pour ces transitions, c'est-à-dire les relations existant entre les nombres quantiques n_i et n_f ainsi qu'entre les nombres quantiques j_i et j_f pour que la transition rovibrationnelle soit permise. **5.** Exprimer l'énergie des photons qui seront absorbés depuis l'état initial ($n = 0, j = 0$). On posera

$$B = \frac{\hbar^2}{2\mu r_{\text{eq}}}.$$

6. Esquissez l'allure du spectre d'absorption, c'est-à-dire les différentes raies correspondant aux transitions permises, et ce dans le cas où seuls les niveaux rotationnels initiaux $j_i = 0, 1, 2$ et 3 sont peuplés initialement. On indiquera pour chaque raie la transition correspondante et sa position (en unités B) vis-à-vis de l'énergie $E = \hbar\omega$.