

CORRECTION TD 2

Exercice 1 :

- On peut écrire $X = Y_1 + Y_2$. En effet, vérifions que $\forall \omega \in \Omega, X(\omega) = Y_1(\omega) + Y_2(\omega)$. Soit $\omega \in \Omega$,
 - Si $X(\omega) > a$. Alors $\mathbb{1}_{X(\omega) > a} = 1$ et $\mathbb{1}_{X(\omega) \leq a} = 0$. Donc $Y_1(\omega) = X(\omega)\mathbb{1}_{X(\omega) > a} = X(\omega)$ et $Y_2(\omega) = X(\omega)\mathbb{1}_{X(\omega) \leq a} = 0$. Dans ce cas là, on a bien $X(\omega) = Y_1(\omega) + Y_2(\omega)$.
 - Si $X(\omega) \leq a$. Alors $\mathbb{1}_{X(\omega) > a} = 0$ et $\mathbb{1}_{X(\omega) \leq a} = 1$. Donc $Y_1(\omega) = X(\omega)\mathbb{1}_{X(\omega) > a} = 0$ et $Y_2(\omega) = X(\omega)\mathbb{1}_{X(\omega) \leq a} = X(\omega)$. Dans ce cas là, on a bien $X(\omega) = Y_1(\omega) + Y_2(\omega)$.
- Remarquons d'abord que :

$$\begin{aligned} Y_1 &= X\mathbb{1}_{X > a} \geq a\mathbb{1}_{X > a} \\ Y_2 &= X\mathbb{1}_{X \leq a} \geq 0 \text{ car } X \geq 0 \text{ p.s.} \end{aligned}$$

On peut donc écrire

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[Y_1 + Y_2] \\ &= \mathbb{E}[Y_1] + \mathbb{E}[Y_2] \text{ par linéarité de l'espérance} \\ &= \mathbb{E}[X\mathbb{1}_{X > a}] + \mathbb{E}[X\mathbb{1}_{X \leq a}] \\ &\geq a\mathbb{E}[\mathbb{1}_{X > a}] + 0 \text{ par croissance de l'espérance} \\ &\geq a\mathbb{P}(X > a) \text{ (Espérance d'une indicatrice d'un événement)} \end{aligned}$$

On obtient alors

$$\mathbb{P}(X > a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

Exercice 2 :

On peut utiliser l'inégalité de Markov avec $Y = (X - \mathbb{E}[X])^2$, qui vérifie $Y \geq 0$ p.s. et $\mathbb{E}[Y] = \text{var}(X) < +\infty$, on trouve

$$\forall b > 0, \mathbb{P}(Y > b) \leq \frac{\mathbb{E}[Y]}{b},$$

en remplaçant Y par $(X - \mathbb{E}[X])^2$, et en prenant $b = a^2$, on obtient

$$\forall a > 0, \mathbb{P}\left((X - \mathbb{E}[X])^2 > a^2\right) \leq \frac{\mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right]}{a^2},$$

ce qui donne

$$\forall a > 0, \mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| > a\right) \leq \frac{\text{var}(X)}{a^2}.$$

Exercice 3 :

Soit $\epsilon > 0$. On veut montrer que $\mathbb{P}\left(|\bar{X}_n - m| > \epsilon\right) \rightarrow 0$. L'inégalité précédente donne que :

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X}_n - \mathbb{E}[\bar{X}_n]| > \epsilon\right) \leq \frac{\text{var}(\bar{X}_n)}{\epsilon^2}.$$

Or,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\bar{X}_n] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n m = m \\
\text{var}(\bar{X}_n) &= \text{var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\
&= \frac{1}{n^2} \text{var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{var}(X_i) \text{ par indépendance} \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}.
\end{aligned}$$

Ce qui donne finalement

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X}_n - m| > \epsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Cela achève la preuve, et on a bien $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} m$.

Exercice 4 :

On peut écrire :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[(\hat{T}_n - \theta)^2\right] &= \mathbb{E}\left[\left(\hat{T}_n - \mathbb{E}[\hat{T}_n] + \mathbb{E}[\hat{T}_n] - \theta\right)^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(\hat{T}_n - \mathbb{E}[\hat{T}_n]\right)^2 + \left(\mathbb{E}[\hat{T}_n] - \theta\right)^2 + 2\left(\hat{T}_n - \mathbb{E}[\hat{T}_n]\right)\left(\mathbb{E}[\hat{T}_n] - \theta\right)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(\hat{T}_n - \mathbb{E}[\hat{T}_n]\right)^2\right] + \mathbb{E}\left[\left(\mathbb{E}[\hat{T}_n] - \theta\right)^2\right] + 2\mathbb{E}\left[\hat{T}_n - \mathbb{E}[\hat{T}_n]\right]\left(\mathbb{E}[\hat{T}_n] - \theta\right) \\
&= \text{var}(\hat{T}_n) + b_n^2 + 2\left(\mathbb{E}[\hat{T}_n] - \mathbb{E}[\hat{T}_n]\right)\left(\mathbb{E}[\hat{T}_n] - \theta\right) \\
&= \text{var}(\hat{T}_n) + b_n^2
\end{aligned}$$

ce qui achève la preuve de la décomposition du risque quadratique. On en déduit qu'un estimateur asymptotiquement sans biais (i.e. tel que $b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$) qui vérifierait $\text{var}(\hat{T}_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ vérifierait alors $\mathbb{E}\left[(\hat{T}_n - \theta)^2\right] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On a alors, par inégalité de Markov,

$$\forall \epsilon > 0, \mathbb{P}\left(|\hat{T}_n - \theta| > \epsilon\right) = \mathbb{P}\left((\hat{T}_n - \theta)^2 > \epsilon^2\right) \leq \frac{\mathbb{E}\left[(\hat{T}_n - \theta)^2\right]}{\epsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Par définition de la convergence en probabilité, cela signifie que $\hat{T}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$. On en déduit que \hat{T}_n est un estimateur consistant de θ .

Exercice 5 :

Soient $U_1, U_2 \sim_{i.i.d.} \mathcal{U}([0, 1])$.

1. On peut calculer la fonction de répartition de $\min(U_1, U_2)$: soit $t \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} F_{\min(U_1, U_2)}(t) &= \mathbb{P}(\min(U_1, U_2) \leq t) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\min(U_1, U_2) > t) \end{aligned}$$

or, pour que le minimum de deux valeurs soit plus grand que t , il faut et il suffit que chacune des valeurs soit plus grande que t . On a donc égalité des événements $\{\min(U_1, U_2) > t\}$ et $\{U_1 > t\} \cap \{U_2 > t\}$, et par conséquent

$$\begin{aligned} F_{\min(U_1, U_2)}(t) &= 1 - \mathbb{P}(U_1 > t \text{ et } U_2 > t) \\ &= 1 - \mathbb{P}(U_1 > t) \mathbb{P}(U_2 > t) \text{ par indépendance} \\ &= 1 - (1 - \mathbb{P}(U_1 \leq t)) (1 - \mathbb{P}(U_2 \leq t)) \\ &= 1 - (1 - F_{U_1}(t)) (1 - F_{U_2}(t)) \end{aligned}$$

il ne reste qu'à calculer la fonction de répartition d'une variable aléatoire uniforme sur $[0, 1]$:

$$\begin{aligned} F_U(t) &= \int_0^t dx = t \text{ si } t \in [0, 1] \\ &= 0 \text{ si } t \leq 0 \\ &= 1 \text{ si } t \geq 1 \end{aligned}$$

On trouve alors

$$\begin{aligned} F_{\min(U_1, U_2)}(t) &= 1 - (1 - t)^2 \text{ si } t \in [0, 1] \\ &= 0 \text{ si } t \leq 0 \\ &= 1 \text{ si } t \geq 1 \end{aligned}$$

Remarque : on aurait pu directement calculer $\mathbb{P}(U_1 > t) = \mathbb{P}(U_2 > t) = \int_t^1 dx = 1 - t$ pour $t \in [0, 1]$.

2. On peut calculer la fonction de répartition de U_1^2 : soit $t \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} F_{U_1^2}(t) &= \mathbb{P}(U_1^2 \leq t) \\ &= \mathbb{P}(-\sqrt{t} \leq U_1 \leq \sqrt{t}) \text{ si } t \geq 0 \\ &= \mathbb{P}(U_1 \leq \sqrt{t}) \text{ car } U_1 \geq 0 \text{ p.s.} \\ &= F_{U_1}(\sqrt{t}) \\ &= \sqrt{t} \text{ si } t \in [0, 1] \\ &= 1 \text{ si } t \geq 1 \end{aligned}$$

Il reste à calculer $F_{U_1^2}(t)$ pour $t \leq 0$, mais comme $U_1^2 \geq 0$ p.s., on a $\forall t \leq 0, F_{U_1^2}(t) = \mathbb{P}(U_1^2 \leq t) = 0$.

Exercice 6 :

Soit $X_1 \sim \mathcal{N}(7, 4)$ et $X_2 \sim \mathcal{N}(1, 4)$ indépendantes.

1. Par le théorème de stabilité des lois normales, $X_1 + X_2$ est de loi normale, il ne reste plus qu'à calculer son espérance et sa variance :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_1 + X_2] &= \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] = 7 + 1 = 8 \\ \text{var}(X_1 + X_2) &= \text{var}(X_1) + \text{var}(X_2) \text{ par indépendance} \\ &= 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$

donc

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(8, 8).$$

2. Par le théorème de stabilité des lois normales, $\frac{X_1 - 2X_2}{5}$ est de loi normale, il ne reste plus qu'à calculer son espérance et sa variance :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\frac{X_1 - 2X_2}{5}\right] &= \frac{\mathbb{E}[X_1] - 2\mathbb{E}[X_2]}{5} = \frac{7 - 2}{5} = 1 \\ \text{var}\left(\frac{X_1 - 2X_2}{5}\right) &= \text{var}\left(\frac{1}{5}X_1\right) + \text{var}\left(-\frac{2}{5}X_2\right) \text{ par indépendance} \\ &= \left(\frac{1}{5}\right)^2 \text{var}(X_1) + \left(\frac{-2}{5}\right)^2 \text{var}(X_2) \\ &= \frac{1}{25}4 + \frac{4}{25}4 = \frac{20}{25} = \frac{4}{5}\end{aligned}$$

donc

$$\frac{X_1 - 2X_2}{5} \sim \mathcal{N}\left(1, \frac{4}{5}\right).$$

3. Pour centrer et réduire X_2 , il suffit de définir

$$X'_2 = \frac{X_2 - 1}{2} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Exercice 7 :

1. On utilise l'additivité de \mathbb{P} :

$$\mathbb{P}(\{1, 2, 3\}) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{3}{4}.$$

2. On pose $Z = \frac{X_1 + 1}{2}$. Comme X_1 est à valeurs dans $\{-1, 1\}$, la variable Z est à valeurs dans $\{\frac{-1+1}{2}, \frac{1+1}{2}\} = \{0, 1\}$. Il s'agit donc d'une variable aléatoire de Bernoulli. Son paramètre est donné par

$$\mathbb{P}(Z = 1) = \mathbb{P}(X_1 = 1) = \mathbb{P}(\{3, 4\}) = \frac{1}{2}$$

. Donc $Z \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$.

3. On peut calculer

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 = -1) &= \mathbb{P}(\{1, 2\}) = \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(X_2 = 2) &= \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{4} \\ \mathbb{P}(|X_2| = 2) &= \mathbb{P}(\{1, 2\}) = \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(X_1 = -1 \text{ et } |X_2| = 2) &= \mathbb{P}(\{1, 2\}) = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

4. On a donc

$$\mathbb{P}(X_1 = -1 \text{ et } |X_2| = 2) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4} = \mathbb{P}(X_1 = -1)\mathbb{P}(|X_2| = 2),$$

donc X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes.

5. On peut calculer

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_1] &= \frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{4}(1) = 0 \\ \mathbb{E}[X_2] &= \frac{1}{4}(-2) + \frac{1}{4}(2) + \frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{4}(1) = 0 \\ \mathbb{E}[X_1 X_2] &= \frac{1}{4}(-1)(-2) + \frac{1}{4}(-1)(2) + \frac{1}{4}(1)(-1) + \frac{1}{4}(1)(1) = 0 \\ \text{Cov}(X_1, X_2) &= \mathbb{E}[X_1 X_2] - \mathbb{E}[X_1]\mathbb{E}[X_2] = 0\end{aligned}$$

On a donc un exemple de variables qui sont de covariance nulle **mais pas indépendantes**.

Exercice 8 :

1. Soit X_i une suite de v.a. i.i.d. d'espérance m et de variance σ^2 . On pose $\hat{T}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$. On peut tout d'abord calculer

$$\begin{aligned}\hat{T}_n^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(X_i^2 - 2X_i\bar{X}_n + \bar{X}_n^2 \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\bar{X}_n + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{X}_n^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}_n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) + \bar{X}_n^2 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}_n\bar{X}_n + \bar{X}_n^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}_n^2\end{aligned}$$

Pour savoir si \hat{T}_n est un estimateur sans biais de σ^2 , il suffit de calculer l'espérance :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\hat{T}_n^2] &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) - \bar{X}_n^2\right] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i^2] - \mathbb{E}[\bar{X}_n^2] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_1^2] - \mathbb{E}[\bar{X}_n^2] \text{ car les } X_i \text{ ont même loi} \\ &= \mathbb{E}[X_1^2] - \mathbb{E}[\bar{X}_n^2]\end{aligned}$$

On peut ensuite utiliser que $\text{var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - \mathbb{E}[Y]^2$, ce qui donne $\mathbb{E}[Y^2] = \text{var}(Y) + \mathbb{E}[Y]^2$, en l'appliquant à X_1 et à \bar{X}_n . On obtient alors

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\hat{T}_n^2] &= \text{var}(X_1) + \mathbb{E}[X_1]^2 - \text{var}(\bar{X}_n) - \mathbb{E}[\bar{X}_n]^2 \\ &= \sigma^2 + m^2 - \text{var}(\bar{X}_n) - \mathbb{E}[\bar{X}_n]^2\end{aligned}$$

or

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\bar{X}_n] &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] \\ &= m \\ \text{var}(\bar{X}_n) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{var}(X_i) \text{ par indépendance} \\ &= \frac{\sigma^2}{n}\end{aligned}$$

On obtient finalement

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\hat{T}_n^2] &= \sigma^2 + m^2 - \frac{\sigma^2}{n} - m^2 \\ &= \frac{(n-1)\sigma^2}{n}\end{aligned}$$

Comme on n'a pas $\mathbb{E}\left[\hat{T}_n^2\right] = \sigma^2$, l'estimateur \hat{T}_n^2 est un estimateur biaisé de σ^2 . Par contre, on a bien $\frac{n-1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, d'où $\mathbb{E}\left[\hat{T}_n^2\right] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sigma^2$. Donc \hat{T}_n^2 est un estimateur asymptotiquement sans biais de σ^2 .

2. On cherche a tel que $\hat{S}_n^2 = a\hat{T}_n^2$ soit un estimateur sans biais de σ^2 , i.e. tel que $\mathbb{E}\left[\hat{S}_n^2\right] = \sigma^2$. Il suffit de résoudre

$$\sigma^2 = \mathbb{E}\left[\hat{S}_n^2\right] = \mathbb{E}\left[a\hat{T}_n^2\right] = a\mathbb{E}\left[\hat{T}_n^2\right] = a\frac{(n-1)\sigma^2}{n}.$$

Cela donne $a = \frac{n}{n-1}$, et donc

$$\hat{S}_n^2 = \frac{n}{n-1}\hat{T}_n^2 = \frac{n}{n-1}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\left(X_i - \bar{X}_n\right)^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n\left(X_i - \bar{X}_n\right)^2,$$

qui est un estimateur sans biais de la variance.